

サツマイモを栽培する全ての皆様へ(家庭菜園・市民農園等も含みます)
もとぐされびよう

サツマイモ基腐病に注意！

植える前の苗や植えた後の畑をよく確認し
基腐病の早期発見、感染拡大防止対策の徹底をお願いします！

- ◎主に「種イモ」や「苗」から伝染します。
- ◎雨が降ると、雨水を介して、病気にかかったサツマイモから他の健全なサツマイモに病原菌が広がります。
- ◎病原菌は土に残るため、同じ畑でサツマイモを栽培すると、発病を繰り返す可能性があります。



発生後数年で
収穫が皆無に！

被害を受けたサツマイモ畑（他県の例）

千葉県 基腐病

検索

農業事務所連絡先や
詳細な防除対策はこちらを検索

千葉県でも発生



生育中や収穫時に写真と似た症状を確認したら
最寄りの農業事務所に御連絡ください！



地下部の茎が黒く
変色します



茎が黒く、葉が黄や赤に変色して枯れます



病気は地下部まで進み、サツマイモを腐らせます。



腐敗したサツマイモの切断面

千葉県農林水産部安全農業推進課 043-223-2888

R3.12作成

本資料及び写真は、生研支援センターイノベーション創出強化研究推進事業(01020C)令和2年度版マニュアル「サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策」より作成。