

(1) 休耕田 農薬登録情報

除草剤名(一般名、%)	適用雑草	備考
ラウンドアップマックスロード (グリホサートカリウム塩 48%)	一年生雑草	1 周囲の作物に散布しないよう飛散防止カバーをつけて散布する。 2 好天時に散布する。散布後1時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので注意する。 3 多年生雑草では散布後2週間は地上部の刈取りを行わない。 4 少量散布は専用ノズルを使用する。 5 展着剤を加える必要はない。
	多年生雑草	
	スギナ	
タッチダウンiQ (グリホサートカリウム塩 44.7%)	一年生雑草	1 好天時に散布する。 2 多年生雑草では散布後2週間は地上部の刈取りや耕起を行わない。 3 周囲の作物に散布しないよう飛散防止カバーをつけて散布する。 4 少量散布の場合には、専用ノズルを使用する。 5 展着剤を加える必要はない。
	多年生雑草	
バスタ液剤 (グルホシネート 18.5%)	一年生雑草、多年生雑草	1 好天時に散布する。 2 周囲の作物に散布しないよう飛散防止カバーをつけて散布する。 3 湛水状態になっている所では、十分落水してから散布する。 4 展着剤を加える必要はない。
サンダーボルト007 (グリホサートイソプロピルアミン塩 30%、ピラフルフェンエチル 0.16%)	一年生及び多年生雑草	1 周囲の作物に散布しないよう飛散防止カバーをつけて散布する。 2 雑草が大きくなり過ぎると効果が劣る。 3 薬剤が雑草全体によく付着するように散布する。 4 展着剤を加える必要はない。