


## 【今週の注目疾患】

## 《梅毒》

2022年第4週に県内の医療機関より梅毒の報告が6例あり、2022年の累積届出数は18例となった。1999年の現行感染症サーベイランス開始以降最多を記録した昨年の同時期と同程度（2021年第4週累積届出数15例）であり、本年も増加傾向が続いている（図）。

図：2013年～2022年4週千葉県梅毒年別累積届出数（N=1211）



2022年に届出のあった18例のうち、性別では男性13例（72%）、女性5例（28%）と男性が多くみられた。年代別では、男性は20代、40代、50代がそれぞれ3例（23%）と多かった。女性は20代が5例中3例（60%）を占めていた。

病型別では、男性は早期顕症梅毒第Ⅰ期（以下、第Ⅰ期）が8例（62%）と最も多く、無症状病原体保有者が3例（23%）、早期顕症梅毒第Ⅱ期（以下、第Ⅱ期）が2例（15%）であった。女性は第Ⅰ期と第Ⅱ期がそれぞれ2例（40%）であり、無症状病原体保有者は1例（20%）であった。なお、2022年においては、これまでのところ梅毒の妊娠症例や先天梅毒の症例は報告されていない。

梅毒の病原体は螺旋状菌の梅毒トレポネーマである。本菌は低酸素状態でしか長く生存できないため、主な感染経路は菌を排出している感染者（主に感染力の強い第Ⅰ期、第Ⅱ期の患者）との粘膜の接触を伴う性行為や疑似性行為（性器と性器、性器と肛門、性器と口の接触など）によるものである<sup>1)、2)</sup>。

早期の薬物治療で完治が可能だが、検査や治療が遅れたり、治療せずに放置したりすると、長期間の経過で脳や心臓に重大な合併症を起こすことがある。時に無症状になりながら進行するため、治ったことを確認しないで途中で治療をやめないことが重要である。また、感染した人の血液中には一定の抗体があるが、再感染を予防できるわけではないので、注意が必要である<sup>2)</sup>。

感染後3～6週間の潜伏期間を経て、継時的に様々な臨床症状が逐次出現する。

第Ⅰ期：感染約3週間後に梅毒トレポネーマの感染部位（主に陰部、口唇部、口腔内、肛門等）に、しこりが形成されることがある。無痛性の所属リンパ節腫脹を伴うこともある。無治療でも数週間で軽快する。感染した可能性がある場合には、この時期に梅毒の検査が勧められる。

第Ⅱ期：第Ⅰ期の症状消失後、4～10週間の潜伏期間を経て、病原体が血液によって全身に運ばれ、手のひら、足の裏、体全体にうっすらと赤い発疹がでることがある。小さなバラの花に似ていることからバラ疹とよばれる。そのほか、脱毛、発熱・倦怠感の全身症状等多彩な症状を呈する。無治療でも数週間で軽快するが、この時期に適切な治療を受けられなかった場合、数年後に複数の臓器に障害がおこることがある。

晩期顕症梅毒：無治療で数年が経過した者のうち、約3分の1で起こる。ゴム腫、進行性の大動

脈拡張を主体とする心血管梅毒、進行麻痺に代表される神経梅毒に進展する。場合によっては死に至る。

先天梅毒：梅毒に罹患している母体から胎盤を通じて胎児に伝播される多臓器感染症であり、死産、早産、新生児死亡、奇形が起こることがある<sup>1)、2)</sup>。

予防方法は、感染者との性行為や疑似性行為を避けることが基本である。コンドームが覆わない部分の皮膚などでも感染がおこる可能性があるため、コンドームの使用は完全ではないものの予防効果があることが示唆されている<sup>1)、2)</sup>。

治療は早期に薬物治療を開始することが重要となる。異変を感じた場合や心配なことがある場合には早めに検査を受け、早期発見・早期治療に繋げることが重要である。また、再感染をする可能性もあるため、パートナーもともに健診をうけることが推奨される。

県では保健所において無料・匿名の検査を実施しているとともに、昨年10月からはちば県民保健予防財団への委託による検査を毎月実施しているため、受検を希望する方は活用されたい。なお、最新の検査実施状況については、県ホームページ等でご確認いただきたい<sup>3)</sup>。

《2月4日は風しんの日です!!》

厚生労働省：2月4日は「風しんの日」風しん理解促進 Zoom ウェビナー

<https://ftcc-inc.jp/mhlw.news/event/disease/rubella/20220204.html>

風しんは、妊婦が感染すると生まれてくる子供に影響が出ることがあり、感染対策が非常に重要である。

特に、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性はこれまで風しんワクチンを接種する機会がなく、注意が必要である。風しんの追加的対策として、これらの人を対象に市町村が実施する予防接種に「風しん予防接種（第5期予防接種）」が追加されている。対象者には居住する市区町村から抗体検査と予防接種が無料で受けられるクーポン券が送付されている。対象者はまず抗体検査を受け、抗体検査の結果、十分な抗体がない人は、各医療機関で予防接種を受ける<sup>4)</sup>。対象者は積極的に利用することが望ましい。

#### ■参考

1) 国立感染症研究所：梅毒とは

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/465-syphilis-info.html>

2) 厚生労働省：梅毒に関する Q&A

[https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/qanda2.html](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/qanda2.html)

3) 千葉県：エイズ・性感染症関連情報

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/aids/index.html>

4) 千葉県：風しん予防接種（第5期定期接種）について

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/yobousesshu/fuusin-tuikataisaku.html>