


【今週の注目疾患】

《梅毒》

2023年第8週に県内医療機関から梅毒の届出が8例あり、本年の累計報告数は46例となった。梅毒は2021年、2022年と2年連続で年間累計報告数が1999年の現行感染症サーベイランス開始以降過去最多を更新している。本年第8週時点において、過去最多の届出数であった昨年第8週時点の計43例を上回っており、増加傾向が継続している（図1）。

図1：2018年～2023年8週千葉県の梅毒年別累積届出数（N=1079）



2023年第8週に届出のあった8例のうち、性別では、男性6例（75%）、女性2例（25%）であった。年代別では、50代3例（37.5%）、20代2例（25%）、30代2例（25%）、80代1例（12.5%）であった。病型別では早期顕症梅毒第Ⅱ期（以下、第Ⅱ期）が4例（50%）、早期顕症梅毒第Ⅰ期（以下、第Ⅰ期）が2例（25%）、晩期顕症梅毒（以下、晩期）が1例（12.5%）、無症状病原体保有者が1例（12.5%）であった。

2023年第1週から第8週までに県内医療機関から届出のあった梅毒46例のうち、性別では男性35例（76%）、女性11例（24%）であった。年代別では、男性は30代が12例（34%）、40代9例（26%）の順に多く、女性は20代が6例（55%）で半数以上を占めた。2023年は現時点で、先天梅毒の症例は報告されていない。

梅毒の感染経路は菌を排出している感染者との性器や肛門、口腔などの粘膜の接触を伴う性行為や疑似性行為によるものである。予防としては、感染者との性行為や疑似性行為を避けることが基本となる。コンドームが覆わない部分の皮膚などでも感染がおこる可能性があるため、コンドームの使用は完全ではないものの予防効果があることが示唆されている^{1,2)}。早期発見・早期治療が重要であり、再感染を予防するため、パートナーもともに検査を受けることが推奨される。県では保健所において無料・匿名の検査を実施しているとともに、（公財）ちば県民保健予防財団への委託による検査を実施している。感染が気になる方や不安なことがある場合には、活用されたい。なお、最新の検査実施状況については、県ホームページ等でご確認いただきたい³⁾。

梅毒は、感染後3～6週間の潜伏期間を経て、継時的に様々な臨床症状が逐次出現する。

第Ⅰ期 感染約3週間後に梅毒トレポネーマの感染部位（主に陰部、口唇部、口腔内、肛門等）に、しこりが形成されることがある。無治療でも数週間で軽快する。感染した可能性がある場合には、この時期に梅毒の検査が勧められる。

第Ⅱ期 第Ⅰ期の症状消失後、4～10週間の潜伏期間を経て、手のひら、足の裏、体全体にうっすらと赤い発疹がでることがあるほか、脱毛、発熱・倦怠感の全身症状等多彩な症状を呈する。無治療でも数週間で軽快するが、この時期に適切な治療を受けられなかった場合、数年後に複数の臓器に障害がおこることがある。

潜伏梅毒（無症状病原体保有者） 梅毒血清反応陽性で顕性症状が認められないものをさし、第Ⅰ期と第Ⅱ期の間、第Ⅱ期の症状消失後の状態を主にいう。第Ⅱ期の症状が消失後、再度第Ⅱ期の症状を示すことがあり、これは感染成立後1年以内に起こることから、早期潜伏梅毒と呼ぶ。これに対して、感染成立後1年以上たつ血清梅毒反応陽性で無症状の状態を後期潜伏梅毒と呼ぶ。

晩期 無治療で経過した者のうち、約3分の1で起こる。ゴム腫、進行性の大動脈拡張を主体とする心血管梅毒、進行麻痺に代表される神経梅毒に進展する。場合によっては死に至る。

先天梅毒 梅毒に罹患している母体から胎盤を通じて胎児に伝播される多臓器感染症であり、死産、早産、新生児死亡、奇形が起こることがある^{1,2)}。


《インフルエンザ》

2023年第8週の県全体のインフルエンザ定点当たり報告数は9.05（人）となった。前週（2023年第7週）10.28（人）から減少したが、保健所管内別では船橋市19.12（人）、松戸15.09（人）、習志野13.19（人）、君津12.23（人）で定点当たり報告数10.0（人）を超えていた（図2）。引き続き、インフルエンザの予防対策を徹底していただきたい。

千葉県：インフルエンザから身を守ろう

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/influenza/influenza-yobou.html>

図2：インフルエンザ県内定点当たり報告数（5週間）



■参考

1)国立感染症研究所：梅毒とは

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/465-syphilis-info.html>

2)厚生労働省：梅毒に関する Q&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryousyphilis_qa.html

3)千葉県：梅毒が増えています

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/baidoku.html>