

ID: [REDACTED]

[REDACTED] 様

性別 [REDACTED] 生年月日 [REDACTED]

処方箋が出された場合には
治療と処方薬の確認をするため
薬局窓口でこの説明書を提示し
てください。

【エリブリン療法】

スケジュール: 21日を1コースの治療として繰り返し行います。

(患者さんによってはスケジュールを変更する場合があります。)

		今回のサイクル																					次サイクル																				
		4																					5																				
日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
点滴	ハラヴェン (エリブリンメシル酸塩酸塩)	[Icon] [Icon] [Icon] [Icon]																																									
		がん細胞の増殖の過程(DNA合成)を抑える薬です。治療中に血管の痛みや熱感を感じたらすぐにお知らせ下さい。約5分程度で点滴します。																																									
副作用	悪心・食欲不振	治療法に対応した吐き気止めを使用しますが、治療日から数日間、むかつきや食欲不振が起こることがあります。個人差が大きいため、食事や水分が摂れない時はお知らせください。																																									
	倦怠感	疲労感・だるさを感じる場合があります。無理をせずできるだけリラックスしてお過ごしください。																																									
	骨髄抑制	点滴後10~14日頃が白血球や血小板の数が一番少なくなることが予想されます。この時期は、手洗い・うがいをして感染症にかからないように心がけたり、ケガや転倒に気をつけましょう。																																									
	発熱	初回点滴後、4人に1人の患者さんで発熱がみられます。2日以内に自然に解熱がみられれば心配ありません。																																									
	味覚異常	約3割の患者さんに味覚の変化が見られます。点滴後に起こることが多いようです。																																									
	末梢神経障害	約2割の患者さんで感覚や運動の麻痺、手足のしびれ、手足の痛みなどを感じる場合があります。投与回数が増えると頻度が高くなる傾向があります。																																									
	皮疹	約1割の患者さんに発疹が見られます。かゆみや炎症を伴う場合には塗り薬や内服薬で対応します。																																									
	脱毛	抗がん剤投与2~3週間後から起こります。頭髮以外の部分でも起こります。																																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火

備考
その他の副作用として口内炎、便秘、下痢、などがありますが、個人差があるため、症状が出た場合にはお薬手帳に記載しておいて来院時に状況をお伝えください。また、稀ではありますが重い副作用がありますので、詳しくはパンフレットを参照し、思い当たる点や不安がある場合にはお問い合わせください。
副作用は不快なものです。対処の仕方、気持ちの持ち方によって感じ方は異なります。患者さんご自身で工夫をされていたくと共に、辛いこと、困ったこと等ありましたら医療者(医師・看護師・薬剤師)にご相談ください。