

ID: [REDACTED]

性別 [REDACTED] 生年月日 [REDACTED]

様

【パクリタキセル/カルボプラチン(PTX/CBDCA)療法】
スケジュール: 3週間を1コースの治療として繰り返し行います。

体調や検査値、副作用によってはスケジュールや点滴時間を変更する場合があります。

処方箋が出されます。治療と処方薬の確認のため薬局窓口でこの説明書を提示してください。

今回のサイクル														次サイクル											
4														5											

日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
点滴	パクリタキセル	✍														✍																											
	カルボプラチン	✍														✍																											
副作用	過敏症状	点滴中に起こることがあります。息苦しい、胸がドキドキする、かゆみ・発疹が出る等の症状がありましたらすぐにお知らせください。																																									
	アレルギー症状	点滴治療を開始して数日後に皮膚の発疹、かゆみなどが現れることがあります。自宅でこのような症状が現れた場合にはご連絡ください。																																									
	吐き気・食欲不振	治療法に対応した吐き気止めを使用しますが、治療日から数日間、むかつきや食欲不振が起こることがあります。個人差が大きいので、食事や水分が摂れない時はお知らせください。																																									
	便秘	抗がん剤や制吐剤(吐き気止め)によって腸の動きが悪くなります。水分を十分にとり、下剤を調節して便秘を予防しましょう。(市販の下剤でも構いません)																																									
	骨髄抑制	点滴後10~14日頃が白血球や血小板の数が一番少なくなることが予想されます。この時期は、手洗い・うがいをして感染症にかからないように心がけたり、ケガや転倒に気をつけましょう。																																									
	筋肉痛・関節痛	治療日から2~3日目に発現することがあります。痛み止めで症状を軽減でき、数日で軽快します。																																									
	脱毛	抗がん剤投与2~3週間後から起こります。頭髮以外の部分でも起こります。抗がん剤の治療終了3~6ヵ月後には再び生えてきます。																																									
	末梢神経障害	感覚や運動の麻痺、手足のしびれ、手足の痛みなどを感じる場合があります。投与回数が増えると増殖する傾向があります。																																									

★【パクリタキセルにはアルコールが入っていますので、治療日に車の運転はしないで下さい。】
 治療期間中に息苦しい、咳が出る、熱が出るなどの症状が出た場合にはご連絡ください。
 この治療法は、作用の違う薬剤を組み合わせることで効果を高め、副作用を抑えています。副作用は不快なものですが、対処の仕方、気持ちの持ち方によって感じ方は大きく異なります。患者さんご自身で工夫をするとともに、辛いこと、困ったこと等ありましたら、医療者(医師・看護師・薬剤師)にご相談ください