

2) 分析項目別該当割合

メタボリックシンドローム

メタボリックシンドローム該当の割合は、図7のとおり、男性29.4%、女性が9.9%となり、予備群の割合は、男性19.4%、女性が6.3%となった。医療保険者別年齢階級別のメタボリックシンドローム該当及び予備群の割合は、男性が図8-1、女性が図8-2のとおりであった。




図7 メタボリックシンドローム該当及び予備群の割合




図8-1 医療保険者別メタボリックシンドローム該当及び予備群の割合（男性）




図8-2 医療保険者別メタボリックシンドローム該当及び予備群の割合（女性）

男性のメタボリックシンドローム該当の割合は、図 9-1、表 6-1 のとおり、40～44 歳が 16.5%と最も低く、年齢階級が上がるにしたがって高くなり、70～74 歳では 36.0%であった。

メタボリックシンドローム予備群は、どの年齢階級も 17.6%～20.9%以内であり、年齢の若い方に若干該当が多い傾向はみられたが、年齢階級による大きな違いはなかった。

予備群と該当を合わせた割合は、40～44 歳が 36.9%で最も低く、65～69 歳が 54.5%と最も高くなった。

女性は、図 9-2、表 6-2 のとおり、年齢階級が上がるにしたがって、メタボリックシンドロームの該当、予備群ともに割合が高くなった。

メタボリックシンドローム該当は 40～44 歳が 3.3%と最も低く、年齢階級が上がるにしたがって高くなり、70～74 歳で 13.6%と最も高くなった。

メタボリックシンドローム予備群は、40～44 歳が 5.2%と最も低く、50～54 歳が最も高く 7.4%であった。

予備群と該当を合わせた割合は、40～44 歳が 8.5%と最も低く、年齢階級が上がるごとに増加し、70～74 歳は 19.6%で最も高くなった。




図 9-1 メタボ該当及び予備群の割合 市町村国保 + 協会けんぽ (男性)




図 9-2 メタボ該当及び予備群の割合 市町村国保 + 協会けんぽ (女性)

表 6-1 メタボ該当及び予備群該当率 市町村国保 + 協会けんぽ (男性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数(人)	非該当	23,654	26,190	20,513	15,451	14,595	20,922	32,042	153,367
	予備群	7,661	9,572	8,132	6,188	5,784	8,692	12,143	58,172
	該当	6,207	9,973	10,537	9,654	10,522	16,388	24,842	88,123
	合計	37,522	45,735	39,182	31,293	30,901	46,002	69,027	299,662
割合(%)	非該当	63.0	57.3	52.4	49.4	47.2	45.5	46.4	51.2
	予備群	20.4	20.9	20.8	19.8	18.7	18.9	17.6	19.4
	該当	16.5	21.8	26.9	30.9	34.1	35.6	36.0	29.4
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	該当予備群合計	37.0	42.7	47.6	50.6	52.8	54.5	53.6	48.8

表 6-2 メタボ該当及び予備群該当率 市町村国保 + 協会けんぽ (女性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数(人)	非該当	23,669	29,385	26,729	24,230	27,591	45,718	70,516	247,838
	予備群	1,354	2,036	2,293	1,981	2,225	3,661	5,232	18,782
	該当	852	1,532	1,972	2,540	3,490	7,046	11,910	29,342
	合計	25,875	32,953	30,994	28,751	33,306	56,425	87,658	295,962
割合(%)	非該当	91.5	89.2	86.2	84.3	82.8	81.0	80.4	83.7
	予備群	5.2	6.2	7.4	6.9	6.7	6.5	6.0	6.3
	該当	3.3	4.6	6.4	8.8	10.5	12.5	13.6	9.9
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	該当予備群合計	8.5	10.8	13.8	15.7	17.2	19.0	19.6	16.3

肥満（BMI25 以上または腹囲基準値以上）

肥満該当の割合は、図 10 のとおり、男性 58.3%、女性が 26.9%となった。医療保険者別年齢階級別の肥満該当の割合は、男性が図 11-1、女性が図 11-2 のとおりであった。




図 10 肥満該当の割合




図 11-1 医療保険者別肥満該当の割合（男性）




図 11-2 医療保険者別肥満該当の割合（女性）

肥満（BMI25 以上または腹囲基準値以上）の割合は、男性が図 12-1、表 7-1 のとおり、40～44 歳が 53.9%で最も低く、65～69 歳で 60.4%と最も高かった。女性は図 12-2、表 7-2 のとおり、40～44 歳が 23.1%で最も低く、65～69 歳で 28.3%と最も高かった。

腹囲が基準以上かつ BMI25 以上の割合は、男性は 50 歳～54 歳が 41.5%で最も高く、年齢階級が上がるにつれて減少する傾向がみられた。女性では 40～44 歳が 13.0%と最も低く、50～54 歳で 16.0%と最も高くなった。

腹囲のみ基準値以上の割合は、男性が女性より多かったが、男女とも年齢階級が上がるにしたがって増加した。

BMI25 以上のみの割合は、男性では 1.2～2.8%であったのに対し、女性は 7.2～9.5%と、男性に比べて割合が高かった。男女とも 45～49 歳の該当率が最も高く、男女とも年齢階級が高い方が該当率は少なかった。




図 12-1 肥満該当の割合 市町村国保 + 協会けんぽ（男性）




図 12-2 肥満該当の割合 市町村国保 + 協会けんぽ（女性）

表 7-1 肥満該当の割合 市町村国保 + 協会けんぽ (男性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数(人)	基準未満	17,684	20,103	16,246	12,917	12,713	18,424	28,967	127,054
	腹囲 < 85 & BMI 25	1,024	1,306	1,079	672	604	744	848	6,277
	腹囲 85 & BMI < 25	4963	6,314	6,073	5,622	6,435	11,489	18,943	59,839
	腹囲 85 & BMI 25	14649	19,005	16,607	12,703	11,826	15,878	20,539	111,207
	合計	38,320	46,728	40,005	31,914	31,578	46,535	69,297	304,377
割合(%)	基準未満	46.1	43.0	40.6	40.5	40.3	39.6	41.8	41.7
	腹囲 < 85 & BMI 25	2.7	2.8	2.7	2.1	1.9	1.6	1.2	2.1
	腹囲 85 & BMI < 25	13.0	13.5	15.2	17.6	20.4	24.7	27.3	19.7
	腹囲 85 & BMI 25	38.2	40.7	41.5	39.8	37.5	34.1	29.6	36.5
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	肥満該当	53.9	57.0	59.4	59.5	59.7	60.4	58.2	58.3

表 7-2 肥満該当の割合 市町村国保 + 協会けんぽ (女性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数(人)	基準未満	20,811	25,745	23,706	21,929	25,168	41,080	63,590	222,029
	腹囲 < 90 & BMI 25	2,490	3,272	2,783	2,321	2,605	4,356	6,305	24,132
	腹囲 90 & BMI < 25	251	420	639	915	1,364	2,941	5,338	11,868
	腹囲 90 & BMI 25	3513	4,986	5,172	4,763	5,354	8,933	12,947	45,668
	合計	27,065	34,423	32,300	29,928	34,491	57,310	88,180	303,697
割合(%)	基準未満	76.9	74.8	73.4	73.3	73.0	71.7	72.1	73.1
	腹囲 < 90 & BMI 25	9.2	9.5	8.6	7.8	7.6	7.6	7.2	7.9
	腹囲 90 & BMI < 25	0.9	1.2	2.0	3.1	4.0	5.1	6.1	3.9
	腹囲 90 & BMI 25	13.0	14.5	16.0	15.9	15.5	15.6	14.7	15.0
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	肥満該当	23.1	25.2	26.6	26.7	27.0	28.3	27.9	26.9

高血圧

高血圧該当の割合は、図 13 のとおり、男性 49.1%、女性が 38.5%となり、予備群の割合は、男性 13.8%、女性が 13.1%となった。医療保険者別年齢階級別の高血圧該当及び予備群の割合は、男性が図 14-1、女性が図 14-2 のとおりであった。




図 13 高血圧予備群及び該当の割合




図 14-1 医療保険者別高血圧該当及び予備群の割合（男性）




図 14-2 医療保険者別高血圧該当及び予備群の割合（女性）

高血圧該当の割合は男女とも年齢階級が上がるにしたがって増加した。男性では図 15-1、表 8-1 のとおり 40～44 歳は 22.1%、70～74 歳は 66.1%であった。女性では図 15-2、表 8-2 のとおり 40～44 歳は 9.8%、70～74 歳は 57.1%であった。

高血圧予備群の割合は男性では 11.8%～15.7%内とほぼ横ばいであったが、女性では 40～44 歳は 8.8%であり、65～69 歳で最も高く 14.9%となった。

降圧薬の服薬率は、男女とも加齢に伴い増加し、70～74 歳では男性は 50.4%、女性は 39.8%であった。服薬率は、男性よりも女性の方がいずれの年齢階級も少なかった。




図 15-1 高血圧該当及び予備群の割合と服薬率 市町村国保+協会けんぽ(男性)




図 15-2 高血圧該当及び予備群の割合と服薬率 市町村国保+協会けんぽ(女性)

表 8-1 高血圧該当及び予備群割合と服薬率 市町村国保 + 協会けんぽ (男性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数(人)	非該当	23,557	24,349	17,172	11,068	8,663	11,556	15,263	111,628
	予備群	5,836	7,226	6,004	4,472	3,999	5,759	8,191	41,487
	該当	8,361	14,428	16,213	15,935	18,393	28,837	45,683	147,850
	合計	37,754	46,003	39,389	31,475	31,055	46,152	69,137	300,965
割合(%)	非該当	62.4	52.9	43.6	35.2	27.9	25.0	22.1	37.1
	予備群	15.5	15.7	15.2	14.2	12.9	12.5	11.8	13.8
	該当	22.1	31.4	41.2	50.6	59.2	62.5	66.1	49.1
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数(人)	服薬あり	2,065	5,039	7,325	8,951	12,022	20,910	34,917	91,229
	服薬なし	36,265	41,696	32,687	22,976	19,566	25,644	34,409	213,243
	合計	38,330	46,735	40,012	31,927	31,588	46,554	69,326	304,472
割合(%)	服薬あり	5.4	10.8	18.3	28.0	38.1	44.9	50.4	30.0
	服薬なし	94.6	89.2	81.7	72.0	61.9	55.1	49.6	70.0
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 8-2 高血圧該当及び予備群割合と服薬率 市町村国保 + 協会けんぽ (女性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数(人)	非該当	21,266	24,148	19,941	16,316	15,682	21,299	25,089	143,741
	予備群	2,287	3,477	3,870	3,643	4,742	8,443	12,576	39,038
	該当	2,563	5,602	7,413	8,974	13,012	26,797	50,114	114,475
	合計	26,111	33,227	31,224	28,933	33,436	56,539	87,779	297,254
割合(%)	非該当	81.4	72.7	63.9	56.4	46.9	37.7	28.6	48.4
	予備群	8.8	10.5	12.4	12.6	14.2	14.9	14.3	13.1
	該当	9.8	16.9	23.7	31.0	38.9	47.4	57.1	38.5
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数(人)	服薬あり	612	1,933	3,332	5,006	7,793	17,367	35,090	71,133
	服薬なし	26,507	32,505	28,979	24,935	26,711	39,977	53,147	232,761
	合計	27,119	34,438	32,311	29,941	34,504	57,344	88,237	303,894
割合(%)	服薬あり	2.3	5.6	10.3	16.7	22.6	30.3	39.8	23.4
	服薬なし	97.7	94.4	89.7	83.3	77.4	69.7	60.2	76.6
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

脂質異常症

脂質異常症該当の割合は、図 16 のとおり、男性 59.7%、女性が 56.5%となった。医療保険者別年齢階級別の脂質異常症該当の割合は、男性が図 17-1、女性が図 17-2 のとおりであった。




図 16 脂質異常症該当の割合



図 17-1 医療保険者別脂質異常症該当の割合(男性)




図 17-2 医療保険者別脂質異常症該当の割合(女性)

男性は図 18-1、表 9-1 のとおり年齢階級が高くなるにつれ該当の割合も上昇し 60～64 歳が 61.3%と最も高く、その後は年齢階級が高くなるにしたがい該当の割合が低下し、70～74 歳では 60.3%であった。

女性は図 18-2、表 9-2 のとおり 40～44 歳は 24.0%であったが、年齢階級が上がるにしたがって該当の割合が増加し、70～74 歳では 69.9%と最も高くなっていた。

脂質異常症に対する薬の服薬率は、男女とも加齢に伴い増加した。40～59 歳までは男性が女性を上回っていたが、60 歳以降は女性が男性を上回り、70～74 歳では、女性が男性より 10.2%高くなっていた。




図 18-1 脂質異常症該当割合と服薬率 市町村国保+協会けんぽ(男性)




図 18-2 脂質異常症該当割合と服薬率 市町村国保+協会けんぽ(女性)

表 9-1 脂質異常症該当割合と服薬率 市町村国保 + 協会けんぽ (男性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数 人	非該当	17,542	19,302	15,656	12,405	12,209	18,068	27,487	122,669
	該当	20,770	27,416	24,339	19,506	19,363	28,432	41,697	181,523
	合計	38,312	46,718	39,995	31,911	31,572	46,500	69,184	304,192
割合 %	非該当	45.8	41.3	39.1	38.9	38.7	38.9	39.7	40.3
	該当	54.2	58.7	60.9	61.1	61.3	61.1	60.3	59.7
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数 人	服薬あり	1,422	3,277	4,304	4,892	6,341	11,328	19,116	50,680
	服薬なし	36,908	43,458	35,708	27,035	25,247	35,226	50,210	253,792
	合計	38,330	46,735	40,012	31,927	31,588	46,554	69,326	304,472
割合 %	服薬あり	3.7	7.0	10.8	15.3	20.1	24.3	27.6	16.6
	服薬なし	96.3	93.0	89.2	84.7	79.9	75.7	72.4	83.4
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 9-2 脂質異常症該当割合と服薬率 市町村国保 + 協会けんぽ (女性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数 人	非該当	20,598	23,667	17,737	12,744	12,473	18,206	26,466	131,891
	該当	6,502	10,742	14,558	17,188	21,995	39,038	61,585	171,608
	合計	27,100	34,409	32,295	29,932	34,468	57,244	88,051	303,499
割合 %	非該当	76.0	68.8	54.9	42.6	36.2	31.8	30.1	43.5
	該当	24.0	31.2	45.1	57.4	63.8	68.2	69.9	56.5
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数 人	服薬あり	467	1,006	2,183	4,275	7,979	17,997	33,311	67,218
	服薬なし	26,652	33,432	30,128	25,666	26,525	39,346	54,926	236,675
	合計	27,119	34,438	32,311	29,941	34,504	57,343	88,237	303,893
割合 %	服薬あり	1.7	2.9	6.8	14.3	23.1	31.4	37.8	22.1
	服薬なし	98.3	97.1	93.2	85.7	76.9	68.6	62.2	77.9
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

糖尿病

糖尿病該当割合は、図 19 のとおり男性 14.3%、女性が 7.1%となり、予備群割合は、男性 10.5%、女性が 10.5%となった。医療保険者別年齢階級別の糖尿病該当及び予備群の割合は、男性が図 20-1、女性が図 20-2 のとおりであった。




図 19 糖尿病該当及び予備群の割合




図 20-1 医療保険者別糖尿病該当及び予備群の割合（男性）




図 20-2 医療保険者別糖尿病該当及び予備群の割合（女性）

糖尿病該当の割合は、男性が女性より多く、男女とも年齢が上がるにしたがい増加した。男性は図 21-1、表 10-1 のとおり 40～44 歳は 4.9%であり、70～74 歳では 20.6%、女性では図 21-2、表 10-2 のとおり 40～44 歳は 1.9%、70～74 歳では 10.7%であった。

糖尿病予備群の割合も、男女とも年齢が上がるにしたがい増加し、男性は 40～44 歳は 4.9%、70～74 歳は 14.4%、女性は 40～44 歳は 2.2%、70～74 歳は 15.4%であり、男性より女性のほうが加齢に伴い予備群が大きく増加していた。

血糖を下げる薬の服薬率は、男女とも加齢に伴い増加し、70～74 歳では男性は 14.2%、女性は 6.9%であった。




図 21-1 糖尿病該当及び予備群の割合と服薬率 市町村国保 + 協会けんぽ (男性)




図 21-2 糖尿病該当及び予備群の割合と服薬率 市町村国保 + 協会けんぽ (女性)

表 10-1 糖尿病該当及び予備群割合と服薬率 市町村国保 + 協会けんぽ (男性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数(人)	非該当	34,321	39,614	31,741	23,675	22,022	31,397	44,992	227,762
	予備群	1,872	3,172	3,465	3,316	3,879	6,153	9,986	31,843
	該当	1,882	3,641	4,562	4,743	5,525	8,855	14,264	43,472
	合計	38,075	46,427	39,768	31,734	31,426	46,405	69,242	303,077
割合(%)	非該当	90.1	85.3	79.8	74.6	70.1	67.7	65.0	75.1
	予備群	4.9	6.8	8.7	10.4	12.3	13.3	14.4	10.5
	該当	4.9	7.8	11.5	14.9	17.6	19.1	20.6	14.3
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数(人)	服薬あり	882	1,940	2,636	2,940	3,645	6,049	9,852	27,944
	服薬なし	37,448	44,795	37,376	28,987	27,943	40,505	59,473	276,527
	合計	38,330	46,735	40,012	31,927	31,588	46,554	69,325	304,471
割合(%)	服薬あり	2.3	4.2	6.6	9.2	11.5	13.0	14.2	9.2
	服薬なし	97.7	95.8	93.4	90.8	88.5	87.0	85.8	90.8
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 10-2 糖尿病該当及び予備群割合と服薬率 市町村国保 + 協会けんぽ (女性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数(人)	非該当	25,816	31,999	28,996	25,448	28,078	44,122	65,143	249,602
	予備群	591	1,231	1,856	2,581	3,869	7,968	13,568	31,664
	該当	508	932	1,226	1,731	2,431	5,168	9,460	21,456
	合計	26,915	34,162	32,078	29,760	34,378	57,258	88,171	302,722
割合(%)	非該当	95.9	93.7	90.4	85.5	81.7	77.1	73.9	82.5
	予備群	2.2	3.6	5.8	8.7	11.3	13.9	15.4	10.5
	該当	1.9	2.7	3.8	5.8	7.1	9.0	10.7	7.1
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
人数(人)	服薬あり	241	503	681	1,027	1,497	3,301	6,107	13,357
	服薬なし	26,878	33,935	31,630	28,914	33,007	54,041	82,129	290,534
	合計	27,119	34,438	32,311	29,941	34,504	57,342	88,236	303,891
割合(%)	服薬あり	0.9	1.5	2.1	3.4	4.3	5.8	6.9	4.4
	服薬なし	99.1	98.5	97.9	96.6	95.7	94.2	93.1	95.6
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

習慣的な喫煙者

習慣的喫煙者の割合は、図 22 のとおり男性 32.0%、女性が 9.6%となった。医療保険者別年齢階級別習慣的喫煙者の割合は、男性が図 23-1、女性が図 23-2 のとおりとなった。




図 22 習慣的喫煙者の割合




図 23-1 医療保険者別習慣的喫煙者の割合（男性）




図 23-2 医療保険者別習慣的喫煙者の割合（女性）

習慣的に喫煙している者の割合は、いずれの年齢階級においても男性が女性より多かった。男性は図 24-1、表 11-1 のとおり 40～44 歳では 43.1%で一番高く年齢階級が上がるにしたがって減少し、70～74 歳では 16.1%であった。

女性は図 24-2、表 11-2 のとおり 45～49 歳は 17.5%であったが、年齢階級が上がるにしたがって減少し 70～74 歳では 3.6%であった。




図 24-1 習慣的に喫煙している者 市町村国保+協会けんぽ(男性)




図 24-2 習慣的に喫煙している者 市町村国保+協会けんぽ(女性)

表 11-1 習慣的に喫煙している者の割合 市町村国保+協会けんぽ(男性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数(人)	非喫煙	21,794	27,251	23,351	19,646	21,207	35,672	58,138	207,059
	喫煙	16,536	19,484	16,661	12,280	10,381	10,882	11,188	97,412
	合計	38,330	46,735	40,012	31,926	31,588	46,554	69,326	304,471
割合(%)	非喫煙	56.9	58.3	58.4	61.5	67.1	76.6	83.9	68.0
	喫煙	43.1	41.7	41.6	38.5	32.9	23.4	16.1	32.0
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 11-2 習慣的に喫煙している者の割合 市町村国保+協会けんぽ(女性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
人数(人)	非喫煙	22,941	28,423	27,075	25,980	31,225	54,152	85,071	274,867
	喫煙	4,178	6,015	5,236	3,961	3,279	3,191	3,166	29,026
	合計	27,119	34,438	32,311	29,941	34,504	57,343	88,237	303,893
割合(%)	非喫煙	84.6	82.5	83.8	86.8	90.5	94.4	96.4	90.4
	喫煙	15.4	17.5	16.2	13.2	9.5	5.6	3.6	9.6
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

慢性腎臓病（受診勧奨群と保健指導群）

慢性腎臓病受診勧奨群の割合は、図 25 のとおり男性 6.7%、女性が 3.7%となり、保健指導群の割合は、男性 20.6%、女性が 19.1%となった。医療保険者別年齢階級別の慢性腎臓病受診勧奨群及び保健指導群の割合は、男性が図 26-1、女性が図 26-2 のとおりとなった。




図 25 慢性腎臓病受診勧奨又は保健指導群の割合




図 26-1 医療保険別慢性腎臓病受診勧奨又は保健指導群の割合（男性）




図 26-2 医療保険別慢性腎臓病受診勧奨又は保健指導群の割合（女性）

慢性腎臓病該当（受診勧奨群と保健指導群）の割合は男性が図 27-1、表 12-1 のとおり 40～44 歳 14.9%、70～74 歳で 41.8%となった。女性では図 27-2、表 12-2 のとおり 40～44 歳 11.8%、70～74 歳で 32.7%となった。

慢性腎臓病の受診勧奨群の割合は男性 40～44 歳 3.3%、70～74 歳で 11.0%となった。女性では 40～44 歳 2.5%、70～74 歳で 5.5%となった。

慢性腎臓病の保健指導群（保健指導 1 及び 2）の割合は男性 40～44 歳 11.6%、70～74 歳で 30.8%となった。女性では 40～44 歳 9.4%、70～74 歳で 27.2%となった。




図 27-1 慢性腎臓病該当の割合 市町村国保 + 協会けんぽ（男性）




図 27-2 慢性腎臓病該当の割合 市町村国保 + 協会けんぽ（女性）

表 12-1 慢性腎臓病受診勧奨群又は保健指導群該当の割合 市町村国保+協会けんぽ(男性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計	
人数 (人)	非該当	31,566	37,654	30,898	23,391	21,193	28,686	38,522	211,910	
	受診勧奨群	1,237	1,744	1,820	1,706	1,956	3,841	7,258	19,562	
	保健指導群	4,302	5,781	5,877	5,547	6,559	11,639	20,405	60,110	
	再掲	保健指導1	3,490	3,838	3,278	2,487	2,432	3,987	6,411	25,923
		保健指導2	812	1,943	2,599	3,060	4,127	7,652	13,994	34,187
	合計		37,105	45,179	38,595	30,644	29,708	44,166	66,185	291,582
割合 (%)	非該当	85.1	83.3	80.1	76.3	71.3	65.0	58.2	72.7	
	受診勧奨群	3.3	3.9	4.7	5.6	6.6	8.7	11.0	6.7	
	保健指導群	11.6	12.8	15.2	18.1	22.1	26.4	30.8	20.6	
	再掲	保健指導1	9.4	8.5	8.5	8.1	8.2	9.0	9.7	8.9
		保健指導2	2.2	4.3	6.7	10.0	13.9	17.3	21.1	11.7
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	慢性腎臓病 該当	14.9	16.7	19.9	23.7	28.7	35.0	41.8	27.3	

表 12-2 慢性腎臓病受診勧奨群又は保健指導群該当の割合 市町村国保+協会けんぽ(女性)

		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計	
人数 (人)	非該当	20,290	25,776	24,371	21,643	23,914	39,323	56,500	211,817	
	受診勧奨群	567	776	622	605	889	2,022	4,641	10,122	
	保健指導群	2,142	3,072	3,312	3,983	5,452	11,676	22,841	52,478	
	再掲	保健指導1	1,760	2,031	1,555	1,334	1,630	3,467	6,480	18,257
		保健指導2	382	1,041	1,757	2,649	3,822	8,209	16,361	34,221
	合計		22,999	29,624	28,305	26,231	30,255	53,021	83,982	274,417
割合 (%)	非該当	88.2	87.0	86.1	82.5	79.0	74.2	67.3	77.2	
	受診勧奨群	2.5	2.6	2.2	2.3	2.9	3.8	5.5	3.7	
	保健指導群	9.3	10.4	11.7	15.2	18.0	22.0	27.2	19.1	
	再掲	保健指導1	7.7	6.9	5.5	5.1	5.4	6.5	7.7	6.7
		保健指導2	1.7	3.5	6.2	10.1	12.6	15.5	19.5	12.5
	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	慢性腎臓病 該当	11.8	13.0	13.9	17.5	21.0	25.8	32.7	22.8	