

◇連携シール活用例 (HP から引用)

宮崎県都城市

CKDシールの見本



都城市CKD予防連携 医療機関

「定期的なGFR検査が大切で、腎臓病は静かに進行し、気づかぬうちに、命を削ぐ大敵です。」

検査年月日	
クレアチニン (μmol/L)	
eGFR (ml/分/1.73m ²)	
尿蛋白	
尿糖 (WBC)	
医師の氏名	
HbA1c (%)	
ACR (尿蛋白/1.73m ² /100g)	



都城市CKD予防連携医が78名になりました！(平成30年3月30日更新)

都城市CKD予防連携医療機関は、ステッカーで確認できます

静岡県藤枝市

守れ腎臓!
ふじえだCKDネットが守ります!!
(慢性腎臓病)

腎臓の働きを示す数値が低いにに対し、お薬手帳カーにシールを貼る。腎臓の働き具合の合った薬の処方を受けることができます。

- ① 薬の量を調節します
- ② 腎臓の負担を軽くします
- ③ 腫れで早期発見!

腎機能に合った薬の処方
減量のすすめ
腫れのすすめ

成人の8人に1人が慢性腎臓病(CKD)といわれています。
慢性腎臓病は自覚症状もなく進行し、心臓病や脳卒中、出血を促す原因にもなります。

Check! CKD

「チェック! CKDシール」

群馬県

滋賀県

CKDシールを お薬手帳にはりましょう

お薬の記録をいしますので処方箋と一緒に窓口にお出ください

おくすり手帳
受診時の薬局で、医師の処方箋が薬剤師に見てください!

お薬手帳はいつでも持ち歩きましょう

CKD

年	月	日
Cr()		
eGFR値()		
CKDステージ		
G3a-G3b-G4-G5-G5D		

CKDステージについて

eGFR(ml/分/1.73m ²)	
G1	≥90
G2	60~89
G3a	45~59
G3b	30~44
G4	15~29
G5	<15
G5D	透析施行

おくすり手帳はひとり1冊にまとのましよう
すべての処方箋で使えます

群馬県医師会 群馬県歯科医師会
群馬県薬剤師会 群馬県病院薬剤師会

お薬手帳のCKDシールがあなたの腎臓の状態を知らせてくれます。

GFR(糸球体ろ過値)は、腎臓が1分間にろ過する血液の量です。

		青：低リスク	黄：中リスク	赤：高リスク
糖尿病性腎症	シール			
	選定	1期（腎症前期）	2期（早期腎症期） 3期（顕性腎症期）	4期（腎不全期）
	対策	減塩指導 検査：6～12か月	減塩指導 検査：3～6か月 1～3か月	減塩・低蛋白質食指導 検査：毎月
網膜症	シール			
	選定	異常無	単純網膜症	増殖前網膜症 増殖網膜症
	対策	検査：6～12か月	検査：3～6か月	検査：1～2か月 2週間～1か月
フットケア	シール			
	選定	足病変 自己管理可能	足病変 経過観察要	足病変有 ケアが必要
	対策	ケア：6か月以降	ケア：2～5か月	ケア：毎月
歯周病	シール			
	選定	異常無	軽症 中等症	重症
	対策	検査：1年 自己管理	検査：6～12か月 3～6か月	検査：3～6か月

（提供：八幡浜市）

合併症判別シール。糖尿病患者の合併症の現状を瞬時に把握できる。



※2の糖尿病連携シールを※1の糖尿病連携手帳の表紙に貼ります



糖尿病での受診だけでなく、必要な他科の受診状況や指導を受けた状況が一目で分かります

糖尿病連携手帳に糖尿病連携シールを貼ると図のようになります。

★このステッカーが目印です



CKD対策推進「病診連携医」とは

熊本市のCKD対策の推進にご協力いただける、かかりつけ医の先生方を、熊本市のCKD対策推進「病診連携医」として登録し、本市のホームページで公開するとともに、健診受診者への紹介などに活用させていただきます。