


第2章 調査の結果

第1節 1歳6か月児及び3歳児歯科保健実態調査


(1) 保護者の年齢

アンケートに回答されるあなた（保護者）の年齢を教えてください。




(2) 性別

お子さまの性別を教えてください。



(3) 出生順位

お子さまの出生順位を教えてください。




(4) 主な保育者

昼間に主に保育される方はどなたですか。

全体では、「母親」が60.4%で最も高く、次いで「保育士」が36.6%となっている。


性別で見ると、大きな違いはみられない。

年齢別で見ると、どちらも「母親」が最も高いが、3歳児では「保育士」の割合が増加している。




【経年比較】

平成 22 年度調査と比較すると、「保育士」は 1 歳 6 か月児で 12.7 ポイント、3 歳児で 16.3 ポイント、それぞれ増加している。一方、「母親」は 1 歳 6 か月児で 11.6 ポイント、3 歳児で 16.6 ポイント、それぞれ減少している。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(5) 仕上げみがき

お子さまに仕上げみがきをしていますか。

全体では、「毎日している」が 88.1%で最も高く、次いで「時々する」が 10.2%、「していない」が 1.4%となっている。


性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、「毎日している」は3歳児で 92.3%と高くなっている。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(5-1) 仕上げみがきをしている時間帯

＜お子さまに仕上げみがきを「毎日している」と答えた方に＞
 仕上げみがきをいつしていますか。該当する項目にいくつでも○を付けてください。

全体では、「夜寝る前」が76.8%で最も高く、次いで「朝食後」が30.1%、「夕食後」が22.3%となっている。


性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、「夜寝る前」は3歳児で78.7%と高くなっている。




【う蝕の状況別】

< 1歳6か月児 >




< 3歳児 >




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(6) 仕上げみがきの自信

お子さまの仕上げみがきに自信がありますか。

全体では、「自信がある」が 13.1%、「自信がない」は 44.9%となっている。


性別でみると、「自信がない」は男子が女子より 5.2 ポイント高くなっている。

年齢別でみると、「自信がある」は 3 歳児が 1 歳 6 か月児より 9.3 ポイント高くなっている。




【経年比較】

平成 22 年度調査と比較すると、大きな傾向の違いはみられない。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(7) フッ素入り歯みがき剤の使用

お子さまにフッ素入りの歯みがき剤を使っていますか。

全体では、「使っている」が 66.9%、「使っていない」は 30.3%となっている。


性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、「使っている」は3歳児で 82.1%と高くなっている。一方、「使っていない」は1歳6か月児で 42.4%と高くなっている。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(8) 歯みがき剤の選択にフッ素入りを考慮しているか

お子さまの歯みがき剤を選ぶときに、フッ素入りを考慮していますか。

全体では、「している」が73.3%、「していない」は22.7%となっている。


性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、1歳6か月児に比べ、3歳児では「している」割合が高くなっている。




【経年比較】

平成22年度調査と比較すると、「している」は1歳6か月児で12.3ポイント、3歳児で7.1ポイント、それぞれ増加している。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(9) フッ化物の塗布

お子さまは歯にフッ化物の塗布を受けたことがありますか。


全体では、「受けたことがある」が38.8%、「受けたことがない」は58.3%となっている。
性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、「受けたことがある」は1歳6か月児では13.5%であるが、3歳児では69.4%と高くなっている。




【経年比較】

平成 22 年度調査と比較すると、「受けたことがある」は1歳6か月児で 5.8 ポイント、3歳児で 11.7 ポイント、それぞれ増加している。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(10) 母乳

お子さまは母乳をいつまで飲んでいましたか。


全体では、「1歳未満まで」が42.6%で最も高く、次いで「1歳3か月頃まで」が20.4%となっている。

性別でみると、大きな違いはみられない。




【経年比較】

平成 22 年度調査と比較すると、「1 歳 3 か月頃まで」は 1 歳 6 か月児で 5.7 ポイント、3 歳児で 4.7 ポイント、それぞれ増加している。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(11) 哺乳ビン

あなた（保護者）はお子さまに哺乳ビンをいつまで使っていましたか。

全体では、「1歳未満まで」が38.1%で最も高く、次いで「使わなかった」が28.8%となっている。


性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、「使わなかった」は3歳児で33.0%と高くなっている。




【経年比較】

平成22年度調査と比較すると、「1歳未満まで」は1歳6か月児で4.9ポイント、3歳児で4.7ポイント、それぞれ増加している。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(12) 子ども専用の食器

お子さまの食器（お皿、スプーン、コップ等）はお子さん専用のものですか。

全体では、「子ども専用」が69.4%で最も高く、次いで「どちらの場合もある」が24.6%、「大人と共用」が4.1%となっている。


性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、「子ども専用」は1歳6か月児で72.2%と高くなっている。




【経年比較】

平成22年度調査と比較すると、「どちらの場合もある」は3歳児で10.6ポイント増加している。一方、「子ども専用」は3歳児で14.3ポイント減少している。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(13) おやつ回数

お子さまの1日のおやつ（甘味食品・飲料）の回数は決めていますか。

全体では、「1日1～2回」が83.0%で最も高く、次いで「欲しがるたびにまたは1日3回以上」が8.9%、「ほとんど与えていない」が6.3%となっている。


性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、大きな違いはみられない。




【経年比較】

平成 22 年度調査と比較すると、大きな傾向の違いはみられない。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(14) おやつの量と時間

お子さまのおやつ（甘味食品・飲料）の量と時間を決めていますか。

全体では、「決めている」が 58.7%、「決めていない」は 39.3%となっている。


性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、大きな違いはみられない。




【経年比較】

平成 22 年度調査と比較すると、大きな傾向の違いはみられない。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(15) 歯の健康についての心配事

お子さまの歯・口の中で心配なことはありますか。該当する項目にいくつでも○を付けてください。

全体では、「歯みがき」が 35.8%で最も高く、次いで「歯の生え方」が 19.5%、「指しゃぶり」が 16.3%となっている。


性別でみると、「歯みがき」は男子が女子より 4.5 ポイント高くなっている。

年齢別でみると、「歯みがき」は1歳6か月児で42.8%と高くなっている。また、「歯の生え方」は1歳6か月児で23.1%と高く、「かまない」は1歳6か月児で18.4%と高くなっている。



【経年比較】

平成 22 年度調査と比較すると、「歯みがき」は 3 歳児で 3.9 ポイント、「かみあわせ」は 1 歳 6 か月児で 4.0 ポイント、それぞれ減少している。一方、「かまない」は 1 歳 6 か月児で 4.0 ポイント増加している。




(16) 子どものかかりつけ歯科医の有無

お子さまには定期的に歯科健診を受けるなど、かかりつけ歯科医師がいますか。

全体では、「はい」が 32.9%、「いいえ」は 65.3%となっている。


性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、「はい」は 1歳6か月児で 18.0%であるが、3歳児では 50.8%と高くなっている。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(17) 保護者の歯科健診の受診状況

あなた（保護者）は年に1回歯科健診を受けていますか。

全体では、「はい」が44.7%、「いいえ」は53.6%となっている。


性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、「はい」は3歳児で48.2%と高くなっている。一方、「いいえ」は1歳6か月児で56.1%と高くなっている。




【経年比較】

平成22年度調査と比較すると、大きな傾向の違いはみられない。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




(18) 保護者のかかりつけ歯科医の有無

あなた（保護者）はかかりつけ歯科医師がいますか。

全体では、「はい」が 65.9%、「いいえ」は 32.5%となっている。


性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、「はい」は 3 歳児で 69.5%と高くなっている。一方、「いいえ」は 1 歳 6 か月児で 35.2%と高くなっている。




【う蝕の状況別】


< 1歳6か月児 >




【う蝕の状況別】



< 3歳児 >




【う蝕の状況別】




【う歯数別】

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >



(19) う蝕の状況


1歳6か月児では、「O1」が54.3%で最も高く、次いで「O2」が40.9%となっている。

性別でみると、大きな違いはみられない。


3歳児では、「O」が80.5%で最も高く、次いで「A」が8.9%となっている。

性別でみると、大きな違いはみられない。

< 1歳6か月児 >



< 3歳児 >




【経年比較】


平成 22 年度調査と比較すると、1 歳 6 か月児では、「O 1」が 3.1 ポイント増加している。一方、「O 2」が 5.7 ポイント減少している。

3 歳児では、「O」が 3.7 ポイント増加している。一方、「A」が 7.0 ポイント、「B」が 3.8 ポイント、それぞれ減少している。

< 1 歳 6 か月児 >



< 3 歳児 >



(20) う歯数

全体では、う歯のある子どもの割合（「0本」と無回答を除いた割合）は、5.9%となっている。
性別でみると、大きな違いはみられない。

年齢別でみると、1歳6か月児で「0本」は70.5%、う歯のある子どもは1.0%、無回答は28.5%となっている。また、3歳児で「0本」は63.8%、う歯のある子どもは12.1%、無回答は24.1%となっている。

