

# 家畜衛生だより



中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会  
〒262-0011 千葉市花見川区三角町656  
Tel: 043-250-4141 (夜間・休日対応)  
Fax: 043-286-0090  
(公社)千葉県畜産協会

## 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の疑似患畜を確認！ 国内 39, 40, 41, 42, 43 例目

( 鹿児島県10, 11例目、福岡県1例目、広島県2例目、岡山県4例目 )

12月19日現在、国内の家きんでは、21道県、43事例の発生が報告されています。

例目	所在地	飼養状況	通報等	疑似患畜確定日
39	鹿児島県南九州市	約3.5万羽(採卵鶏)	家きんの異状	12月18日
40	福岡県糸島市	約5.4万羽(採卵鶏)	死亡羽数増加	12月19日
41	鹿児島県阿久根市	約7万羽(採卵鶏)	家きんの異状	12月19日
42	広島県世羅町	約18.7万羽(採卵鶏)	死亡羽数増加	12月19日
43	岡山県美咲町	約2.3万羽(あひる(あいがも))	死亡羽数増加	12月20日



12月19日現在、国内では飼養鳥で3県4例、野鳥では、19道県、118事例の発生が確認されています。

**渡り鳥や野鳥の糞により農場敷地内にウイルスが残存する可能性を  
念頭に鶏舎内へのウイルス侵入防止対策を徹底してください！**

### 発生予防のための基本的な対策を必ず徹底してください！

- ①農場内、鶏舎周囲の消毒
- ②農場に入る際の専用衣服と長靴への交換
- ③手指消毒の上、長靴の消毒は汚れをしっかりと落としてから実施

**家きんの異状を見つけたら、速やかに家畜保健衛生所へ通報を！**

★死亡率の急激な上昇(通常の上昇の2倍以上)

★鳥インフルエンザを疑うような症状

【高病原性および低病原性鳥インフルエンザの特定症状】

沈うつ、鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、産卵率の低下、まとまった死亡 等

お問い合わせ・ご連絡は、千葉県中央家畜保健衛生所まで

TEL. 043-250-4141

FAX. 043-286-0090

※休日、夜間は転送されますので、必ず5回以上のコールをお願いします。