


衛生だより



令和2年度第47号(12月)発行

北部家畜保健衛生所

東部・北部家畜防疫獣医師会

〒287-0004 香取市岩ヶ崎台12-1

Tel: 0478-54-1291 Fax: 54-5996

夜間・休日緊急(転送されます)

(公社)千葉県畜産協会

〒260-0021 千葉市中央区新宿1-2-3

宮崎県での養鶏場・食鳥処理場で 高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)疑似患畜を確認!(国内26例目)

国内26例目

農場所在地 : 宮崎県 日向市
飼養状況 : 肉用鶏(約4.6万羽)
食鳥処理場所在地 : 宮崎県 川南町
: 肉養鶏(約2万羽、未処理係留中)

経緯 12月14日、死亡鶏増加の通報を受け、宮崎県が立入、簡易検査陽性を確認。
同日、遺伝子検査で、H5亜型のHPAI疑似患畜であることを確認。

鶏舎周囲、農場周縁への
消石灰散布を
徹底してください!!

鳥インフルエンザ侵入防止のため、至急、以下の再点検をお願いします!

- 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
- 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置、使用
- 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
- 家きん舎ごとの手指消毒等
- 家きん舎ごとに専用の長靴を設置、使用
- 野生動物の侵入を防止するためのネット等の設置、点検及び修繕
- ねずみ及び害虫の駆除



鶏舎ごとの手袋の交換でもOK

交換!

鶏舎壁、収卵・除糞ベルトなどの隙間対策も忘れずに!

今季のHPAIウイルスは、死亡までの期間が長いのが特徴! 早期発見には、死亡数の増加にこれまで以上の注意が必要です!

今季、香川で最初に分離されたHPAIウイルスについて、農研機構が調べたところ、以下の特徴があることが分かりました。

- 試験的に感染させた鶏の死亡率は100%で、高い致死性を有する。
- 全羽死亡するまでの期間は最長6日間(過去のHPAIウイルスでは2~3日)
- 今季のウイルスは死亡するまでの時間が長い傾向あり)

これらの特徴から、HPAIのまん延防止には、早期発見・早期通報が必要です。
以下の場合、速やかに管轄の家畜保健所までご連絡ください!

- 死亡率の急激な上昇(通常の上昇の2倍以上)
- 死亡率が2倍未満であっても、まとまって死亡、元気がない、餌食いが悪い、沈うつ等、通常と異なる症状が認められる

鶏の様子がおかしいと思ったら...

北部家畜保健衛生所 Tel.0478-54-1291 Fax.0478-54-5996
夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください