



## 香川県で高病原性鳥インフルエンザ続発！ 6例目（および6例目の関連4農場）・7例目の疑似患畜確認

### 6例目：三豊市採卵鶏農場（約14万7千羽）

#### ※6例目の疫学関連農場 計4農場（20万8千羽）

患畜又は疑似患畜が確認された  
農場と同一の飼料運搬車両等が  
出入りしている農場

（ア）採卵鶏（約 1万9千羽）

（イ）採卵鶏（約 11万6千羽）

（ウ）肉用鶏（約 5万7千羽）

（エ）肉用鶏（約 1万6千羽）

- ・11/19、当該農場管理者から西部家畜保健衛生所に「死亡羽数の増加」の連絡
- ・県が立入検査を行い、簡易検査を実施したところ、13羽中11羽（死亡鶏11羽中10羽、生存鶏2羽中1羽）の陽性を確認
- ・遺伝子検査の結果、H5亜型であり、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認

### 7例目：三豊市採卵鶏農場（約49万5千羽）

- ・11/19、当該農場管理者から西部家畜保健衛生所に「死亡羽数の増加」の連絡
- ・県が立入検査を行い、簡易検査を実施したところ、13羽中2羽（死亡鶏11羽中1羽、生存鶏2羽中1羽）の陽性を確認
- ・遺伝子検査の結果、H5亜型であり、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認

## 疫学関連農場が疑似患畜となる場合

発生から遡って7日～現在までの間に、

- ・発生農場で飼養管理を行った者が、発生農場に立ち入り後、他の農場においても飼養管理を行った場合
- ・発生農場の家きんと接触したことが明らかになった家きん

鳥インフルエンザが発生した場合、過去21日間の「家きんの移出入」「複数農場の衛生管理区域内で作業を行う人・車両の出入り」「卵・堆肥の出荷」を調査します。発生の日以内に他の農場等の衛生管理区域に出入りした場合には、消毒の実施状況等を勘案して、その農場に飼養されている家きんを「疫学関連家きん」とします。感染拡大の防止には、早期の疫学関連家きんの特定が重要です。発生を疑う場合、すみやかな調査のために、飼養衛生管理基準に定められた記録の保管を実施してください。

## 飼養衛生管理基準の再徹底を！

### <衛生管理区域内に入る・出る際>

- 【人】 専用の衣服・長靴の着用、手指消毒、必要のない者はいれない
- 【車両、物品】 荷台・タイヤ・フロアマット等の洗浄・消毒

### <記録の作成・保管>

人、車両、物品、鶏・卵の導入・出荷、鶏の異状、消毒実施の有無等

# 令和2年度 国内における高病原性鳥インフルエンザ発生状況

(令和2年11月20日時点)

## 家きん 1県7事例

都道府県	市町村	疑似患畜判定日	飼養状況	病原性	亜型
香川県	三豊市	R2.11.5	採卵鶏約32万羽	高	H5N8
香川県	東かがわ市	R2.11.8	採卵鶏約4.6万羽	高	H5N8
香川県	三豊市	R2.11.11	肉用種鶏約1.1万羽	高	H5N8
香川県	三豊市	R2.11.13	肉用種鶏約1.1万羽	高	H5N8
香川県	三豊市	R2.11.15	採卵鶏約7.9万羽	高	H5N8
香川県	三豊市	R2.11.20	採卵鶏約15万羽		H5
香川県	三豊市	R2.11.20	採卵鶏約46万羽		H5

● 家きん  
★ 野鳥等

## 野鳥 2道県3事例(検査中2事例)

都道府県	市町村	検体回収日	検体	病原性	亜型
北海道	紋別市	R2.10.24	糞便	高	H5N8
鹿児島県	出水市	R2.11.9	環境試料(水)	高	H5N8
鹿児島県	出水市	R2.11.5	糞便	高	H5N8
鹿児島県	出水市	R2.11.15	死亡野鳥	検査中	検査中
鹿児島県	出水市	R2.11.16	死亡野鳥	検査中	検査中

鹿児島県出水市で、11月15日(日)にオナガガモ1羽、16日(月)にスズガモ1羽の死体が回収され、A型鳥インフルエンザウイルス遺伝子の陽性が確認されました。※現時点では、遺伝子検査により陽性が確認された段階である為、病性は未確定であり、高病原性鳥インフルエンザが確認されたわけではありません。今後、鹿児島大学で確定検査を実施予定。



## 農場全体で警戒を高め、早期に対策の実施をお願いします！

国内の養鶏農家および野鳥において、例年になく早さで高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。農場および観光牧場で鶏に関わる全ての方々や鶏を愛玩飼育されている方におかれましては、なお一層の危機意識を強め、早期に飼養衛生管理の見直し等の対策をお願いします。

## 高病原性鳥インフルエンザ防疫のため、以下の徹底を！！

- ☆ 農場に出入りする際の人・物・車の消毒の徹底
- ☆ 鶏舎周辺、農場敷地周縁への消石灰散布
- ☆ 家きん舎ごとの長靴・手袋・作業着の交換、長靴・手指の消毒の実施
- ☆ 防鳥ネット※・金網・ロールカーテン等の破損の確認、修繕  
※防鳥ネットの網目の大きさは2 cm以下又はこれと同等の効果を有するもの
- ☆ 鶏舎の隙間(壁、集卵ベルト、除糞ベルトなど)の確認・補修  
→段ボールによる応急措置も含めて早急に対策をお願いします。
- ☆ 毎日の健康観察、早期発見・早期通報

「死亡家きんが増えた」「元気消失した家きんが増えた」など  
**何か少しでも異常を見つけた場合には、直ちに家畜保健衛生所に連絡を！**

南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX 04-7092-1434

※休日、夜間は転送されますので必ず5回以上のコールをお願いします。