



## 兵庫県で国内10例目の高病原性鳥インフルエンザ発生 淡路市・採卵鶏農場

### 1. 農場の概要

所在地：兵庫県淡路市

飼養状況：採卵鶏農場（約14万6000羽）

### 2. 経緯

- ・11/25（水）兵庫県は「死亡鶏の増加」の通報を受けて、当該農場に対し移動の自粛を要請するとともに立入検査を実施。  
インフルエンザ簡易検査を実施し陽性を確認。  
当該鶏について遺伝子検査を実施した結果、H5亜型であり、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。



## 新潟県で採取された〈水〉から 高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N8亜型）が 検出されました（野鳥国内5例目）

### ・経緯

11月16日（月）

新潟県阿賀野市の環境試料〈水〉を採取

11月25日（水）

鳥取大学が検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N8亜型）が検出。  
採取地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化。



## 毎月1日は『一斉消毒の日』です、 以下の徹底を！！

- 1 農場に出入りする際の人・物・車の消毒の徹底。
- 2 家きん舎ごとの長靴・手袋・作業着の交換、長靴・手指の消毒の実施。
- 3 鶏舎周辺、農場敷地周縁への消石灰散布。
- 4 踏込み消毒槽の薬液を交換。
- 5 防鳥ネット※・金網・ロールカーテン等の破損の確認、修繕。鶏舎の隙間（壁、集卵ベルト・除糞ベルトなどの開口部）の確認・補修。  
※防鳥ネットの網目の大きさは2 cm以下又はこれと同等の効果を有するもの
- 6 畜舎周囲の整理・清掃・除草を実施。

☆以下の家きんの異状を確認次第、すぐに家畜保健衛生所まで通報してください！

- ・死亡率の急激な上昇（通常のアverage死亡率の2倍以上）
- ・鳥インフルエンザを疑う症状（脚部皮下の出血、肉冠の出血・壊死等）



死亡率の増加←



顔面・とまかの  
浮腫・チアノーゼ←

南部家畜保健衛生所

TEL 04-7092-2304

FAX 04-7092-1434

※休日、夜間は転送されますので必ず5回以上のコールをお願いします。