



家畜衛生だより



令和4年度42号(鶏) 令和4年12月発行

南部家畜防疫協議会
(公社)千葉県畜産協会
千葉県南部家畜保健衛生所
〒296-0033 鴨川市八色52
電話 04(7092)2304
FAX 04(7092)1434

正しく消毒できていますか？ ～消石灰～

消石灰は家きん舎周囲及び農場外縁部に散布しましょう。

散布量目安

- ・ 日常
→床面が白くなるように
十分に散布
- ・ 伝染病発生時
→1㎡あたり1kgを目安に
均一に散布



効果

- ・ 野生動物の忌避効果がある。
- ・ 水を加えると**アルカリ**になり、待ち受け消毒として効果が出る。
※消毒したい対象に含まれる水分量で作用時間が変化。
(例：糞便は6時間以上で効果を発揮。)

乾燥したコンクリート上への散布時は
消石灰1袋(20kg)に3~4Lの水
を散布すると効果的です！

注意

- ・ 粉の状態では瞬時に病原体を殺滅できない。
石灰帯を車が通過することによるタイヤの消毒(車両消毒)
長靴で歩くことによる靴底の消毒・踏込消毒 } には不向き。
- ・ 雨で3回以上濡れると、効果が減弱する。
- ・ 野外散布後3週間以上経つと炭酸カルシウムに変化し、殺菌効果が減弱する。

高病原性鳥インフルエンザの発生について(国内33、34例目)

例目	所在地	飼養状況	通報等	疑似患畜確定日
33	香川県三豊市	約8万羽(採卵)	死亡羽数増加	12/11
34	鹿児島県出水市	約6万羽(採卵)	死亡羽数増加	12/7
34例目疫学関連農場	鹿児島県出水市	1農場、約7.4万羽	—	—

家きんの異常を見つけたら、速やかに家畜保健衛生所に通報を！

《高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの特定症状》

鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低下、まとまった死亡 など

千葉県南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX 04-7092-1434

※休日、夜間は転送されますので必ず5回以上のコールをお願いします。