

# 家畜衛生だより



令和2年4月第2号（豚）  
東部・北部家畜防疫獣医師会  
（公社）千葉県畜産協会  
東部家畜保健衛生所  
TEL：0475（52）4101  
FAX：0475（52）3335  
<http://www.pref.chiba.lg.jp/kh-toubu/index.html>

## ゴールデンウィークに備え 更なる防疫対策の徹底を！

昨年発生が確認された新型コロナウイルス(COVID-19)の人への感染が世界的に拡大し、日本を含め各国・地域で海外渡航の自粛等、感染拡大を防止する措置がとられ、人・モノの移動が減少している状況ですが、近隣諸国ではアフリカ豚熱(ASF)、口蹄疫の発生が継続しています。また、我が国で発生が相次いだ豚熱(CSF)については、東アジアから何らかの形で侵入したことが指摘されています。

引き続き、海外からの家畜伝染病の病原体侵入に対する警戒を怠ることなく、以下の対策を徹底しましょう。

★農場の従業員も含めた畜産関係者は、  
発生国への渡航を自粛しましょう！



1 農場へ部外者を入れない、不要なものは持ち込まない！

2 立入者衣服交換！手指消毒！

衛生管理区域に入る人には専用衣服と長靴の着用をさせましょう！

3 野生動物の侵入防止！

適切な防護柵、防鳥ネットを設置しましょう！

4 毎日の健康観察！早期発見及び早期通報！

異常を認めたら、直ちに当所に通報してください！

5 従業員への教育！

農場への病原体持ち込み防止や、農場内外での肉製品などを含む畜産物の放置禁止を徹底しましょう！

# CSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)の特定症状

- ①耳翼、下腹部、四肢等に紫斑がある
- ②同一の豚房・豚舎内で、以下のいずれかの症状を示す豚が概ね1週間  
の間に増加している
  - (1)40℃以上の発熱、元気消失、食欲減退
  - (2)便秘、下痢
  - (3)結膜炎(目やに)
  - (4)歩行困難、後軀麻痺、けいれん
  - (5)削瘦、被毛粗剛、発育不良(ひね豚)
  - (6)流死産等の異常産の発生
  - (7)血液凝固不全に起因した皮下出血、皮膚紅斑、  
天然孔からの出血・血便
- ③同一の畜舎内で、概ね1週間の間に複数の繁殖豚または肥育豚が突然  
死亡すること
- ④[血液検査を実施した場合]  
同一の豚房・豚舎内で複数の豚が白血球の減少(1万個未満/ $\mu$ l)また  
好中球の核の左方移動が確認されること

養豚農家の皆様へ

CSFワクチン接種豚をと畜場などに移動させる時は、  
蛍光赤又はピンクのスプレーでVと記してください！

## 【塗装の方法】

- ・「V」字の上部を豚の頭側にする
- ・可能な限り、左右対称な「V」とする

※CSFワクチン接種後20日間とはと畜場への出荷はできません！

豚の様子がおかしいな、と思ったら…

東部家畜保健衛生所

Tel.0475-52-4101

※夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください