家畜衛生だより



令和８年度３０号（鶏） 令和８年１０月発行

東部家畜防疫協議会
（公社）千葉県畜産協会
東部家畜保健衛生所
TEL：０４７９（８５）８９００
FAX：０４７９（８５）５９３２
http://www.pref.chiba.lg.jp/kh-toubu/index.html

千葉県内で野生カモ類の糞便から低病原性鳥インフルエンザウイルス(H7亜型)が検出されました。

高病原性鳥インフルエンザ発生予防のため、県内で実施している野生カモ類の糞便のサーベイランス検査において採取した複数の糞便検体から、低病原性鳥インフルエンザウイルス(Ｈ７亜型)が検出されました。

農場・鶏舎へのウイルス侵入に厳重警戒をお願いします！

野生動物・ウイルスの侵入対策の徹底をお願いします！

・野生動物を誘引するような環境が農場内にある場合は、早急に対策を！
　☑餌こぼれ　☑実のなる樹木　☑水場　☑廃棄卵の放置　など

・野生動物が家きん舎に入れない環境づくりの徹底を！
　☑防鳥ネットの設置、破損や隙間の補修
　☑バーコンシャッター、除糞ベルトの蓋などの構造的な隙間への対策

・人・車両・器具によるウイルスの持込み防止

・鶏舎内外の環境整備と消毒の徹底

飼養衛生管理基準の遵守を徹底し、ウイルスの侵入防止対策について再確認をお願いします！

千葉県東部家畜保健衛生所　TEL 0479－85－8900 FAX 0479－85－5932
※急性悪性家畜伝染病（豚熱等）の早期対応のため、疑わしい症状があれば速やかに連絡してください。
※夜間・休日は転送されますので、必ず５回以上コールしてください。

正しく消毒できていますか？
～消石灰について～

消石灰は家きん舎周囲及び農場外縁部に散布しましょう。



【散布量目安】
・日常
→**床面が白くなるように**
十分に散布
・伝染病発生時
→**1㎡あたり1kg**を目安に
均一に散布

【効果】
・水を加えると**強アルカリ**になり、病原体が死滅する。
・屋外の土壌上など、**周りに水分がある環境下**では待ち受け消毒として効果が出る。　※１、２
・野生動物の忌避（足裏）効果がある。　※３

※１　乾燥したコンクリート上への散布時は**消石灰１袋(20kg)に3～4Lの水**を散布すると効果的です。
※２　消毒したい対象に含まれる水分量で作用時間が変化します。
※３　長期間は作用しないため、侵入防止の柵や、防鳥ネットの設置等別途野生動物対策を適切に行う必要があります。

【注意】
・粉の状態では**強アルカリ**ではなく、**瞬時に病原体を殺滅できない。**

石灰帯を車や長靴で通過することにより消毒効果を得る為には、
あらかじめ消毒槽や水でタイヤや長靴を濡らし
消石灰と水を接触させましょう！

・**雨で濡れたり、野外散布後、長期間放置**すると炭酸カルシウムに変化し、殺菌効果が減弱する。⇒定期的な撒き直しが必要です。

【消毒薬の配布について】

★先日の調査で配布を希望した農場には消毒薬が郵送されています。
★東部家保でも配布用の在庫がありますので、お越しいただければ直接お渡しできます。その際は予めのご連絡をお願いします。