

産地:銚子(櫻井1963)	
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~水深20m, 岩礁底)	
574 <i>Velutina (Velutella) pusio</i> A. Adams, 1860	ハナツトガイ
産地:館山湾(奥谷ら*), 藤浦(大島1993), 銚子(渡辺1988)	
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深250m, 砂底)	
575 <i>Velutina (Velutella) cryptospira</i> Middendorff, 1849	ウスカワハナツト
分布:北海道~九州(水深10~50m)	
576 <i>Velutina (Limmeria) bulla</i> Habe, 1958	マルハナツト
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖・越前沖以北, 北海道西南部(潮間帯下部~水深80m, 砂底)	
Superfamily Naticoidea	タマガイ上科
Family Naticidae	タマガイ科
577 <i>Bulbus tenuiculus</i> (Sowerby III, 1915)	クリガイ
産地:銚子(鹿股ら1962; 20~50fms.: 稲葉1963a)	
分布:銚子沖・能登半島以北, 北海道オホーツク海(水深20~50m, 砂泥底)	
578 <i>Bulbus flagilis</i> (Leach, 1819)	ウスカワクリガイ
産地:銚子(20~50fms.: 稲葉1963a;b; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)	
分布:銚子沖以北, 北海道, サハリン, アリューシャン列島, ア拉斯カ(水深50~200m, 砂泥底)	
579 <i>Euspira pila</i> (Pilsbry, 1911)	タマツメタ
産地:銚子(10~50fms.: 稲葉1963a)	
分布:鹿島灘・若狭湾以北, 北海道, 千島, オホーツク海(水深10~150m, 砂泥底)	
580 <i>Euspira pallida</i> (Broderip & Sowerby, 1829)	ウスイロタマツメタ
産地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995), 銚子(稻葉1963b; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988)	
分布:駿河湾・若狭湾以北, 東北, 北海道, 北極圏(水深50~2,433m, 砂泥底)	
581 <i>Euspira yokoyamai</i> (Kuroda & Habe, 1952)	ヨコヤマオリイレシラタマ
産地:館山湾, 小湊(10~50fms.: 稲葉1963a), 銚子(稻葉1963a;b; 櫻井1964; 渡辺1988)	
分布:房総半島・山口県北部以南, 紀伊半島, 四国(水深70~100m, 砂底)	
582 <i>Euspira sagamiensis</i> Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	サガミオリイレシラタマ
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖以南, 相模湾, 四国, 九州(水深50~760m)	
583 <i>Euspira max</i> (Okutani, 1964)	タネタマツメタ
産地:銚子(稻葉1963)	
分布:銚子沖, 東北沖(水深800~900m, 泥底)	
584 <i>Euspira plicospira</i> (Kuroda, 1961)	キザミタマツメタ
産地:小湊(大島1993), 銚子(稻葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)	
分布:銚子・能登半島以南, 四国, 九州西岸(水深50~450m, 砂泥底)	
585 <i>Euspira nana</i> (Möller, 1842)	シロオビタマツメタ
産地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995), 銚子(渡辺1988)	
分布:駿河湾, 銚子沖, 北海道, 千島(水深50~100m, 泥底)	
586 <i>Euspira miyayensis</i> Oyama, 1952	ミヤタタマツメタ
産地:館山湾, 小湊(10~50fms.: 稲葉1963a), 銚子(稻葉1963a;b; 櫻井1964; 渡辺1988)	
分布:銚子沖, 東京湾, 佐渡島沖(水深200~250m)	
587 <i>Euspira chosiensis</i> Kuroda (MS)	チョウシタマツメタ
産地:銚子(稻葉1963; 渡辺1988)	
分布:銚子・但馬沖以北, 東北(水深20~100m, 砂泥底)	
588 <i>Euspira mis</i> Oyama (MS)	リスタマツメタ
産地:銚子(10~50fms.: 稲葉1963a; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988)	
分布:鹿島灘以南, 四国沖, 能登半島沖	
589 <i>Polinices vestitus</i> Kuroda, 1961	キヌカツギタマツバキ
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖・九州西岸以南, 紀伊, 四国(土佐沖)(水深10~50m, 砂底)	
590 <i>Polinices sagamiensis</i> Pilsbry, 1904	ウチヤマタマツバキ
産地:富津, 漢, 竹岡, 萩生(清水), 館山湾(水深5~10fms.: 稲葉1963a; 田村1987; 佐々木1989; 村越1998; 奥谷ら*; 清水), 鶴川, 藤浦(大島1993), 小湊(猪野1942b; 稲葉1963a; 大島1993), 銚子(渡辺1988)	
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, フィリピン(水深10~40m, 細砂底)	
591 <i>Polinices candidissimus</i> (de Guillemon, 1842)	ムクマンジュウガイ
産地:館山湾(堀越1990)	
分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 九州, 東南アジア(水深10~50m, 砂底)	
592 <i>Polinices albumen</i> (Linnaeus, 1758)	マンジュウガイ
産地:館山湾(龍虎1949; 佐々木1990; 奥谷ら*)	
分布:館山湾・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(潮間帯下部~水深70m, 細砂底)	
593 <i>Polinices mammilla</i> (Linnaeus, 1758)	トミガイ
産地:館山湾(水深5~10fms.: 稲葉1963a; 村越1998)	
分布:駿河湾・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド西太平洋(水深10~30m, 砂底)	
594 <i>Glossaulax didyma</i> (Röding, 1798)	ツメタガイ

- 产地:行徳(岩川1900),小櫃川河口干瀬(秋山1974),木更津(千葉水試1923),鑿洲(清水),富津(千葉水試1922;1956;千葉県企業庁1977-1979;清水),富津岬南(千葉内湾水試1959),大佐和,湊,竹岡,萩生,勝山,富山(清水),富浦(水深9.0m,砂底:水産庁1982;清水),館山湾(稻葉1963a;堀越1990;佐々木1990;村越1998;奥谷ら*;清水),沖ノ島(お茶大館山1973),白浜,千倉(清水),太海,鶴川,天津(大島1993;清水),小湊(猪野1942b;稻葉1963a;堀越ら1987;大島1993;清水),勝浦,御宿,大原(大島1993;清水),九十九里浜(水深5-19m;海老原ら1970;信太ら1994;清水),名洗(千葉県1977a),銚子(鹿股ら1962;稻葉1963a:b;櫻井1963;宇野ら1965;渡辺1988;鶴岡ら1994)
- 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 中国, 東南アジア, インド・西太平洋(潮間帯~水深100m, 細砂底)
- 595 *Glossaulax didyma* form *hosoyai* (Kuroda & Kira in Kira, 1959) ホソヤツメタ
- 产地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(田村1987;奥谷ら*), 小湊, 勝浦(大島1993), 名洗(千葉県1977a), 銚子(稻葉1963;櫻井1963;渡辺1988)
- 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 朝鮮(水深10~30m, 砂泥底)
- 596 *Glossaulax didyma hayashii* (Azuma, 1961) ハヤシツメタ
- 分布:相模湾以南, 遠州灘, 紀伊半島, 四国, 九州(水深10~50m, 細砂底)
- 597 *Glossaulax vesicalis* (Philippi, 1848) ヒメツメタ
- 产地:富津岬南(千葉県企業庁1978), 館山湾(稻葉1963a;田村1987;堀越1990;佐々木1990;村越1998;奥谷ら*), 小湊(稻葉1963a;大島1993), 銚子(鹿股ら1962;稻葉1963a;b;櫻井1963;渡辺1988)
- 分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(水深10~50m, 細砂底)
- 598 *Glossaulax reiniana* (Dunker, 1877) ハナツメタ
- 产地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(稻葉1963a;水深6.9m:田村1987;奥谷ら*), 鶴川(大島1993), 小湊(稻葉1963a), 銚子(10-50fms.:稻葉1963a;櫻井1963;神奈川県博1972;渡辺1988)
- 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深10~50m, 細砂底)
- 599 *Mammila melanostoma* (Gmelin, 1791) リスガイ
- 产地:館山湾(水深5-10fms.:稻葉1963a;村越1998;清水), 布良, 白浜(清水), 安房(福井市博1962)
- 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 热带太平洋(水深10~30m, 砂底)
- 600 *Mammila mammata* (Röding, 1798) ヌメリスガイ
- 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 西太平洋, 東南アジア, 北オーストラリア(水深10~50m, 砂底)
- 601 *Mammila simiae* (Deshayes, 1838) ネズミガイ
- 产地:萩生(清水), 館山湾(5-10fms.:稻葉1963a;佐々木1989;村越1998;奥谷ら*;清水), 布良, 白浜(清水), 小湊(5-10fms.:稻葉1963a)
- 分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋, オーストラリア(水深10~30m, 砂泥底)
- 602 *Mammila kurodai* (Taki, 1943) オオネズミガイ
- 产地:館山湾(田村1987;堀越1990;奥谷ら*)
- 分布:相模湾以南, 四国, 九州(水深20~70m, 細砂底)
- 603 *Mammila sebae* (Récluz, 1844) ユキネズミ
- 产地:館山湾(村越1998)
- 分布:紀伊半島・九州西岸以南, インド・太平洋, 中国(水深10~50m, 砂底)
- 604 *Mammila yokoyamai* Makino, ヨコヤマリスガイ
- タイプ产地:千葉県印旛郡酒々井町
- 分布:太平洋(30°N, 干潮線~水深30m)
- 605 *Sigatica bathyraphae* (Pilsbry, 1911) オリイレシラタマ
- 产地:館山湾(水深10-50fms.:稻葉1963a;村越1998), 小湊, 銚子(水深10-50fms.:稻葉1963a)
- 分布:駿河湾・佐渡島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(水深5~30m, 砂底)
- 606 *Simum planulatum* (Récluz, 1843) ツツミガイ
- 产地:館山湾(田村1987;堀越1990;村越1998;奥谷ら*), 銚子(渡辺1988)
- 分布:房総半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, 台湾(10~50m, 細砂底)
- 607 *Simum javanicum* (Griffith & Pidgeon, 1839) フクロガイ
- 产地:館山湾(水深10-20fms.:稻葉1963a;堀越1990;村越1998), 小湊(稻葉1963a), 安房(福井市博1962), 銚子(稻葉1963a:b;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
- 分布:房総半島・山陰沖以南, 奄美, 沖縄, 西太平洋, インドネシア(10~80m, 外洋の細砂底)
- 608 *Simum japonicum* (Lischke, 1868) ヒメミミガイ
- 产地:館山湾(10-50fms.:稻葉1963a;堀越1990)
- 分布:房総半島・山口県北部以南, 奄美, 沖縄(10~50m, 砂底)
- 609 *Simum undulatum* (Lischke, 1872) ツガイ
- 产地:館山湾(潮間帶~50fms.:稻葉1963a;村越1998), 銚子(鹿股ら1962;渡辺1988)
- 分布:房総半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄(10~50m, 細砂底)
- 610 *Eumaticina papilla* (Gmelin, 1791) ネコガイ
- 产地:竹岡(清水), 館山湾(潮間帶~20fms.:稻葉1963a;田村1987;堀越1990;佐々木1990;村越1998;奥谷ら*), 小湊(猪野1942b;稻葉1963a), 安房(福井市博1962), 銚子(稻葉1963a:b;櫻井1964;渡辺1988)
- 分布:房総半島・男鹿半島以南, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(潮~20m, 細砂底)
- 611 *Eumaticina papilla lamarckiana* (Récluz, 1845) タマネコガイ
- 产地:竹岡, 萩生(清水), 小湊(大島1993), 銚子(櫻井1964;渡辺1988)
- 分布:房総半島・若狭湾以南, 四国, 九州(潮間帶~水深20m, 細砂底)
- 612 *Sigaretotrema inflata* (Tesh, 1906) ワダツミフクロガイ
- 产地:銚子(渡辺1988)
- 分布:銚子沖以西, 上佐沖, 热带太平洋(50~100m)
- 613 *Natica spadicea* (Gmelin, 1791) ヒロトラグマ
- 产地:小湊(猪野1942b), 勝浦(大島1993)
- 分布:房総半島・九州南部以南, 四国, 東南アジア(水深20~50m, 細砂底)
- 614 *Natica lacteobasis* Kuroda, 1961 シロスゾグマ
- 产地:銚子(渡辺1988)
- 分布:房総半島以南, 四国(水深100~300m, 砂底)
- 615 *Natica nippensis* Kuroda, 1961 ニッポングマガイ
- 产地:銚子(渡辺1988)

	分布:銚子沖以南, 遠州灘, 紀伊半島, 東シナ海, 九州, 日本海見島(水深50~200m, 砂底)	
616	<i>Natica saitoi</i> Kuroda & Habe in Kuroda, 1971 産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*) 分布:相模湾, 伊豆諸島(黒瀬)(水深70~200m, 砂底)	サイトウタマガイ
617	<i>Natica cernica</i> Jousseaume, 1874 産地:館山湾(田村1987;堀越1990;奥谷ら*) 分布:房総半島・能登半島以南, 小笠原, 奄美, 沖縄, 热带太平洋(水深20~200m, 砂底)	ハギノツユ
618	<i>Natica gualterana</i> Récluz, 1844 産地:館山湾(潮間帶-5fms;稻葉1963a;田村1987;堀越1990;佐々木1990;村越1998;奥谷ら*;清水), 小湊(猪野1942b;稻葉1963a;清水), 房総半島(奥谷1975) 分布:房総半島・日本海見島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 南西太平洋(潮下部~水深20m, 砂底)	ホウシュノタマ
619	<i>Natica trailli</i> Reeve, 1855 分布:相模湾・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(潮間帶~水深20m, 砂泥底)	カスミタマガイ
620	<i>Natica burriasensis</i> Récluz, 1843 分布:相模湾以南, 四国, 九州, インド・西太平洋(水深20~100m, 砂泥底)	カスミコグマ
621	<i>Natæa tigrina</i> (Röding, 1798) 産地:萩生(清水), 館山湾, 小湊(潮間帶-10fms;稻葉1963a) 分布:瀬戸内海, 有明海, 紀伊半島以南, 热带太平洋	ゴマフダマ
622	<i>Naticarius concinnus</i> (Dunker, 1860) 産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(稻葉1963a;田村1987;佐々木1989;村越1998;奥谷ら*;清水), 布良, 白浜(清水), 小湊(猪野1942b;稻葉1963a;大島1993), 勝浦(大島1993), 銚子(稻葉1963a;神奈川県博1972) 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 朝鮮南部(潮下部~水深50m, 砂底)	プロガイダマシ
623	<i>Naticarius alapapilionis</i> (Röding, 1798) 産地:館山湾(水深5~10fms;稻葉1963a;田村1987;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水), 天津, 小湊(大島1993), 安房(福井市博1962), 九十九里浜(水深3m(清水)) 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 热带インド太平洋(潮間帶~水深70m, 砂底)	プロガイ
624	<i>Tanea tosaensis</i> (Kuroda, 1961) 産地:銚子(渡辺1988) 分布:銚子沖, 紀伊半島沖, 土佐沖(水深150~250m, 砂底)	トサタマガイ
625	<i>Tanea hilialis</i> (Sowerby III, 1914) 産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*) 分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 東シナ海, 奄美, 沖縄, インド・西中部太平洋(水深20~300m, 組砂底)	ヒヨウダマ
626	<i>Tanea undulata</i> (Röding, 1798) 産地:勝山(田中ら1974), 館山湾, 小湊(10~20fms;稻葉1963a) 分布:紀伊半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(水深10~40m, 砂底)	モクメダマ
627	<i>Tanea picta</i> (Récluz, 1844) 産地:館山湾, 西根本(清水) 分布:伊豆諸島・兵庫県北部以南, 沖縄, インド・西太平洋(潮間帶~水深150m, 砂底)	カザリグマ
628	<i>Tanea eu zona magnifluctuata</i> (Kuroda, 1961) 産地:銚子(稻葉1963;櫻井1963;渡辺1988) 分布:銚子沖以南, 伊豆諸島, 紀伊, 土佐沖; 日本海見島, 九州西岸(水深50~200m, 砂底)	オオナミカザリグマ
629	<i>Tanea lemniscata</i> (Philippi, 1851) 分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(水深20~100m, 砂底)	ホウシュノタマダマシ
630	<i>Cryptonatica andoi</i> (Nomura, 1935) 産地:東京湾(Kuroda & Habe, 1949), 第1海堡南西水深21.5m, 大貫, 竹岡, 萩生(清水), 館山湾(稻葉1963a;清水), 天津(大島1993;清水), 小湊(稻葉1963a;堀越1987;大島1993;清水), 九十九里浜(清水), 銚子沖(奥谷ら1988), 銚子(稻葉1963a;b;櫻井1963;渡辺1988;鶴岡ら1994) 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 四国, 九州, 朝鮮南部(水深20~90m, 砂泥底)	エゾタマガイ
631	<i>Cryptonatica adamsoniana</i> (Dunker, 1860) 産地:館山湾, 小湊(稻葉1963a), 銚子(稻葉1963a;b) 分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(潮間帶~水深20m, 組砂底)	アダムズタマガイ
632	<i>Cryptonatica figurata</i> (Sowerby III, 1914) 産地:銚子(稻葉1963a;b;櫻井1963;渡辺1988) 分布:相模湾・能登半島沖以北, 朝鮮南部, 北海道(潮間帶~水深50m, 組砂底)	アミモンタマガイ
633	<i>Cryptonatica hirasei</i> (Pilsbry, 1905) 産地:銚子(渡辺1988) 分布:銚子沖以北, 北海道, 千島, サハリン, オホーツク海, カムチャッカ(潮間帶~水深20m, 組砂底)	ヒラセタマガイ
634	<i>Cryptonatica clausa</i> (Broderip & Sowerby, 1829) 産地:小湊(大島1993), 銚子(10~50fms;稻葉1963a;b;神奈川県博1972;渡辺1988;鶴岡ら1994), 房総水深700~1,000m(奥谷1975) 分布:駿河湾・日本海見島以北, 北海道(水深1,000~2,000m); サハリン, 千島, カムチャッカ, ア拉斯カ(水深50~100m, 砂泥底)	ハイイロタマガイ
635	<i>Cryptonatica rikuzenensis</i> (Tiba, 1985) 分布:銚子沖~陸前沖	リクゼンタマガイ
636	<i>Cryptonatica russa</i> (Gould, 1859) 産地:銚子(稻葉1963a) 分布:東北地方・若狭湾以北, 北海道, 千島, サハリン, オホーツク海, カムチャッカ(水深50~300m, 砂泥底)	コシダカタマガイ
637	<i>Cryptonatica</i> sp. 産地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995)	
638	<i>Choristes nipponica</i> Okutani, 1964 分布:相模湾 Superfamily Tonnaidea Family Bursidae	ヤツシロガイ上科 オキニシ科

- 639 *Bursa (Colubrellina) granularis* (Röding, 1798) イワカワウネボラ
産地:小湊(清水)
分布:紀伊半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁)
- 640 *Bursa (Tritonoranella) ranelloides* (Reeve, 1844) コナルトボラ
産地:竹岡, 萩生, 金谷, 富山水深130m(清水), 安房北条(岩川1900), 館山湾(水深84m; 藤田1929b; 堀越1990; 奥谷ら*; 清水), 沖ノ山(神奈川県博1972), 布良, 白浜(清水), 鶴川(大島1993), 天津(大島1993; 清水), 小湊, 鶴原(大島1993)
分布:房総半島・伊豆七島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 台湾, フィリピン(潮間帯~水深200m, 岩礁底)
- 641 *Bursa (Ranella) cruentata* (Sowerby II, 1835) シワオキニシ
産地:鶴原(大島1993)
分布:紀伊半島以南, 四国, 奄美, 沖縄, 熱帯インド・太平洋(水深10~30m, 岩礁・サンゴ礁)
- 642 *Bursa bufonia dunkeri* Kira, 1962 オキニシ
産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(福井市博1962; 堀越1990; 清水), 白浜(清水), 小湊(大島1993; 清水), 浜行川, 鶴原(大島1993)
分布:房総半島・九州南西岸以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁・サンゴ礁)
- 643 *Bufomaria rana* (Linnaeus, 1758) ミヤコボラ
産地:小湊(大島1993), 銀子(稻葉1963)
分布:房総半島・山形県温海以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(水深20~100m, 細砂底)
- 644 *Tutufa (Tutufa) bufo* (Röding, 1798) オオナルトボラ
産地:竹岡, 萩生, 富浦(清水), 館山湾(奥谷ら*; 清水), 鶴川, 天津(大島1993), 小湊(大島1993; 清水), 安房(福井市博1962), 銀子(渡辺1988)
分布:房総半島・山口県見島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 山形県温海, 热帯インド・西太平洋(潮間帯下部~水深50m, 岩礁)
Family Cassidae トウカムリ科
- 645 *Galeoocorys leucodoma* (Dall, 1907) カブトボラ
産地:鶴川(大島1993), 銀子(渡辺1988)
分布:房総半島・駿河湾以南, 紀伊半島沖, 四国, 九州西岸沖~インドネシア(100~500m, 砂泥底)
- 646 *Oocorys elongata* Schepman, 1909 ナガタマゴボラ
分布:相模湾
- 647 *Casmaria erinaceus* (Linnaeus, 1758) ヒナヅル
産地:白浜(長尾:稻葉1963a), 小湊(清水)
分布:紀伊半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 热帯インド・西太平洋(水深10~30m, 砂底)
- 648 *Casmaria ponderosa ponderosa* (Gmelin, 1791) アメガイ
産地:館山湾(堀越1990)
分布:房総半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(水深10~50m, 砂底)
- 649 *Casmaria ponderosa nipponensis* Abbott, 1968 レンジャク
産地:館山湾(佐々木1989; 村越1998; 奥谷ら*), 布良, 白浜(清水), 安房(福井市博1962), 天津, 浜行川(大島1993), 銀子(神奈川県博1972; 鶴岡ら1994), 銀子沖(Oyama & et al, 1961)
分布:房総半島・山陰沖以南, 紀伊, 四国, 九州, 小笠原(水深10~200m, 細砂底)
- 650 *Semicassis bisulcata bisulcata* (Schubert & Wagner, 1829) ワダチウラシマ
産地:天津(大島1993)
分布:四国沖以南, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(水深50~100m, 砂泥底)
- 651 *Semicassis bisulcata persimilis* Kira, 1959 ウラシマ
産地:竹岡, 萩生, 金谷(清水), 館山湾(佐々木1989; 堀越1990; 村越1998; 奥谷ら*; 清水), 千倉(清水), 鶴川(大島1993), 天津, 小湊(猪野1942b; 大島1993), 浜行川(大島1993), 銀子(稻葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 奄美, 沖縄, 台湾, 中国南部(水深50~100m, 細砂泥底)
- 652 *Semicassis bisulcata japonica* (Reeve, 1848) ウネウラシマ
産地:竹岡, 萩生, 金谷(清水), 館山湾(田村1987; 奥谷ら*; 清水), 鶴川, 天津(大島1993), 小湊(堀越ら1987; 大島1993; 清水), 行川(大島1993), 九十九里沖水深950~1,100m, 海底(清水), 銀子(稻葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994), 銀子沖(Oyama & Takemura, 1961)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 中国, 南シナ海(水深50~100m, 細砂底)
- 653 *Semicassis bisulcata pila* (Reeve, 1848) タマウラシマ
産地:萩生(清水), 鶴川, 天津, 小湊(大島1993), 九十九里沖ミゾ場(清水), 銀子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988), 銀子沖(水深100m(奥谷ら1988))
分布:銀子沖以南, 四国, 九州, 台湾, 中国(水深20~50m, 砂泥底)
- 654 *Semicassis bisulcata minor* (Küster, 1857) マメシボリウラシマ
産地:鶴川, 天津, 小湊, 浜行川(大島1993)
分布:遠州灘・山陰沖以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深50~200m, 砂泥底)
- 655 *Semicassis bulla* Habe, 1961 ウスウラシマ
産地:竹岡, 萩生(清水), 小湊(大島1993), 銀子(稻葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988), 銀子沖(奥谷ら1988)
分布:銀子沖・遠州灘以南, 紀伊半島沖, 四国, 九州西岸, 中国東南部, ハワイ(水深50~200m, 砂底)
- 656 *Semicassis (Xenogalea) inornata* (Pilsbry, 1895) ヒメタイコガイ
産地:館山湾(堀越1990), 天津, 小湊, 浜行川(大島1993), 九十九里沖ミゾ場(清水), 銀子(稻葉1963; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988; 清水)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 朝鮮, 中国沿岸(水深50~200m, 砂底)
- 657 *Phalium bandatum* (Perry, 1811) タイコガイ
産地:竹岡(清水), 館山湾(堀越1990; 佐々木1990; 奥谷ら*), 浜行川(大島1993), 銀子(稻葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布:房総半島・山陰沖以南, 奄美, 沖縄, 热帯西太平洋, 北オーストラリア(水深10~50m, 細砂底)
- 658 *Phalium glaucum* (Linnaeus, 1758) カンコ
産地:竹岡(清水), 鶴川(大島1993)
分布:房総半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, 热帯インド・西太平洋(水深10~50m, 細砂底)
- 659 *Phalium (Bezoardicella) areola* (Linnaeus, 1758) コダイコガイ
産地:竹岡(清水), 小湊(堀越ら1987), 銀子(渡辺1988; 鶴岡ら1994)
分布:房総半島・能登半島以南, 奄美, 沖縄, 热帯インド・太平洋, アフリカ東岸(陸棚上部, 細砂底)
- 660 *Phalium (Bezoardicella) flammiferum* (Röding, 1798) カズラガイ

産地:下洲,竹岡(清水),館山湾(堀越1990;清水),千倉(清水),鴨川,天津(猪野1942b;大島1993),小湊(猪野1942b;堀越ら1987;大島1993;清水),安房(福井市博1962),浜行川(大島1993),九十九里浜水深15m,海匝(清水),銚子(稻葉1963;櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988;鶴岡ら1994) 分布:三陸沿岸・男鹿半島以南,朝鮮,黃海,中国沿岸(水深10~100m,砂底)	
661 <i>Phalium (Bezoardicella) decussatum</i> (Linnaeus, 1758)	ヌメカズラ
産地:竹岡(清水),銚子(渡辺1988) 分布:銚子沖,台湾,中国南部,南シナ海,ジャワ(水深10~50m,砂底)	
662 <i>Echinophoria wyvillei</i> (Watson, 1886)	ナンバンカブトウラシマ
産地:銚子(渡辺1988) 分布:銚子沖・達州灘以南,土佐沖,九州西南沖,東シナ海(150~567m,砂底)	
663 <i>Echinophoria kurodai</i> Abbott, 1968	カブトウラシマ
産地:銚子(稻葉1963;櫻井1964) 分布:銚子沖・達州灘以南,土佐沖,東シナ海,台湾,フィリピン,オーストラリア(200~300m,砂底)	
Family Ficidae	ピワガイ科
664 <i>Ficus subintermedia</i> (d'Orbigny, 1852)	ピワガイ
産地:竹岡,萩生(清水),館山湾(田村1987;佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水),鴨川(大島1993),天津(清水),小湊(堀越ら1987;大島1993),銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994) 分布:房総半島・能登半島以南,奄美,沖縄,インド・西太平洋(水深10~100m,細砂底)	
665 <i>Ficus gracilis</i> (Sowerby I, 1825)	オオピワガイ
産地:平砂浦(奥谷ら*)	
666 <i>Ficus filosa</i> (Sowerby III, 1892)	イシバシピワガイ
産地:銚子(渡辺1988) 分布:銚子沖・土佐湾以南,九州西岸,東シナ海,フィリピン(水深100~200m,細砂底)	
Family Tonnidae	ヤツシロガイ科
667 <i>Endolium pyriforme</i> (Sowerby III, 1914)	ナシガタミヤシロ
産地:竹岡,萩生,金谷(清水),館山湾(田村1987;奥谷ら*),小湊(大島1993),九十九里沖水深950~1,100m(清水),銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988) 分布:房総半島・能登半島以南,四国,九州,西太平洋,オーストラリア東岸(水深100~500m,砂礫底)	
668 <i>Endolium lineatum</i> (Schepman, 1909)	イトマキミヤシロ
産地:銚子(渡辺1988) 分布:房総半島以西,達州灘,土佐沖,九州西南岸,東シナ海,インドネシア(セラム海)(水深200~300m,砂泥底)	
669 <i>Malea (Quimalea) pomum</i> (Linnaeus, 1758)	イワカワトキワ
産地:館山湾(佐々木1990;奥谷ら*) 分布:紀伊半島・屋久島以南,沖縄,インド・太平洋(水深5~20m,砂底)	
670 <i>Tonna perdix</i> (Linnaeus, 1758)	ウズラガイ
産地:館山湾(佐々木1989;奥谷ら*),布良(清水) 分布:房総半島・九州南部以南,奄美,沖縄,インド・西太平洋(潮間帶~水深50m,砂底)	
671 <i>Tonna luteostoma</i> (Küster, 1857)	ヤツシロガイ
産地:富津(千葉水試1956;千葉県企業庁1977~1979;清水),大佐和,湊,竹岡,萩生,金谷,保田,勝山,富山,富浦(清水),館山湾(田村1987;佐々木1989;堀越1990;村越1987;奥谷ら*;清水),沖ノ島(お茶大館山1973),白浜,千倉(清水),太海,鴨川,天津(大島1993;清水),小湊(猪野1942b;堀越ら1987;大島1993;清水),安房(岩川1900),浜行川,鶴原,勝浦(大島1993;清水),御宿(大島1993),銚子(稻葉1963;櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988;鶴岡ら1994;35°40'N,141°05' E 水深120m;清水) 分布:北海道南部・男鹿半島以南,奄美,沖縄,インド・西太平洋,ニュージーランド(水深50~200m,細砂底)	
672 <i>Tonna angusuta</i> (Hanley, 1860)	カノコウズラ
産地:千葉県(大島1948) 分布:千葉県,神奈川県,北部オーストラリア	
673 <i>Tonna olearium</i> (Linnaeus, 1758)	スジウズラ
産地:竹岡,萩生,館山湾(清水),鴨川(大島1993),小湊(猪野1942b;大島1993) 分布:房総半島・山陰沖以南,奄美,沖縄,東シナ海,インド・西太平洋(水深10~50m,細砂底)	
674 <i>Tonna chinensis</i> (Dillwyn, 1817)	ミフウズラ
産地:竹岡(清水) 分布:房総半島・山口県北部以南,奄美,沖縄,西太平洋(水深10~50m,細砂底)	
675 <i>Tonna marginata</i> (Philippi, 1845)	ウズラミヤシロ
産地:館山湾(清水),銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988),千葉県(大島1948) 分布:房総半島・山陰沖以南,奄美,沖縄,インド・西太平洋(水深10~50m,砂底)	
676 <i>Tonna sulcosa</i> (Born, 1778)	ミヤシロガイ
産地:館山湾水深40m(奥谷ら1988) 分布:房総半島・山陰沖以南,奄美,沖縄,インド・西太平洋(水深10~50m,細砂底)	
677 <i>Tonna allium</i> (Dillwyn, 1817)	トキワガイ
産地:勝山,館山湾,千倉(清水) 分布:房総半島・九州西岸以南,奄美,沖縄,インド・西太平洋(水深10~50m,細砂底)	
678 <i>Tonna tessellata</i> (Lamarck, 1816)	ウズラミヤシロモドキ
分布:房総半島・九州西岸以南,奄美,沖縄,インド・西太平洋(水深10~50m,砂底)	
Family Cymatiidae	フジツガイ科
679 <i>Fusitriton oregonensis</i> (Redfield, 1848)	アヤボラ
産地:竹岡,萩生,金谷,富山沖水深320m,館山湾水深180~240m(清水),鴨川(大島1993),天津(猪野1942b),小湊(猪野1942b;堀越ら1987;大島1993;水深270~280m;清水),名洗(千葉県1977a),銚子(Okutani, 1959;鹿島ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1991;清水) 分布:相模湾・能登半島以北,東北,北海道,カムチャッカ,北米西岸(潮間帶下部~水深300m,砂泥底)	
680 <i>Fusitriton galea</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961	カブトアヤボラ
産地:竹岡,萩生,金谷,富山沖水深320m,館山湾(清水),鴨川(大島1993),小湊(堀越ら1987;大島1993;水深270~280m;清水),銚子(鹿島ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994;清水)	

- 分布:銚子沖以西, 遠州灘, 紀伊, 四国, 九州(水深100~200m)
- 681 *Biplex perca* Perry, 1811 マツカワガイ
産地:竹岡, 萩生, 金谷, 和田沖水深150m(清水), 鶴川(大島1993;清水), 天津, 小湊(猪野1942b;大島1993;清水), 浜行川(大島1993;清水), 銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994), 房総半島沖水深100~110m(奥谷ら1988)
分布:房総半島・山口県以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯下部~水深10m, 岩礁)
- 682 *Gyrineum natator* (Röding, 1798) ウネボラ
産地:小湊(大島1993)
分布:紀伊半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯下部~水深10m, 岩礁)
- 683 *Gyrineum roseum* (Reeve, 1844) ベニアラボラ
産地:勝山(田中ら1974)
分布:紀伊半島・九州南部以南, 奄美, 沖縄, 热帶太平洋(潮間帯~水深20m, サンゴ礁, 岩礁)
- 684 *Cymatium (Monoplex) pileare* (Linnaeus, 1758) シノマキ
産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(村越1998), 鶴川(大島1993), 小湊(大島1993;清水)
分布:駿河湾以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深10m, 岩礁)
- 685 *Cymatium (Monoplex) temuliratus* (Lischke, 1873) ナガズカケボラ
産地:竹岡, 萩生, 金谷, 保田, 富浦水深8~15m(清水), 館山湾(田村1987;清水), 白浜(清水), 太海(千葉水試1981a;清水), 鶴川, 天津, 小湊(大島1993;清水), 浜行川(大島1993), 銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布:三陸沿岸・能登半島以南, 四国, 九州(潮間帯下部~水深100m, 岩礁)
- 686 *Cymatium (Monoplex) nicobaricum* (Röding, 1798) ミツカドボラ
産地:白浜(長尾:稻葉1963a)
分布:紀伊半島・九州南部以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深10m, 岩礁)
- 687 *Cymatium (Monoplex) aquatilis* (Reeve, 1844) サツマボラ
産地:天津, 小湊(清水)
分布:紀伊半島以南, 九州西岸, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深10m, 岩礁, サンゴ礁)
- 688 *Cymatium (Monoplex) parthenopeum* (Salis Marschalis, 1793) カコボラ
産地:竹岡, 萩生, 金谷(清水), 保田(千葉県1983;清水), 富浦(清水), 館山湾(田村1987;佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*, 清水), 沖ノ島(お茶大館山1973), 白浜, 千倉(清水), 太海(千葉水試1981a;大島1993;清水), 鶴川, 天津(大島1993;清水), 小湊(猪野1942b;堀越ら1987;大島1993;小池1994;清水), 安房(岩川1900;福井市博1962), 勝浦, 御宿, 大原(大島1993;清水), 銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帯下部~水深70m, 岩礁)
- 689 *Cymatium (Turritriton) exaratum* (Reeve, 1844) ククリボラ
産地:萩生, 保田(清水), 館山湾(水深84m;藤田1929b;田村1987;佐々木1989;奥谷ら*), 白浜(清水), 太海(千葉水試1981a;清水), 鶴川(大島1993), 天津, 小湊(大島1993;清水), 浜行川(大島1993), 銚子(櫻井1964;渡辺1988)
分布:銚子沖・山口県北部以南, 紀伊, 四国, 九州, 中国(潮下帶, 岩礁)
- 690 *Cymatium (Turritriton) labiosum* (Wood, 1828) ヒメミツカドボラ
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*), 天津, 小湊(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋, 西インド諸島(潮間帯~水深10m, 岩礁底)
- 691 *Cymatium (Ranularia) springsteeni* (Beu, 1987) ニヨリツブリボラ
分布:相模湾以南, 热帶インド・西太平洋
- 692 *Cymatium (Ranularia) sinensis* (Reeve, 1844) ゾウガイ
産地:竹岡水深16m(千葉水試1980b), 萩生(清水), 鶴川(大島1993), 天津, 小湊(大島1993;清水)
分布:房総半島・日本海見島以南, 奄美, 沖縄, 台湾, 西太平洋, オーストラリア(水深50~200m, 岩礁底)
- 693 *Cymatium (Ranularia) pyrum* (Linnaeus, 1758) オオゾウガイ
産地:天津(清水), 勝浦(大島1993)
分布:房総半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深10m, 岩礁)
- 694 *Cymatium (Ranularia) dunkeri* (Lischke, 1868) コシダカフジツガイ
産地:萩生, 富浦水深8~15m(清水), 館山湾(龍廟1949), 洲崎(奥谷ら*), 天津(清水), 小湊(大島1993), 安房(福井市博1962), 浜行川, 勝浦(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(水深20~50m, 岩礁)
- 695 *Cymatium (Galagia) succincta* (Linnaeus, 1771) トウマキ
産地:小湊(大島1993)
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯下部~水深20m, 岩礁)
- 696 *Cymatium (Linatella) cutaceum* (Lamarck, 1816) シゲトウボラ
産地:萩生(清水)
分布:相模湾・男鹿半島以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋, 南アフリカ(大西洋にも)(水深20~50m, 砂底)
- 697 *Charonia lampas sauliae* (Reeve, 1844) ボウシユウボラ
産地:竹岡, 萩生, 金谷, 保田, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(お茶大館山1973;堀越1990;清水), 布良, 白浜, 千倉(清水), 太海(大島1993;清水), 鶴川(千葉水試1981a;大島1993;清水), 天津(猪野1942b;大島1993;清水), 小湊(猪野1942b;福井市博1962;神奈川県博1972;堀越ら1987;大島1993;小池1994;清水), 安房(岩川1900), 浜行川(千葉水試1977;清水), 勝浦, 御宿, 大原(大島1993;清水), 銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1991)
分布:三陸沿岸・男鹿半島以南, 日本各地, フィリピン(潮間帯~水深50m, 岩礁)
- 698 *Charonia lampas macilenta* Kuroda & Habe in Habe, 1961 ナンカイボラ
産地:竹岡, 萩生, 金谷, 富浦(清水), 鶴川(大島1993), 天津, 小湊(大島1993;清水), 銚子(渡辺1988)
分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 東シナ海(水深150~200m)
- 699 *Charonia lampas lampas* Linnaeus, 1758 トウカイボラ
分布:三浦半島沖~遠州灘(水深50~250m, 細砂底)
- 700 *Charonia tritonis* (Linnaeus, 1758) ホラガイ
産地:館山湾(堀越1990)
分布:紀伊半島以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深20m, サンゴ礁, 岩礁)
- 701 *Sassia semitorta* (Kuroda & Habe, 1952) ニセイボボラ
分布:房総半島・九州西岸以南, 土佐沖, 奄美, 沖縄, フィリピン(水深50~200m, 細砂底)
- Family Personidae イボボラ科

702 <i>Distorsio reticularis</i> (Linnaeus, 1758)	イボボラ
産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(佐々木1989;堀越1990;奥谷ら*), 安房(福井市博1962) 分布:房総半島・山口県北部以南, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(水深50~200m, 岩礁底)	
Order Heteropoda	異足目
Superfamily Carinarioidea	ゾウクラゲ上科
Family Atlantidae	クチキレウキガイ科 クチキレウキガイ
703 <i>Atlanta peroni</i> Lesueur, 1817	ネジレクチキレウキガイ
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
704 <i>Atlanta inclinata</i> Souleyet, 1852	ウスヒラクチケレウキガイ
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
705 <i>Atlanta gaudichudi</i> Souleyet, 1852	ムラサキクチキレウキガイ
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
706 <i>Atlanta lesueuri</i> Souleyet, 1852	ナカダカクチキレウキガイ
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
707 <i>Atlanta inflata</i> Souleyet, 1852	クスマクチキレウキガイ
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
708 <i>Atlanta fusca</i> Souleyet, 1852	トウガタクチキレウキガイ
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
709 <i>Atlanta turriculata</i> d' Orbigny, 1836	
分布:インド・太平洋の温・熱帯水域	
710 <i>Atlanta helicinaoides</i> Souleyet, 1853	ヒレウキガイ
分布:世界の各大洋の温・熱帯水域(表層)	
711 <i>Atlanta rosea</i> Souleyet, 1852	ゾウクラゲ科 コノハゾウクラゲ
分布:世界の各大洋の暖海域(表層)	
712 <i>Atlanta pacifica</i> Tokioka, 1960	ムチオゾウクラゲ
分布:太平洋の温熱帯水域(表層)	
713 <i>Oxygyrus keraudreni</i> (Lesueur, 1817)	カエデゾウクラゲ
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
Family Carinariidae	ゾウクラゲ
714 <i>Pterosoma planum</i> Lesson, 1827	ヒメゾウクラゲ
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
715 <i>Cardiopoda richardi</i> Vayssi��re, 1903	カブトゾウクラゲ
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
716 <i>Cardiopoda placenta</i> (Lesson, 1830)	ラマルクゾウクラゲ
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
717 <i>Carinaria cristata</i> (Linnaeus, 1766)	コガタゾウクラゲ
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
718 <i>Carinaria japonica</i> Okutani, 1955	ハダカゾウクラゲ科 ハダカゾウクラゲ
分布:北太平洋の混合水域からカリオルニア海流域	
719 <i>Carinaria galea</i> Benson, 1835	チュウガタハダカゾウクラゲ
分布:黒潮水域及びインド・太平洋の温・熱帯水域	
720 <i>Carinaria lamarecki</i> Peron & Lesueur, 1810	ヒレハダカゾウクラゲ
分布:黒潮水域に稀に出現, 世界の温・熱帯水域(表層)	
721 <i>Carinaria challengerii</i> Bonnevie, 1920	シリキレハダカゾウクラゲ
分布:太平洋・大西洋の温・熱帯水域	
Family Pterotracheidae	翼舌目
722 <i>Pterotrachea coronata</i> Niebuhr, 1775	ミツクチキリオレガイ上科
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
723 <i>Pterotrachea hippocampus</i> Philippi, 1836	クリロケンカニモリ科 カタワカニモリ
分布:黒潮水域及びその付近	
724 <i>Pterotrachea scutata</i> Gegenbaur, 1855	
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の温・熱帯水域	
725 <i>Firoloidea desmarestii</i> Lesueur, 1817	
分布:黒潮水域及びその付近に普通, 世界の温・熱帯水域	
Order Ptenoglossa	
Superfamily Triphoroidea	
Family Cerithiopsidae	
726 <i>Ataxocerithium abnormale</i> (Sowerby III, 1903)	カイメンケシカニモリ
産地:館山湾(肥後・後藤1993), 小湊(猪野1942b), 藩浦(大島1993) 分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深10m, 岩礁)	
727 <i>Cerithiopsis spongicola</i> Habe, 1960	ケシカニモリ
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*) 分布:房総半島・山口県北部以南, 土佐沖, 九州西岸(水深5~30m, ナガニシ等の海绵中)	
728 <i>Notosella morishimai</i> Habe, 1970	
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*), 藩浦(大島1993) 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深10~50m, 細砂底)	

729 <i>Seila yokoyamai</i> (Cossmann, 1897)	ヨコヤマケシカニモリ
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深115m, 砂底)	
730 <i>Cerithiella terebroides</i> Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	コンボウカニモリ
産地:勝浦(大島1993)	
分布:相模湾	
Family Triphoridae	ミツクチキリオレ科
731 <i>Inella gigas</i> (Hinds, 1843)	カサネキリオレ
分布:房総半島・若狭湾以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(水深10~100m, 砂底)	
732 <i>Inella aculeata</i> Kosuge, 1962	ムラサキキリオレ
分布:房総半島以南, 四国, 九州(潮間帯~20m, 砂底)	
733 <i>Inella sagamiensis</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	サガミキリオレ
産地:洲崎水深33m(千葉水試1980b)	
分布:房総半島以南, 四国, 九州(水深30~80m, 砂底)	
734 <i>Inella chrysalis</i> Kosuge, 1963	サナギキリオレ
産地:勝浦(大島1993)	
分布:奄美大島以南, 沖縄(潮間帯~水深20m, 岩礁底)	
735 <i>Inella japonica</i> (Kuroda & Kosuge, 1963)	アラレキリオレ
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*), 洲崎水深33m(千葉水試1980b), 小湊(猪野1942b), 勝浦(大島1993), 銀子(稻葉1963)	
分布:三陸沿岸・男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帯~100m, 砂底)	
736 <i>Cautoriphora verrucosa</i> (Adams & Reeve, 1850) (<i>Subulophora</i> sp.?・長谷川 in 奥谷2000)	アミメキリオレ
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*)	
737 <i>Tetraphora iniqua</i> (Jousseaume, 1884)	ホソヤカキリオレ
産地:勝浦(大島1993)	
分布:房総半島・潮岬・山口県北部以南, 奄美, 沖縄, 太平洋域(潮間帯~水深20m, 岩礁底)	
738 <i>Latitriphora multigyrata</i> (Yokoyama, 1922)	カズマキキリオレ
タイプ产地:千葉県市原市市東(化石)	
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*), 勝浦(大島1993)	
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~20m, 砂底)	
739 <i>Mesophora</i> sp. cf. <i>hungerfordi</i> (Sowerby III, 1914)	クリイロキリオレ
産地:館山湾(田村1987;田村・奥谷1989;奥谷ら*)	
分布:銚子沿岸・佐渡島・館山湾以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋域(潮間帯~20m, 岩礁地)	
740 <i>Mastonia millepunctata</i> (Kosuge, 1962)	チャマダラキリオレ
分布:相模湾以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~80m, 砂底)	
741 <i>Inforis progressa</i> (Laseron, 1958)	チビミツクチキリオレ
分布:房総半島・奄美大島以南, 沖縄, 台湾(潮間帯~水深20m, 岩礁底)	
742 <i>Mastoniaeforis lifuana</i> (Hervier, 1897)	コハクミツクチキリオレ
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋域(潮間帯~20m, 砂底)	
743 <i>Viriola</i> (<i>Viriola</i>) <i>tricincta</i> (Dunker, 1860)	キリオレ
産地:竹岡, 萩生, 富浦(清水), 館山湾(田村1987;堀越1990;佐々木1990;奥谷ら*;清水), 白浜, 小湊, 勝浦, 大原(清水), 銀子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988)	
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~20m, 砂底)	
744 <i>Euthymella bilix</i> (Hinds, 1843)	オボロキリオレ
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~20m, 岩礁地)	
745 <i>Euthymella pagoda</i> (Hinds, 1843)	オネジオレ
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~20m, 岩礁地)	
746 <i>Euthymella pyramidalis</i> (Adams & Reeve, 1850)	トガリキリオレ
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*)	
分布:房総半島以南, 奄美, 沖縄(潮間帯~20m, 岩礁地)	
747 <i>Euthymella concors</i> (Hinds, 1843)	シロキリオレ
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*)	
分布:房総半島以南, 四国, 九州, インド・太平洋域(潮間帯~50m, 砂底)	
748 <i>Litharium kurodai</i> (Kosuge, 1962)	コンボウキリオレ
分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~35m, 岩礁地)	
749 <i>Bouchetriphora</i> sp. cf. <i>otsuensis</i> (Yokoyama, 1920)	ホソアラレキリオレ
産地:館山湾(田村1987), 勝浦(大島1993)	
分布:北海道南部・佐渡島以南, 本州, 四国, 九州(潮間帯~80m, 砂底)	
<i>Bouchetriphora confusa</i> (Kosuge, 1963)	マギレキリオレ
分布:相模湾~沖縄(潮下帯から浅海, 岩礁)	
750 <i>Bouchetriphora conspersa</i> (E. A. Smith, 1875)	サフランキリオレ
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*), 銀子(稻葉1963)	
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帯~50m, 岩礁地)	
751 <i>Aclophora xystica</i> (Jousseaume, 1884)	クロクリイロキリオレ
産地:銀子(稻葉1963)	
分布:銚子・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~20m, 岩礁地)	
752 <i>Aclophora robusta</i> Laseron, 1958	イワカワアラレキリオレ
産地:館山湾(村越1998)	
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~水深20m, 砂底)	
753 <i>Aclophora macmichaeli</i> Kosuge, 1962	チャガスリキリオレ
産地:館山湾(田村1987;田村・奥谷1989;奥谷ら*)	

分布:館山湾・伊豆半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帶～水深20m, 砂底)	
754 <i>Nanaphora tricolor</i> Laseron, 1958	ゾメワケキリオレ
産地:勝浦(大島1993)	
分布:紀伊半島以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帶～水深20m, 岩礁底)	
755 <i>Triphora alveolata</i> (Adams & Reeve, 1850)	ウスチャキリオレ
産地:館山湾(村越1998)	
分布:房総半島以南, 四国, 九州(潮間帶～20m, 砂礫地)	
Superfamily Janthinioidea	アサガオガイ科
Family Janthinidae	アサガオガイ科
756 <i>Janthina janthina</i> (Linnaeus, 1758)	アサガオガイ
産地:竹岡, 萩生, 富浦(清水), 館山湾(奥谷ら*; 清水), 布良, 白浜, 千倉(清水), 小湊(猪野1942b; 清水), 勝浦, 御宿(大島1993), 銚子(福葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)	
分布:黒潮水域及びその付近, 横前線付近まで, 世界の暖流域(海表面で浮遊生活)	
757 <i>Janthina (Violetta) prolongata</i> Blainville, 1823	ルリガイ
産地:館山湾(佐々木1990; 奥谷ら*; 清水), 布良白浜, 千倉(清水), 勝浦, 御宿(大島1993), 銚子(鹿股ら1962; 福葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)	
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の暖流域(海表面で浮遊生活)	
758 <i>Janthina (Amethistina) pallida</i> Thompson, 1841	ハブタエルリガイ
産地:銚子(渡辺1988; 鶴岡ら1994)	
分布:世界の暖流域(海表面で浮遊生活)	
759 <i>Janthina (Jodina) umbilicata</i> d'Orbigny, 1847	ヒメルリガイ
産地:勝浦, 御宿(大島1993), 銚子(福葉1963; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)	
分布:黒潮水域及びその付近, 世界の暖流域(海表面で浮遊生活)	
760 <i>Recluzia lutea</i> (Bennett, 1840)	ヒルガオガイ
産地:銚子(渡辺1988; 鶴岡ら1994)	
分布:黒潮水域(海表面で浮遊生活)	
Family Aclidiidae	センマイドウシガイ科
761 <i>Aclis angulifera</i> (Yokoyama, 1922)	センマイドウシ
タイプ産地:千葉県市原市市東瀬又(化石)	
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖以南, 相模湾, 四国; 若狭湾以南, 九州西岸(水深40～200m, 砂底)	
762 <i>Aclis loveniana</i> Adams, 1861	ホソセンマイドウシ
分布:東京湾から九州(水深50m前後, 砂底)	
Family Epitonidae	イトカケガイ科
763 <i>Acirsa (Acirsa) costulata</i> (Mighels & Adams, 1842)	ホッキョクイトカケ
分布:房総半島以北の北西太平洋, グリーンランド, 北極海(水深50～100m, 砂泥底)	
764 <i>Acirsa (Plesioacirsa) martensi</i> (de Boury, 1912)	カニモリイトカケ
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖, 相模湾, 壱岐(水深90～325m, 砂底)	
765 <i>Kurodacirsa lotus</i> Masahito & Habe, 1975	ハスノミイトカケ
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子～和歌山県沖(水深50～120m, 砂底)	
766 <i>Opalia (Nodiscala) monovaricosa</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961	ヒトフシイトカケ
タイプ産地:銚子沖(水深100m内外)	
産地:小湊(大島1993), 銚子沖(櫻井1961, 渡辺1988)	
分布:銚子沖・若狭湾以南, 駿河湾, 九州西岸(水深50～100m, 砂底)	
767 <i>Opalia (Nodiscala) gracilis</i> (Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	ナガフシイトカケ
産地:小湊(大島1993)	
分布:相模湾以南(水深50～100m, 砂底)	
768 <i>Opalia (Nodiscala) matajiroi</i> (Kuroda, 1954)	コフシイトカケ
産地:館山湾(田村1987; 真谷ら*)	
分布:相模湾以南, 四国, 九州北西岸(水深5～50m, 細砂底)	
769 <i>Opalia (Pliciscala) mormulaeformis</i> Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	チヨウジフシイトカケ
産地:館山湾(田村1987; 奥谷ら*), 銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖・佐渡島以南, 四国, 九州西岸(水深10～150m, 砂底)	
770 <i>Opaliopsis hiranoi</i> (Shikama, 1962)	ヒラノイトカケ
タイプ産地:銚子沖(水深250～260m)	
産地:銚子沖(Shikama 1962; 福葉1963; 渡辺1988)	
分布:銚子沖以北, 東北(水深500m)	
771 <i>Cirsotrema (Cirsotrema) bonum</i> (Melvill & Standen, 1906)	ホソチリメンニナ
分布:房総半島・若狭湾以南, 四国, 九州(水深50～200m, 砂底)	
772 <i>Cirsotrema (Elegantiscala) fimbriatula</i> (Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	チジワイトカケ
分布:相模湾・佐渡島以南, 四国, 九州(水深15～200m, 砂底)	
773 <i>Cirsotrema (Elegantiscala) rugosa</i> Kuroda & Ito, 1961	ヤエバイトカケ
産地:銚子(渡辺1988; 清水)	
分布:紀伊半島沖以南, 四国(水深150～300m, 砂泥底)	
774 <i>Cirsotrema (Elegantiscala) mitsuokai</i> (Ozaki, 1958)	ホツカイトカケ
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖以北, 北海道, 千島(水深200～300m, 砂泥底)	

- 775 *Cirsotrema (Boreoscala) greenlandica* (Perry, 1811) エゾイトカケ
産地:銚子沖(肥後・後藤,1993)
- 分布:銚子沖・但馬沖以北, 東北, 北海道, ア拉斯カまで(水深30~260m, 砂泥底)
- 776 *Cirsotrema (Boreoscala) greenlandica japonica* Shikama, 1962 チビエゾイトカケ
タイプ产地:銚子東南沖
产地:銚子沖(Shikama 1962)
分布:銚子沖, 東北, 北海道(30~200m, 砂泥底)(エゾイトカケの南方型)
- 777 *Gyroscale (Pomiscale) lamellosa* (Lamarck, 1822) ネジガイ
产地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(佐々木1989;村越1998;奥谷ら*, 清水), 布良, 白浜(清水), 小湊(猪野1942b;大島1993), 勝浦(大島1993), 銚子(稻葉1963;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:北海道西南部・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深10m, 岩礁のイソギンチャク類に着生)
- 778 *Gyroscale (Circuloscala) iwaotakii* (Azuma, 1961) タキイトカケ
产地:銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布:房総半島以南, 四国, 九州西岸(水深100~200m, 砂底)
- 779 *Amaea (Amaea) magnifica* (Sowerby II, 1844) ナガイトカケ
产地:竹岡(清水), 鶴川(大島1993), 九十九里沖ミゾ場(清水), 銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;神奈川県博1991;鶴岡ら1994)
分布:銚子沖・山口県見島沖以南, 四国, 九州, 東シナ海, 台湾, フィリピン(水深50~200m, 細砂底)
- 780 *Amaea (Narvaliscala) perancellata* Nakayama, 2000 カゴメイトカケ
分布:相模湾~土佐湾(水深200~450m, 砂泥底)
- 781 *Amaea (Filiscalata) immaculata* (Sowerby II, 1844) キヌイトカケ
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 濑戸内海(水深20~50m, 砂泥底) 土田 in 奥谷2000は紀伊半島以南
- 782 *Amaea (Filiscalata) secunda* Kuroda & Ito, 1961 ツギノナガイトカケ
产地:銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:房総半島以南, 四国, 東シナ海(水深100~200m, 砂底)
- 783 *Amaea (Acrilla) acuminata* (Sowerby II, 1844) ウネナシイトカケ
产地:勝浦(大島1993), 銚子(櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988)
分布:鹿島灘・佐渡島以南, 四国, 九州, オーストラリア(水深10~100m, 細砂底)
- 784 *Amaea (Scalina) oyasonensis* (Ozaki, 1958) キヌメヌメイトカケ
分布:相模湾~土佐湾(水深100~200m, 砂泥底)
- 785 *Amaea (Scalina) mathildona* (Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971) アサブイトカケ
分布:相模湾, 若狭湾(水深41~139m)
- 786 *Amaea (Scalina) thielei* (de Boury, 1902) クリンイトカケ
产地:館山湾(田村1987;奥谷ら*), 鶴川(大島1993), 小湊(猪野1942b=A. sulcata), 銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:房総半島以南, 四国, 九州北西岸(水深10~225m, 細砂底)
- 787 *Amaea (Scalina) sericogazea* (Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971) キヌジヌメイトカケ
产地:小湊(大島1993), 銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布:銚子沖, 相模湾, 土佐湾(水深100~200m, 砂底)
- 788 *Amaea (Clathroscalata) cerea* Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ロウイロカゴメイトカケ
产地:銚子(渡辺1988)
分布:銚子沖~土佐湾; 若狭湾(水深40~200m, 砂底)
- 789 *Amaea (Clathroscalata) subcancellata* Azuma, 1962 カゴメフシイトカケ
产地:銚子(渡辺1988)
分布:銚子沖, 紀伊半島沖~四国(水深200~300m, 砂底)
- 790 *Amaea (Clathroscalata) tosaensis* (Habe & Noguchi, 1990) アラメイトカケ
分布:相模湾~土佐湾(水深100~200m, 砂底)
- 791 *Claviscala terebralioides* Kilburn, 1975 クロハライトカケ
产地:銚子(渡辺1988)
分布:土佐沖(水深400m), 銚子沖
- 792 *Claviscala turrita* Nakayama, 1995 トガリイトカケ
分布:房総半島~紀伊半島(水深350~550m, 泥底)
- 793 *Claviscala japonica* Masahito & Habe, 1976 ネダケイトカケ
分布:相模湾~土佐湾(水深120~250m, 砂底)
- 794 *Epitonium (Epitonium) scalare* (Linnaeus, 1758) オオイトカケ
产地:銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布:房総半島・山口県北沖以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・西太平洋(水深20~50m, 細砂底)
- 795 *Epitonium (Epitonium) tokyoense* (Kuroda, 1930) エドイトカケ
产地:銚子(渡辺1988)
分布:房総半島以南, 四国, 九州西岸(水深20~50m, 細砂底)
- 796 *Epitonium (Epitonium) pallasii* (Kiner, 1838) クワガタイトカケ
分布:相模湾以南, インド・西太平洋(水深50~250m, 砂泥底)
- 797 *Epitonium (Epitonium) neglecta* (Adams & Reeve, 1850) ヒレイトカケ
产地:銚子(渡辺1988)
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深50~200m, 細砂底)
- 798 *Epitonium (Epitonium) liliputana* (A. Adams, 1861) コビトイトカケ
产地:館山湾(水深60m:田村1987;奥谷ら*), 銚子(稻葉1963;櫻井1964)
分布:銚子沖・若狭湾・能登半島・相模湾以南, 四国, 九州(水深50~200m, 砂底)
- 799 *Epitonium (Epitonium) okezoko* (Habe, 1961) ナマクライトカケ
分布:房総半島以南, 四国(水深100~200m, 砂底) 土田 in 奥谷2000では紀伊半島以南

800 <i>Epitonium (Mazescala) sawamurai</i> Azuma, 1960	サワムライトカケ
分布:相模湾～土佐湾(水深150～420m,砂泥底)	
801 <i>Epitonium (Lamelliscala) replicata</i> (Sowerby II, 1844)	ハスイトカケ
産地:館山湾(田村1987;村越1998;奥谷ら*)	
分布:房総半島・山口県見島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西南太平洋(水深10～50m, 細砂底)	
802 <i>Epitonium (Hirtoscala) pyramidale</i> (Sowerby II, 1844)	トウガタイトカケ
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 濱戸内海, 奄美, 中国(水深10～30m, 砂底)	
803 <i>Epitonium (Hirtoscala) aculeata</i> (Sowerby II, 1844)	トゲシノブガイ
産地:館山湾(水深12.1～66.9m;田村1987;奥谷ら*)	
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, フィリピン, マレーシア(水深10～140m, 砂底)	
804 <i>Epitonium (Hirtoscala) tenuicostata</i> (Sowerby II, 1844)	ウスヒレイトカケ
分布:房総半島, 駿河湾, フィリピン	
805 <i>Epitonium (Hirtoscala) vigintifoliata</i> (Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	ハタエイトカケ
分布:相模湾以南, 四国, 九州(潮間帶, 岩礁)	
806 <i>Epitonium (Hirtoscala) conjunctum</i> (Yokoyama, 1922)	ツヅリシノブ
タイプ産地:千葉県沼南町乎賀(印旛層, 化石)	
分布:秋田県能代, 三陸南部	
807 <i>Epitonium (Hirtoscala) casta</i> (Sowerby II, 1847)	ナガヒメネジガイ
産地:館山湾(村越1998),勝浦,御宿(大島1993)	
分布:北海道西南部以南, 本州, 四国, 九州(潮間帶, 岩礁)	
808 <i>Epitonium (Hirtoscala) stigmatica</i> (Pilsbry, 1911)	チャマダライトカケ
産地:館山湾(奥谷ら*),銚子(渡辺1988)	
分布:房総半島・但馬沖以南, 四国, 九州(10～50m, 砂底)	
809 <i>Epitonium (Hirtoscala) philippinarum</i> (Sowerby II, 1844)	クモリシノブ
分布:房総半島以南, 四国, 九州, フィリピン(水深10～50m, 砂底)	
810 <i>Epitonium (Laeviscalata) angusta</i> (Sowerby II, 1844)	シノブガイ
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾(水深5～30m, 細砂底)	
811 <i>Epitonium (Nitidiscalata) japonica</i> (Sowerby II, 1844)	ヒメネジガイ
産地:竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(田村1987;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水), 布良, 白浜(清水), 勝浦(大島1993), 大原(清水), 名洗(千葉県1977a), 銚子(渡辺1988)	
分布:三陸沿岸・男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帶, 岩礁, イソギンチャクの一種に寄生)	
812 <i>Epitonium (Depressiscalata) aurita</i> (Sowerby II, 1844)	オダマキ
産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(水深6.9m;田村1987;佐々木1990;奥谷ら*), 安房(福井市博1962), 天津, 勝浦(大島1993)	
分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州(潮間帶～10m, 砂底)	
813 <i>Epitonium (Parviscalata) eusculpta</i> (Sowerby III, 1903)	タテヨコイトカケ
産地:館山(村越1998), 小湊(大島1993), 銚子(渡辺1988)	
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深10～50m, 砂底)	
814 <i>Epitonium (Parviscalata) eximium</i> (Adams & Reeve, 1850)	サガミイトカケ
産地:館山湾(田村1987;村越1998;奥谷ら*), 安房(福井市博1962)	
分布:三陸沿岸・佐渡島以南, 四国, 九州(水深5～115m, 砂底)	
815 <i>Epitonium (Parviscalata) eximilla</i> (Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	ホゾサガミイトカケ
産地:銚子(稻葉1963)	
分布:三陸・能登半島以南, 四国, 九州(水深20～1150m, 砂底)	
816 <i>Epitonium (Parviscalata) coretum</i> (Iredale, 1936)	ホゾヒメネジガイ
分布:房総半島, 伊豆半島, オーストラリア(水深80～120m, 砂底)	
817 <i>Epitonium (Parviscalata) carchedon</i> (Iredale, 1936)	ホゾマキスジイトカケ
分布:房総半島～紀伊半島, 台湾, オーストラリア(水深40～100m, 砂底)	
818 <i>Epitonium (Parviscalata) ishimotoi</i> (Masahito & Habe, 1976)	スナギンチャクイトカケ
分布:相模湾～紀伊半島(水深20～50m, パショウガイ等の死骸の上のスナギンチャク類に着生)	
819 <i>Epitonium (Pupiscala) pupiformis</i> Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	カセイトカケ
分布:相模湾～紀伊半島, 南アフリカ(水深80～200m, 砂泥底)	
820 <i>Epitonium (Parviscalata) kamakurana</i> (Pilsbry, 1911)	カマクライトカケ
分布:房総半島以南, 四国, 九州(水深10～30m, 砂底)	
821 <i>Epitonium (Parviscalata) pallidizonta</i> (Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	ウスオビイトカケ
分布:相模湾～紀伊半島(水深60～100m, 砂底)	
822 <i>Epitonium (Parviscalata) yamakawai</i> (Yokoyama, 1922)	ヤマカワイトカケ
タイプ産地:千葉県成田市火竹(化石)	
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖, 三重県英虞湾(水深7～30m)	
823 <i>Epitonium (Parviscalata) kazusense</i> (Yokoyama, 1922)	カズサイトカケ
タイプ産地:千葉県市原市東(化石)	
産地:銚子沖(肥後・後藤, 1993)	
分布:銚子沖, 三陸沿岸(大槌湾)	
824 <i>Epitonium (Papyriscalata) clementinum</i> Grateloup, 1940	クレハガイ
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*), 千倉(清水), 天津, 小湊(大島1993), 浜行川(清水), 勝浦, 御宿(大島1993), 銚子(稻葉1963)	
分布:房総半島・但馬沖以南, 四国, 九州(潮間帶～20m, 細砂底)	
825 <i>Epitonium (Papyriscalata) tenuilirata</i> (Sowerby II, 1874)	ウスムラサキクレハガイ

分布:房総半島～遠州灘～伊勢湾;若狭湾(水深20～200m, 細砂底)	
826 <i>Epitonium (Papyriscala) imperiale</i> (Sowerby II, 1844)	チャイロクレハガイ
分布:相模湾～九州, フィリピン～オーストラリア, 南アフリカ(水深20～100m, 砂底)	
827 <i>Epitonium (Papyriscala) robillardii</i> (Sowerby III, 1894)	セキモリ
産地:浦安(千葉水試1957), 錦洲(清水), 富津(千葉県企業庁1979), 館山湾(田村1987; 村越1998; 舟谷ら*; 清水), 銚子(福葉1963)	
分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州(潮下部～水深20m, 細砂底)	
828 <i>Epitonium (Papyriscala) lyra</i> (Sowerby II, 1844)	ハブタエセキモリ
産地:館山湾(村越1998)	
分布:奄美大島以南, 沖縄(潮間帶～水深20m, 砂底)	
829 <i>Epitonium (Foliaceisale) actinariophila</i> (Masahito & Habe, 1976)	インギンチャクトカケ
分布:相模湾	
830 <i>Epitonium (Golbiscala) bullatum</i> (Sowerby II, 1844)	ウスカワイトカケ
分布:相模湾以南, インド・西太平洋(潮間帶～水深20m, 砂底)	
831 <i>Alexania inazawai</i> (Kuroda, 1943)	イナザワハベガイ
分布:相模湾, 遠州灘, 紀伊半島, 濱戸内海, 山口県北部, 九州北西岸(潮間帶, 岩礁)タテスジインギンチャクに半寄生	
832 <i>Alexania callizona</i> Habe, 1961	クロオビハベガイ
分布:房総半島以南, 四国, 九州(潮間帶, 岩礁地)	
833 <i>Cycloscala hyalina</i> (Sowerby II, 1844)	クルイトカケ
分布:相模湾・日本海以南, インド・西太平洋(潮間帶～水深20m, 砂底)	
834 <i>Cycloscala solutum</i> (A. Adams, 1862)	マキトケイトカケ
産地:館山湾(田村1987; 舟谷ら*)	
分布:紀伊半島以南, 四国, 九州(水深20～50m, 砂底)	
835 <i>Sagamiscala globosa</i> Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	フクロイトカケガイ
分布:相模湾～遠州灘(水深50～200m, 砂底)	
836 <i>Epitonium kandai</i> Kuroda & Azuma in Azuma, 1961	カンダイトカケ
分布:相模湾以南, 四国, 九州西岸(水深30～100m, 砂底)	
837 <i>Epitonium praeclarum</i> (A. Adams, 1861)	
分布:太平洋側 35° N	
838 <i>Epitonium sulcatum</i> (Sowerby II, 1844)	
分布:太平洋側 14～35° N	
839 <i>Epitonium trifasciatum</i> (Sowerby II, 1844)	
分布:太平洋側 0～35° N	
840 <i>Epitonium turricum</i> (Sowerby II, 1844)	
分布:太平洋側 14～35° N	
Superfamily Eulimoidea	ハナゴウナ上科
Family Eulimidae	ハナゴウナ科
841 <i>Eulima bifasciata</i> (A. Adams, 1863)	ハナゴウナ
産地:館山湾(田村1987; 舟谷ら*), 小湊(大島1993)	
分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州, 東シナ海(潮間帶～水深50m, 細砂底)	
842 <i>Eulima lacea</i> Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	ツヤハナゴウナ
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:鹿島灘, 相模湾, 遠州灘, 若狭湾(水深50～200m, 砂底)	
843 <i>Eulima maria</i> (A. Adams, 1861)	シロハリゴウナ
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州, 東シナ海(潮間帶～水深50m, 細砂底のナマコに着生)	
844 <i>Eulima unicincta</i> Yokoyama, 1922	ホソハリゴウナ
タイプ産地:千葉県成田市大竹(化石)	
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(潮間帶～水深20m, 砂底)	
845 <i>Eulima conspurcata</i> (A. Adams, 1863)	
分布:太平洋岸北緯35°	
846 <i>Eulima gracilenta</i> (A. Adams, 1863)	
分布:太平洋岸北緯35°	
847 <i>Eulima humilis</i> (A. Adams, 1863)	
分布:太平洋岸北緯35°	
848 <i>Eulima pumila</i> (A. Adams, 1863)	
分布:太平洋岸北緯35°	
849 <i>Melanella grandis</i> (A. Adams in H. & A.. Adams, 1853)	トノサマクリムシ
産地:小湊(大島1993)	
分布:房総半島・若狭湾以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(水深10～50m, 砂底)	
850 <i>Melanella martini</i> (A. Adams in H. & A.. Adams, 1853)	セトモノガイ
産地:館山湾(水深7.6～47.5m:田村1987; 舟谷ら*)	
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾(潮間帶～水深30m, 砂底)	
851 <i>Melanella tortuosa</i> (Adams & Reeve, 1850)	チュウクリムシ
産地:館山湾(田村1987)	
852 <i>Melanella robusta</i> (A. Adams, 1861)	イキオイクリムシ
分布:宮城県沖・男鹿半島以南, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帶～水深50m, 砂底, トゲモミジガイに着生)	
853 <i>Melanella luchuana</i> (Pilsbry, 1901)	リュウキュウクリムシ

产地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖以南, 相模湾, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~水深10m, 砂底)	
854 <i>Melanella shibana</i> (Yokoyama, 1927)	シバセトモノガイ
分布:相模湾(水深100~600m, 泥底のオキナマコに寄生)	
855 <i>Melanella persimilis</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	ハリノホクリムシ
产地:館山湾(水深53.0~120.0m;田村1987;奥谷ら*),銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖, 相模湾(水深150~250m)	
856 <i>Balcis musta</i> (Yokoyama, 1928)	ユキクリムシガイ
分布:相模湾以西, 駿河湾, 佐渡沖, 九州西岸(水深30~60m, 砂底)	
857 <i>Balcis sagamiana</i> (Yokoyama, 1920)	サガミセトモノガイ
分布:相模湾?	
858 <i>Cuspeulima peronellicola</i> Kuroda & Habe, 1950	カシバシヤドリニナ
产地:名洗(千葉県1977a)	
分布:鹿島灘・能登半島以南, 四国, 九州(潮, 砂泥底のヨツアナカシバン等に外部寄生)	
859 <i>Viteobalcis astropectinicola</i> (Kuroda & Habe, 1950)	トゲモミジヒトデヤドリニナ
产地:館山湾(田村1987;奥谷ら*),小湊(大島1993)	
分布:相模湾・若狭湾以南, 四国, 九州(潮間帯~水深30m, トゲモミジガイ, スナヒトデ, ヤツデスナヒトデに外部寄生)	
860 <i>Viteobalcis asteriophila</i> Habe (MS)	キヒトデヤドリニナ
分布:東京湾	
861 <i>Vitreolina aurata</i> (S. Hirase, 1920)	キンイロセトモノガイ
产地:館山湾(水深7.6m;田村1987;佐々木1989;奥谷ら*),小湊(猪野1942b;清水),銚子(渡辺1988)	
分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州(潮間帶, 岩礁のムラサキウニ, バフンウニ, アカウニ, クロウニ等の棘の間)	
862 <i>Viteolina langfordi</i> (Dall, 1925)	ムラサキウニヤドリニナ
分布:房総半島以南, 四国, 九州(ムラサキウニの棘の間)	
863 <i>Hypermastus subula</i> (A. Adams, 1863)	コガタツマミガイ
产地:館山湾(田村1987;奥谷ら*)	
分布:相模湾, 伊豆半島(水深10~50m, 砂底)	
864 <i>Mucronalia bicincta</i> A. Adams, 1860	フタオビツマミガイ
分布:相模湾・日本海(見島)以南, 上佐沖, 九州(水深50~150m, 砂底)	
865 <i>Mucronalia exilis</i> A. Adams, 1862	ヤセフタオビツマミガイ
产地:館山湾(田村1987;田村・奥谷1989;奥谷ら*)	
分布:館山湾・山口県北部沖以南, 遠州灘, 紀伊半島沖, 四国, 九州(水深10~50m, 砂底, ミヤジクモヒトデに外部寄生)	
866 <i>Apicalia habei</i> Waren, 1981	ヤツデヒトデヤドリニナ
产地:館山湾(佐々木1989;奥谷ら*),銚子(福葉1963;渡辺1988)	
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帶, 岩礁のヤツデヒトデ口辺に寄生)	
867 <i>Stilifer akahitode</i> Habe & Masuda, 1990	アカヒトデヤドリニナ
产地:小湊(大島1993;清水),勝浦(大島1993)	
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(潮間帶下部の岩礁にすむアカヒトデの腕の中)	
868 <i>Stilifer kawamurai</i> (Habe, 1976)	カワムラヤドリニナ
产地:銚子沖(奥谷2000)	
869 <i>Stilifer perdepressus</i> Dall, 1925	
タイプ产地:房総半島千倉	
产地:千倉(Dall 1925;小菅1972)	
870 <i>Pelseneeria castanea</i> (Dall, 1925)	クリイロヤドリニナ
分布:岩手県以南, 四国, 九州(潮間帶, アカウニの背面肛門付近に寄生)	
871 <i>Annulobalcis shimazui</i> Habe, 1965	トウマキクリムシ
分布:相模湾~紀伊半島(水深20~50m, 細砂底)	
872 <i>Annulobalcis yamamotoi</i> Habe, 1974	オオウミシダトウマキクリムシ
分布:三浦半島以西, 紀伊半島(オオウミシダの触手上に寄生)	
873 <i>Niso hizenensis</i> Kuroda & Habe, 1950	ヘソアキゴウナ
产地:勝浦(大島1993),銚子(渡辺1988)	
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(20m, 砂底)	
874 <i>Niso matsumotoi</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961	マツモトヘソアキゴウナ
分布:相模湾以南, 遠州灘, 紀伊半島沖(水深20~50m, 砂泥底)	
875 <i>Pyramidelloides miranda</i> (A. Adams, 1861)	レイシツボ
分布:房総半島・見島沖以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帶~水深20m, 砂底)	
876 <i>Thycia lacteum</i> (Kuroda, 1949)	ウラシマカタベ
产地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖以南, 四国(水深50~300m, ゴカクヒトデ類の一種に寄生)	
Order Neogastropoda	新腹足目
Superfamily Muricoidea	アクギガイ科
Family Muricidae	アクギガイ科
Subfamily Muricinae	アクギガイ亜科
877 <i>Murex (Murex) troscheli</i> Lischke, 1868	アクギガイ
产地:館山沖水深50m(奥谷ら1988),千倉沖水深70m(清水),鶴川(大島1993),天津(猪野1942c;大島1993;清水),小湊(猪野1942c;大島1993;小池1994;清水)	
分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 東シナ海, フィリピン, ニューギニア(水深10~70m, 砂底)	
878 <i>Murex (Murex) pecten</i> Lightfoot, 1786	ホネガイ

	产地:館山湾(お茶大館山1973),銚子(鶴岡ら1994) 分布:房総半島・対馬海峽以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(水深10~50m, 砂底)	
879	<i>Haustellum haustellum haustellum</i> (Linnaeus, 1758)	サツマツブリ
	产地:小湊(清水) 分布:紀伊半島・九州南部以南, 四国, 奄美, 沖縄, 热帶インド・太平洋(水深5~30m, 岩礁底)	
880	<i>Haustellum kiensis</i> (Kira, 1959)	キイツブリ
	分布:房総半島以南, 热帶インド・西太平洋(水深5~30m, 岩礁底)	
881	<i>Chicoreus (Chicoreus) asianus</i> Kuroda, 1942	オニサザエ
	产地:竹岡, 萩生, 富浦(清水), 館山湾(お茶大館山1973;堀越1990;佐々木1990;奥谷ら*;清水), 布良, 白浜, 千倉(清水), 太海(千葉水試1981a;大島1993;清水), 鶴川, 天津(大島1993;清水), 小湊(猪野1942c;大島1993;小池1994;清水), 安房(福井市博1962), 浜行川, 鶴原, 勝浦(大島1993;清水), 銚子(渡辺1988) 分布:房総半島・能登半島以南, 日本各地, 朝鮮, 台湾, 中国沿岸(潮間帯~水深30m, 岩礁)	
882	<i>Chicoreus (Triplex) torrefactus</i> (Sowerby II, 1842)	センジュモドキ
	分布:房総半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, 热帶インド・太平洋(潮間帯下部~水深20m, 岩礁)	
883	<i>Chicoreus (Triplex) brunneus</i> (Link, 1807)	ガンゼキボラ
	产地:竹岡(清水), 銚子(鶴岡ら1994) 分布:房総半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, 热帶インド・太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁)	
884	<i>Siratus pliciferoides</i> (Kuroda, 1942)	ハッキガイ
	产地:竹岡, 萩生, 金谷, 富山沖水深130m(清水), 太海, 鶴川(大島1993), 天津, 小湊(福井市博1962;猪野1942c;大島1993;清水), 浜行川(大島1993), 銚子(渡辺1988) 分布:房総半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, 台湾, 東シナ海, 西太平洋(水深50~200m, 細砂底)	
885	<i>Chicomurex superbus</i> (Sowerby III, 1889)	オガサワラガンゼキ
	产地:湘崎(奥谷ら*) 分布:伊豆諸島・紀伊半島以南, 热帶西太平洋(水深20~300m, 岩礁)	
886	<i>Chicomurex elliscrossi</i> Fair, 1974	カザリガンゼキ
	分布:房総半島以南(水深80~150m, 岩礁)	
887	<i>Pterynotus alatus</i> (Röding, 1798)	バショウガイ
	产地:館山湾(龍虎1949) 分布:紀伊半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, 台湾, インド・西太平洋(潮下部~水深50m, 岩礁)	
888	<i>Dermomurex (Takia) infrons</i> Vokes, 1974	オシロイツノオリイレ
	分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州(水深50~300m, 砂礫底)	
	Subfamily Muricopsinae	ヒショウラク亜科
889	<i>Muricopsis (Murexsul) multispinosus</i> (Sowerby III, 1904)	アザミツブリ
	产地:館山湾(水深84m;藤田1929b;32.7~63.7m;田村1987;41m;千葉水試1980b;奥谷ら*), 洲崎水深64m(千葉水試1980b), 小湊(猪野1942c), 銚子(Kuroda 1929;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988) 分布:房総半島・若狭湾以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾, フィリピン(水深50~200m, 砂底)	
890	<i>Muricopsis (Murexsul) zonata</i> (Hayashi & Habe, 1956)	シマアザミツブリ
	分布:相模湾以南(水深30~60m, 砂礫底)	
891	<i>Muricopsis (Murexsul) interserrata</i> (Sowerby II, 1841)	ヒナノカムリ
	产地:館山湾(奥谷ら*), 小湊(大島1993) 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾, フィリピン(水深50~150m, 砂礫底)	
892	<i>Muricopsis (Murexsul) aurata</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	コガネヒメウラクガイ
	分布:相模湾(50~100m, 砂礫底)	
893	<i>Favartia brebicula</i> (Sowerby II, 1841)	ヒショウラク
	产地:浜行川(清水) 分布:伊豆半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 热帶インド・太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁)	
894	<i>Favartia munda</i> (Sowerby II, 1849)	ゴカクヨウラク
	分布:房総半島~沖縄(潮間帯~水深20m, 岩礁)	
895	<i>Favartia morisakii</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961	モリサキヨウラク
	产地:館山湾(水深47.5;田村1987;奥谷ら*), 千倉(清水), 小湊(大島1993), 大原(清水) 分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~水深20m, 岩礁)	
	Subfamily Typhinae	パイプヨウラク亜科
896	<i>Typhis (Typhinellus) montfortii</i> (A. Adams, 1863)	パイプヨウラク
	产地:館山湾(水深31.5~50.0m;田村1987;奥谷ら*) 分布:相模湾以南, 四国, 九州, 隠岐島(水深50~200m, 砂底)	
897	<i>Typhis (Typhinellus) imperialis</i> Keen & Campbell, 1964	ミカドパイプヨウラク
	分布:相模湾~高知県沖(水深100~200m, 砂礫底)	
898	<i>Siphonocheilus nipponeensis</i> Keen & Campbell, 1964	ニッポンエントツヨウラク
	分布:相模湾以南(水深20~100m, 砂底)	
899	<i>Siphonocheilus japonicus</i> (A. Adams, 1863)	エントツヨウラク
	产地:館山湾(田村1987;奥谷ら*), 銚子(櫻井1964;渡辺1988) 分布:三陸沿岸(大槌湾)以南, 相模湾, 四国(土佐沖), 九州, 若狭湾(水深20~200m, 砂底)	
	Subfamily Ergalatinae	カゴメガイ亜科
900	<i>Lataxiella fimbriata</i> (Hinds, 1844)	オニカゴメガイ
	产地:銚子(渡辺1988) 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 九州, 台湾, フィリピン, オーストラリア(潮間帯~水深50m, 岩礁底)	
901	<i>Cytharomorula vexillum</i> Kuroda, 1953	カスリボラ
	产地:銚子(渡辺1988) 分布:銚子沖・伊豆諸島・相模湾以西, 四国, 九州(西岸)(水深100~250m, 砂底)	
902	<i>Bedeva birileffi</i> (Lischke, 1871)	カゴメガイ

- 产地:館山湾(水深32.0~42.0m:田村1987;奥谷ら*),小湊(tijima,1998;清水),奥津(大島1993),名洗(千葉県1977a),外川,犬吠埼(千葉県1977b),銚子(渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 台湾(潮間帯~水深50m, 岩礁底)
- 903 *Cronia margariticola* (Broderip, 1833) ウネレイシダマシ
产地:館山湾(佐々木1989;奥谷ら*:清水),沖ノ島(お茶大館山1973),浜行川(清水)
分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 热帯インド・太平洋海塙(潮間帯, 岩礁)
- 904 *Ergalatax contractus* (Reeve, 1846) ヒメヨウラク
产地:竹岡, 萩生, 金谷(清水), 保田(千葉県1983;清水), 勝山(田中ら1974;清水), 富山(富山水深67m;清水), 富浦(千葉県1983;清水), 館山湾(水深18m:千葉水試1980b;田村1987;佐々木1989;堀越1990;奥谷ら*:清水), 湾崎水深64m(千葉水試1980b), 布良, 白浜, 千倉(清水), 太海(千葉水試1981a;大島1993;清水), 小湊(猪野1942c;大島1993;小池1994;清水), 鶴原(清水), 勝浦(大島1993;清水), 銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, インド・太平洋海塙(潮間帯~水深20m, 砂礫・岩礁底)
- 905 *Ergalatax tokugawai* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 トクガワヒメヨウラク
产地:銚子(渡辺1988)
分布:銚子沖~遠州灘(水深50~200m, 砂礫底);若狭湾(水深99~125m)
- 906 *Muricodrupa fusca* (Küster, 1862) レイシダマシモドキ
分布:房総半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯下部, 岩礁)
- 907 *Muricodrupa* sp. コウシレイシダマシ
产地:館山湾(佐々木1989;奥谷ら*)
分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋(潮間帯~水深10m, 岩礁)
Subfamily Ocenebrinae
908 *Ocenebra fimbriatula* (A. Adams, 1863) ヨウラクガイ亞科
チヂワヨウラク
分布:相模湾・富山湾以南, 紀伊半島沖, 九州西岸沖(水深50~120m, 岩礁底)
- 909 *Ocenebra puteola* A. Adams, 1863b ヒレガイ
タイプ产地:Tsusaki(洲崎) 分布:同
910 *Ceratostoma burnetti* (Adams & Reeve in Reeve, 1849) イソバシヨウ
产地:銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:房総半島・対馬海峡以北, 日本海, 北海道, 沿海州, 千島(潮間帯~水深100m, 岩礁)
- 911 *Ceratostoma fournieri* (Crosse, 1861) オオウヨウラク
产地:竹岡, 萩生, 金谷, 保田, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1990;奥谷ら*:清水), 沖ノ島(お茶大館山1973), 白浜, 千倉(千葉水試1980a;清水), 太海(千葉水試1981a;清水), 鶴川, 天津, 小湊, 浜行川(大島1993;清水), 鶴原, 勝浦(清水), 銚子(宇野ら1965)
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州南部(潮間帯~水深20m, 岩礁)
- 912 *Ceratostoma inornatus* (Récluz, 1851) エゾヨウラク
产地:東京湾内湾, 富津岬, 内房, 外房, 板橋町(黒住2000), 竹岡, 萩生, 金谷, 保田, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(水深60.0m:田村1987;奥谷ら*:清水), 白浜, 千倉, 太海(清水), 鶴川, 天津, 小湊, 行川(大島1993;清水), 名洗(千葉県1977a), 銚子(稻葉1963;宇野ら1965;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:北海道・男鹿半島以南, 九州, 朝鮮, 中国(潮間帯~水深20m, 岩礁)
- 913 *Ceratostoma inornatus endermonis* (Smith, 1875) ハネナシヨウラク
产地:銚子(渡辺1988)
分布:北海道・山形県以南, 九州西岸(潮間帯~水深20m, 岩礁)
- 914 *Ceratostoma ririflum* (Adams & Reeve, 1850) タカノハヨウラク
分布:北海道西南部以南, 四国, 九州, 日本海, 朝鮮, 中国(潮間帯~水深20m, 岩礁)
- 915 *Ceratostoma speciosum* (A. Adams, 1855) シキシマヨウラク
タイプ产地:館山湾 分布:館山湾
916 *Pteropurpura* (*Pteropurpura*) *plorator* (Adams & Reeve, 1850) タカノハヨウラク
产地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(藤田1929b;清水), 天津, 小湊(大島1993;清水), 九十九里沖大型魚礁(清水), 名洗(千葉県1977a)
分布:房総半島・山口県見島以南, 四国, 九州, 朝鮮(水深50~200m, 砂礫底)
- 917 *Pteropurpura* (*Pteropurpura*) *esycus* DaH, 1925 チリメンタカノハヨウラク
产地:九十九里沖大型魚礁(清水)
分布:紀伊半島南, 四国, 九州(水深150~200m, 砂礫底)
- 918 *Pteropurpura* (*Pteropurpura*) *stimpsoni* (A. Adams, 1863) シキシマヨウラク
产地:小湊(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布:房総半島・若狭湾以南, 四国, 九州(水深30~200m, 砂礫底)
- 919 *Pteropurpura* (*Pteropurpura*) *vespertilio* (Kira, 1954) コウモリヨウラク
产地:房総半島(奥谷1975)
分布:伊豆諸島沖以西, 四国, 九州西岸沖(水深50~200m, 砂礫底)
- 920 *Pteropurpura* (*Pteropurpura*) *monoptera* (Pilsbry, 1904) タカハネヨウラク
产地:銚子(渡辺1988)
分布:房総半島以南, 四国, 九州(水深20~50m, 砂礫底)
- 921 *Pteropurpura* (*Ocinebrillus*) *falcata* (Sowerby II, 1840) ヨウラクガイ
产地:館山湾(清水)
分布:北海道南部・能登半島以南, 四国, 九州, 台湾, 朝鮮(20~200m, 岩礁底)
- 922 *Pteropurpura* (*Ocinebrillus*) *adunca* (Sowerby I, 1834) イセヨウラク
产地:竹岡, 萩生, 富浦, 館山湾(堀越1990;清水), 白浜, 千倉(清水), 太海, 鶴川(清水), 天津, 小湊, 浜行川(大島1993;清水), 安房(福井市博1962), 銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:サハリン・北海道以南, 本州, 四国, 九州(潮間帯~水深50m, 岩礁底)
- 923 *Nucella lima* (Gmelin, 1791) チヂミボラ
产地:銚子(稻葉1963;櫻井1964;宇野ら1965;渡辺1988;鶴岡ら1994;清水)
分布:房総半島・山形県(妻鹿)以北, 三陸沿岸, 北海道, 千島, オホーツク海(潮間帯~水深20m, 岩礁)
Subfamily Rapaninae
924 *Drupella cornuta* (Röding, 1798) シロレイシダマシ

- 分布:房総半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, 热帶印度・太平洋(潮間帯～水深20m, サンゴ礁)
- 925 *Drupella eburnea* (Klüster, 1862) ニセシロレイシグマシ
- 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 热帶太平洋(潮間帯～水深20m, サンゴ礁)
- 926 *Morula granulata* (Duclos, 1924) レイシグマシ
- 産地:勝山(田中ら1974)
- 分布:伊豆諸島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, 热帶印度・太平洋(潮間帯, 岩礁)
- 927 *Morula musiva* (Kiener, 1834) シマレイシグマシ
- 産地:館山湾(佐々木1989;奥谷ら*), 沖ノ島(お茶大館山1973)
- 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 热帶印度・太平洋(潮間帯, 岩礁)
- 928 *Morula funiculata* (Reeve, 1846) クロフレイシグマシ
- 産地:館山湾(佐々木1989)
- 分布:伊豆諸島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, フィリピン(潮間帯～水深20m, 岩礁)
- 929 *Habromorula spinosa* (H. & A. Adams, 1853) トゲレイシグマシ
- 分布:房総半島以南, 热帶印度・太平洋(潮間帯下部～水深20m, 岩礁)
- 930 *Habromorula borealis* (Pilsbry, 1904) ハチジョウレイシグマシ
- 分布:房総半島以南(潮間帯下部～潮下带, 岩礁)
- 931 *Drupa (Drupa) rycinus hadari* Emerson & Cernohorsky, 1973 シロイガレイシ
- 産地:館山湾(佐々木1989;堀越1990), 銚子(渡辺1988)
- 分布:房総半島・伊豆諸島以西, 紀伊半島, 四国(土佐), 九州, 大隅諸島, 紅海(潮間帯～水深10m, 岩礁)
- 932 *Mancinella siro* (Kuroda, 1931) シロレイシ
- 産地:萩生(清水), 館山湾(佐々木1989;清水), 白浜, 千倉(清水), 鶴川(大島1993), 天津, 小湊, 浜行川(大島1993;清水), 鶴原(清水)
- 分布:房総半島・山口県北部以南, 紀伊, 四国(土佐)(潮間帯～水深20m, 岩礁)
- 933 *Mancinella echinata* (Blainville, 1832) ウニレイシ
- 産地:勝山(田中ら1974), 館山湾(水深24.3m;田村1987;奥谷ら*), 天津(大島1993;天津), 小湊(猪野1942c;大島1993), 浜行川(大島1993)
- 分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 奄美, 沖縄, 热帶太平洋(潮間帯～20m, 岩礁)
- 934 *Thais (Semiricinula) sp.* オハグロレイシ
- 産地:館山湾(佐々木1989;奥谷ら*;清水), 白浜, 千倉(千葉水試1980a;清水), 太海(千葉水試1981a;清水)
- 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帯～潮下带, 岩礁)
- 935 *Thais (Reishia) bronni* (Dunker, 1860) レイシガイ
- 産地:富津(千葉県企業庁1979), 竹岡, 萩生, 金谷(清水), 保田(千葉県1983;清水), 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1989;村越1998;奥谷ら*;清水), 沖ノ島(お茶大館山1973), 洲崎(福井市博1962), 布良, 白浜, 千倉(清水), 太海(千葉水試1981a;大島1993;清水), 鶴川, 天津(大島1993;清水), 小湊(岩川1900;猪野1942c;福葉1963a;大島1993;小池1994;lijima, 1998;清水), 安房(岩川1900), 勝浦, 御宿, 大原(大島1993;清水), 名洗(千葉県1977a), 銚子(鹿股ら1962;福葉1963;宇野ら1965;渡辺1988;鶴岡ら1994)
- 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州, 中国, 朝鮮(潮下带, 岩礁)
- 936 *Thais (Reishia) kyteistima* (Holten, 1803) クリイフレイシ
- 産地:保田, 富浦(千葉県1983;清水), 館山湾(佐々木1990;奥谷ら*;水深20m;清水), 布良, 白浜, 千倉, 鶴川(清水), 天津, 小湊, 浜行川(大島1993;清水), 名洗(千葉県1977a)
- 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州, 中国, 東南アジア(潮間帯下部～水深10m, 岩礁)
- 937 *Thais (Reishia) clavigera* (Klüster, 1860) イボニシ
- 産地:新浜(風呂田1980), 富津, 大佐和, 淡, 竹岡, 萩生, 金谷, 保田, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(お茶大館山1973;水深7.6m;田村1987;佐々木1989;奥谷ら*;清水), 洲崎(福井市博1962), 布良, 白浜, 千倉(清水), 太海, 鶴川, 天津(大島1993;清水), 小湊(猪野1942c;福葉1963a;神奈川県博1972;堀越ら1987;大島1993;小池1994;lijima, 1998;清水), 勝浦(千葉水試1977;大島1993;清水), 御宿, 大原(大島1993;清水), 犬吠埼(千葉県1977b), 銚子(福葉1963;宇野ら1965;渡辺1988)
- 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, 台湾, 中国(潮間帯中部～下部, 岩礁)
- 938 *Pinaxia coronata* A. Adams, 1851 ミカンレイシ
- 産地:館山湾(村越1998)
- 分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 南西諸島(潮間帯～水深20m, 岩礁)
- 939 *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) アカニシ
- 産地:江戸川放水路(市川市博1993), 新浜(風呂田1976), 五井沖(風呂田1984), 斑洲沖(風呂田1984;清水), 木更津(千葉水試1923;清水), 富津(千葉水試1922;千葉県企業庁1977-1979;清水), 東京湾(神奈川県博1972), 富津南(水深5.8m), 大佐和, 淡, 竹岡, 萩生, 金谷, 保田, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(福井市博1962;清水), 沖ノ島(お茶大館山1973), 白浜(清水), 鶴川, 小湊, 鶴原, 勝浦(大島1993;清水), 九十九里浜(清水), 銚子(福葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994), 千葉県(長谷川1996)
- 分布:北海道南部以南, 本州, 四国, 九州, 日本海, 台湾, 中国(潮間帯～水深30m, 砂泥底), 黒海, 地中海(日本から移入)
- 940 *Rapana bezoar* (Linnaeus, 1758) チリメンボラ
- 産地:萩生(清水), 小湊(神奈川県博1972;大島1993), 銚子(鹿股ら1962;福葉1963;渡辺1988), 房総半島(長谷川1996)
- 分布:北海道南部・能登半島以南, 本州, 四国, 九州, 台湾, 中国, フィリピン, インド洋北部(水深10～50m, 砂泥底)
- Subfamily Trophoninae シノオリイレガイ亜科
チゴツノオリイレ
- 941 *Trophonopsis kamchatkana* (Dall, 1902) カゲロウツノオリイレ
- 分布:鹿島灘・日本海北部以北, 千島, ベーリング海(水深95～1,530m)
- 942 *Trophonopsis polycyma* Kuroda, 1953 オニノツノオリイレ
- 分布:相模湾以南, 殿河湾, 遠州灘～インド洋南西部(水深150～200m, 細砂底)
- 943 *Nipponotrophon gorgon* (Dall, 1913) コンゴウツノオリイレ
- 産地:銚子(櫻井1964;神奈川県博1972)
- 分布:銚子沖以南, 相模湾, 殿河湾, 遠州灘, 紀伊沖, 土佐沖, 九州南岸, 山形県沖(水深100～300m, 砂泥底)
- 944 *Nipponotrophon echinus* (Dall, 1918) マメツノオリイレ
- 産地:竹岡, 萩生, 金谷, 富山, 館山湾(清水), 小湊(大島1993;清水), 九十九里沖ミゾ場(清水), 銚子(福葉1963;渡辺1988)
- 分布:銚子沖以南, 相模湾, 殿河湾～台湾(水深100～600m, 砂礫底)
- 945 *Abyssotrophon soyoae minimus* (Okutani, 1964) マメツノオリイレ
- 分布:北海道(恵山沖)以南, 東北, 鹿島灘(水深800～1250m)
- 946 *Abyssotrophon* sp.

産地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995)	
分布:房総沖から相模湾(漸深海帶上部)	
947 <i>Boreotrophon candelabrum</i> (Reeve, 1847)	ツノオリイレ
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*),犬吠埼(東北東沖水深157m:清水),銚子(稻葉1963;渡辺1988)	
分布:紀伊半島以北,三陸沖,北海道,千島,サハリン,日本海(若狭湾),瀬戸内海(潮間帯~水深200m,砂礫底)	
948 <i>Boreotrophon xestra xestra</i> Dall, 1918	ケショウツノオリイレ
分布:駿河湾,若狭湾以北,北海道,千島,ベーリング海(水深100~400m,砂泥底)	
949 <i>Boreotrophon xestra nipponicus</i> (Yokoyama, 1920)	ヤマツツノオリイレ
分布:相模湾・三宅島以北,三陸沿岸,北海道南部(水深500~1,200m,泥底)	
950 <i>Boreotrophon flos</i> Okutani, 1964	ヤグルマツノオリイレ
分布:鹿島灘以北,三陸沖(水深600~1,000m,砂底)	
951 <i>Boreotrophon alaskanus</i> Dall, 1902	シロハシツノオリイレ
産地:銚子(櫻井1964;渡辺1988)	
分布:鹿島灘以北,北海道,千島,ベーリング海(水深50~450m,砂底)	
952 <i>Trophonopsis delicatus</i> Kuroda, 1953	ヒナツツノオリイレ
分布:東北(三陸沿岸)以南,四国(土佐沖),九州(水深100~500m,細砂底)	
953 <i>Boreotrophon</i> n. sp. (大島1993)	
産地:浜行川(大島1993)	
Subfamily Coralliophilinae	サンゴヤドリガイ亜科
954 <i>Lathaxis mawae</i> (Griffith & Pidgeon, 1834)	ミズスイ
産地:富浦(稻葉1963a),小湊(大島1993)	
分布:房総半島・日本海見島以南,四国,九州,奄美,沖縄,フィリピン,オーストラリア,南アフリカ(水深50~200m,腔腸動物の一種に寄生)	
955 <i>Babelomurex stenospinus</i> (Kuroda, 1961)	クチムラサキミズスイ
分布:房総半島以南,四国,九州西岸(水深50~200m,岩礁)	
956 <i>Babelomurex deburghiae</i> (Reeve, 1857)	キキヨウニシ
産地:鶴川,天津,浜行川(大島1993)	
分布:房総半島・伊豆諸島・山口県見島以南,四国,九州,奄美,沖縄,台湾,南シナ海,フィリピン,インドネシア(水深20~200m,岩礁)	
957 <i>Babelomurex japonicus</i> (Dunker, 1882)	テンニヨノカムリ
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:房総半島・九州西岸以南,四国,九州,奄美,沖縄,東シナ海,フィリピン,ハワイ(水深30~360m,砂礫底)	
958 <i>Babelomurex lischkeanus</i> (Dunker, 1882)	カセンガイ
産地:天津,小湊(大島1993),銚子(渡辺1988)	
分布:房総半島・九州西岸以南,四国,九州,奄美,沖縄,台湾,東シナ海,南シナ海,フィリピン,オーストラリア,ニュージーランド(水深50~200m,砂礫底)	
959 <i>Babelomurex tosanus</i> (Hirase, 1908)	トサカセン
分布:房総半島・伊豆諸島以南,四国,九州,奄美,沖縄,南シナ海,フィリピン(水深50~200m,砂底)	
960 <i>Babelomurex spinosus</i> (Hirase, 1908)	ヒメカセン
分布:房総半島・九州西岸以南,四国,九州,奄美,沖縄,東シナ海,南シナ海,フィリピン,オーストラリア北部(水深50~200m,岩礁)	
961 <i>Babelomurex (Echinolataxis) kiranus</i> (Kuroda, 1959)	キラカセン
産地:天津,小湊(大島1993)	
分布:土佐沖・九州西岸以南,奄美,沖縄,南シナ海(水深100~200m,岩礁)	
962 <i>Coralliophila (Mipus) crebrilamellosus</i> (Sowerby III, 1913)	チヂワサンゴヤドリ
産地:御宿(大島1993)	
分布:紀伊半島・九州西岸以南,奄美,沖縄,台湾,南シナ海(水深30~60m,岩礁・サンゴ礁)	
963 <i>Coralliophila squamoissima</i> (E. A. Smith, 1876)	カゴメサンゴヤドリ
産地:館山湾(田村1987;佐々木1989;奥谷ら*)	
分布:房総半島・小笠原・山口県北部以南,九州,奄美,沖縄,台湾(潮間帯~水深20m,岩礁のインギンチャク類,スナギンチャク類,イシサンゴ類に付着)	
964 <i>Emozamia lamellata</i> Habe, 1952	ヒレサンゴ・ヤドリ
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖・紀伊半島以南,四国,九州,フィリピン,オーストラリア(水深100~200m,岩礁)	
Family Turbinellidae	オニコブシガイ科
965 <i>Benthovoluta hilgendorfi</i> (v. Martens, 1897)	ツノキフデ
産地:天津,小湊(大島1993;清水),銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988)	
分布:房総半島以南,相模湾,四国沖,九州西岸(水深50~200m,砂底);喜界島,沖縄新里層(化石)	
966 <i>Columbarium pagoda pagoda</i> (Lesson, 1834)	イトグルマ
産地:和田沖水深150m(清水),鶴川(大島1993),天津,小湊(大島1993;清水),浜行川(大島1993),銚子(稻葉1963;櫻井1964)	
分布:銚子沖・能登半島以西,遠州灘,四国沖,九州(水深20~300m,粗砂底)	
Family Columbellidae	フトコロガイ科
967 <i>Euplica turturina</i> (Lamarck, 1822 in 1825-22)	マルフトコロ
分布:房総半島・九州南岸以南,四国,奄美,沖縄,西太平洋(潮間帯~水深20m,岩礫地)	
968 <i>Euplica scripta</i> (Lamarck, 1822 in 1825-22)	フトコロガイ
産地:竹岡,萩生,金谷,勝山,富山,富浦(清水),館山湾(お茶大館山1973;田村1987;佐々木1989;村越1998;奥谷ら*:清水),布良,白浜,千倉(清水),太海(千葉水試1981a;清水),鷲川(清水),天津(大島1993;清水),小湊(猪野1942c;大島1993;清水),安房(岩川1900),浜行川(千葉水試1977;大島1993;清水),勝浦,御宿(大島1993;清水),銚子(稻葉1963)	
分布:房総半島以南,四国,九州,奄美,沖縄,西太平洋(潮間帯~水深20m,岩礁・藻等の海藻上)	
969 <i>Euplica borealis</i> (Pilsbry, 1904)	ヒメマルフトコロ
産地:館山湾(堀越1990;村越1998)	
分布:伊豆諸島,紀伊半島以南,四国,奄美,沖縄(潮間帯,岩礁)	
970 <i>Euplica varians</i> (Sowerby I, 1832)	チヂミフトコロ

- 分布:房総半島以南, 热帶印度・太平洋(潮間帶～潮下部, 岩礁・サンゴ礁)
- 971 *Pyrene flava* (Bruguière, 1789 in 1789-1816) ムシエビ
 産地:竹岡, 萩生, 金谷, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(福井市博1962; 佐々木1989; 堀越1990; 奥谷ら*: 清水), 布良, 白浜, 千倉, 鶴川(清水), 天津(大島1993; 清水), 小湊(猪野1942c; 神奈川県博1972; 大島1993; 清水), 安房(岩川1900), 勝浦, 御宿(大島1993; 清水), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963)
 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋域(潮間帶～潮下部, 岩礁の海藻上)
- 972 *Pyrene testudinaria tylerae* (Gray in Griffith & Pidgeon, 1834) マツムシ
 産地:竹岡, 萩生, 金谷, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(田村1987; 佐々木1989; 村越1998; 奥谷ら*: 清水), 布良, 白浜(清水), 千倉(千葉水試1980a; 清水), 太海(千葉水試1981a; 清水), 鶴川(清水), 天津(大島1993; 清水), 小湊(猪野1942c; 神奈川県博1972; 大島1993; 小池1994; 清水), 安房(岩川1900), 浜行川(千葉水試1977; 清水), 勝浦, 御宿(大島1993; 清水), 銚子(稻葉1963)
 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋域(潮間帶～水深20m, 岩礁の海藻上)
- 973 *Anachis misera misera* (Sowerby II, 1844 in 1842-87) ポサツガイ
 産地:竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(田村1987; 佐々木1989; 堀越1990; 奥谷ら*: 清水), 洱埼水深64m(千葉水試1980b), 布良(清水), 白浜(千葉水試1980a; 清水), 千倉, 太海(千葉水試1981a; 清水), 鶴川(清水), 天津(大島1993; 清水), 小湊(清水), 浜行川(千葉水試1977; 1980a; 清水), 勝浦(清水), 銚子(稻葉1963; 渡辺1988)
 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 朝鮮南部, 西太平洋(潮間帶～水深40m, 岩礁底の海藻上)
- 974 *Anachis misera forma nigromaculata* (Tomlin, 1915) クロフボサツ
 産地:館山湾(村越1998)
 分布:奄美大島以南, 沖縄, 热帶太平洋(潮間帶～水深20m, 岩礁の海藻上)
- 975 *Anachis misera polynyma* Pilsbry, 1901 シヨウボサツガイ
 分布:房総半島・若狭湾以南, 四国, 九州(潮間帶, 岩礁の海藻上)
- 976 *Mitrella burchardi* (Dunker, 1877) コウダカマツムシ
 産地:竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(田村1987; 奥谷ら*: 清水), 布良, 白浜, 千倉, 鶴川(清水), 天津, 小湊, 勝浦, 御宿(大島1993; 清水), 白里冲採苗器(清水), 名洗(千葉県1977a), 銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
 分布:駿河湾・九州西岸以北, 本州, 北海道, 千島, サハリン, 沿海州, カムチャッカ(潮間帶～水深20m, 砂礫底)
- 977 *Mitrella bicincta* Gould, 1860 ムギガイ
 産地:竹岡, 萩生, 金谷(清水), 勝山(田中ら1974; 清水), 富山, 富浦(清水), 館山湾(田村1987; 佐々木1989; 村越1998; 奥谷ら*: 水深20m; 清水), 布良, 白浜(清水), 千倉(千葉水試1980a; 清水), 太海, 鶴川(清水), 天津(大島1993; 清水), 小湊(猪野1942c; 大島1993; 小池1994; Iijima, 1998; 清水), 浜行川(千葉水試1977; 清水), 勝浦, 御宿(大島1993; 清水), 白里冲採苗器(清水), 名洗(千葉県1977a), 銚子(稻葉1963; 宇野ら1965; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋域(潮間帶～水深20m, 岩礁の海藻上)
- 978 *Mitrella anachisoidea* Nomura & Niino, 1940 ウネマツムシ
 産地:天津(大島1993), 銚子(渡辺1988)
 分布:銚子沖・能登半島以南, 四国, 九州(水深30～100m, 砂礫底)
- 979 *Mitrella moleculina* (Duclos, 1840 in 1835-40) チビムギガイ
 産地:銚子(渡辺1988)
 分布:房総半島以南, 热帶印度・西太平洋(潮間帶下帯～水深20m, 岩礁)
- 980 *Mitrella (Sulcomitrella) bicinctella* Yokoyama, 1928 キジビキムギガイ
 産地:館山湾(田村1987; 奥谷ら*: 銚子(渡辺1988))
 分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深50～250m, 細砂底)
- 981 *Mitrella (Sulcomitrella) monodonta* Habe, 1958 キバムギガイ
 産地:銚子(渡辺1988)
 分布:銚子沖以南, 遠州灘, 四国, 九州(水深50～100m, 砂礫底)
- 982 *Mitrella (Sulcomitrella) circumstriata* (Schepman, 1911 in 1908-13) カナマルムギガイ
 産地:銚子(渡辺1988)
 分布:房総半島以南, 四国, 九州(水深100～200m, 砂底) 土星 in 奥谷2000によれば土佐湾以南
- 983 *Mitrella (Indomitrella) lischkei* (E. A. Smith, 1879) シラゲガイ
 産地:竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(田村1987; 村越1998; 奥谷ら*: 清水), 布良, 白浜, 千倉, 鶴川(清水), 天津, 小湊, 勝浦, 御宿(大島1993; 清水), 銚子(渡辺1988)
 分布:青森県・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾(水深10～100m, 砂礫底)
- 984 *Mitrella (Indomitrella) yabei* (Nomura, 1935) スミシラゲガイ
 分布:三陸沿岸・佐渡島以南, 四国, 九州, 沖縄(水深10m, 内湾の砂底)
- 985 *Mitrella (Indomitrella) turriculata* (Yokoyama, 1922) ホソシラゲガイ
 分布:相模湾
- 986 *Mitrella (Indomitrella) martensi* (Lischke, 1871) マルテンスマツムシ
 産地:蒲安(千葉水試1957), 豊洲, 竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(堀越1990; 清水), 白浜, 千倉, 鶴川, 小湊, 勝浦, 白里冲採苗器(清水), 銚子(稻葉1963; 渡辺1988)
 分布:北海道南部・佐渡島以南, 本州, 四国, 九州(潮間帶, 内湾の海藻の間)
- 987 *Mitrella saito* Kuroda (MS) サイトウマツムシ
 産地:銚子(渡辺1988)
 分布:銚子沖・佐渡島沖～九州西岸(水深50～300m, 岩礁底)
- 988 "Mitrella" sp.
 産地:房総半島沖水深507～578m泥底(小田ら1995)
- 989 *Sundamitrella impolita* (Sowerby II, 1844 in 1842-87) カムロガイ
 産地:竹岡, 萩生, 金谷, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1989; 堀越1990; 村越1998; 奥谷ら*: 清水), 布良, 白浜, 千倉, 鶴川(清水), 天津, 小湊, 勝浦, 御宿(大島1993; 清水), 安房(福井市博1962), 銚子(稻葉1963; 渡辺1988)
 分布:房総半島・九州北西岸以南, 四国(潮間帶, 岩礁)
- 990 *Zemitrella? siligo* Okutani, 1964 ホソオビワタゾコムギガイ
 分布:相模湾
- 991 *Pyreneola pleurotomoides* (Pilsbry, 1895) クダマキマツムシ
 タイプ产地:館山市坂田
 産地:館山湾(坂田:Pilsbry, 1895; 田村1987; 堀越1990; 奥谷ら*: 天津, 勝浦, 御宿(大島1993))
 分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(潮間帶下部, 岩礁上の海藻の間)

992 <i>Pyreneola semiplicata</i> (Sowerby III, 1894)	カグロウマツムシ
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*;水深20m;清水) 分布:相模湾・能登半島以南, 四国, 九州(潮間帯下部~水深20m, 岩礁の海藻中)	
993 <i>Mokumea divaricata</i> (Pilsbry, 1904)	モクメニナ
分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深20m, 海藻上)	
994 <i>Zafra (Zafra) mitriformis</i> A. Adams, 1860	ノミニナモドキ
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*), 御宿(大島1993), 大原(清水), 銚子(渡辺1988) 分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州(潮間帯, 岩礁の海藻中)	
995 <i>Zafra (Zafra) pumila</i> (Dunker, 1860)	ノミニナ
産地:銚子(渡辺1988) 分布:三陸沿岸・佐渡島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯, 岩礁の海藻中)	
996 <i>Zafra (Zafra) sinensis</i> (Sowerby, 1894)	ケシマツムシ
産地:館山湾(田村1987;田村・奥谷1989;奥谷ら*) 分布:千葉県館山湾・能登半島以南, 四国, 九州, 沖縄, 台湾, 中国(潮間帯~水深20m, 岩礁の海藻中)	
997 <i>Zafra (Zafra) dautzenbergi</i> (Hervier, 1899)	ウネナシノミニナ
産地:館山湾(田村1987;田村・奥谷1989;奥谷ら*) 分布:千葉県館山湾・佐渡島以南, 四国, 九州, 沖縄(潮間帯~水深20m, 岩礁底)	
998 <i>Zafra (Zafra) sp.</i>	サラサノミニナ
分布:房総半島以南(潮下带, 海藻の上)	
999 <i>Clathranachis japonica</i> (A. Adams, 1860)	カゴメヌカボラ
産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*), 太海(大島1993) 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 西南太平洋(潮間帯~水深100m, 砂礫底)	
1000 <i>Aesopus (Aesopus) japonicus</i> (Gould, 1860)	コハナマツムシ
産地:白浜(清水) 分布:紀伊半島・九州北西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄(潮間帯~水深20m, 岩礁)	
Family Nassariidae	ムシロガイ科 キンシバイ
1001 <i>Alectriom glans</i> (Linnaeus, 1758)	
産地:館山湾(船形:稻葉1963a;清水), 房総半島(奥谷ら1988) 分布:房総半島・山口県萩市以南, 四国, 九州(水深10~20m, 細砂底)	
1002 <i>Pliarcularia bellula</i> (A. Adams, 1852)	カニノテムシロ
産地:銚子(渡辺1988) 分布:銚子沖・紀伊半島・九州南岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯, 内湾のアマモ帶)	
1003 <i>Niotha variegata</i> (A. Adams, 1852)	アラレガイ
産地:竹岡, 落生, 勝山, 富浦(清水), 館山湾(水深7.6~60.0m;田村1987;佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水), 太海, 鶴川, 天津(大島1993;清水), 小湊(猪野1942c;堀越1987;大島1993;清水), 安房(福井市博1962), 九十九里浜, 九十九里沖ミゾ場(清水), 銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994) 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋(水深10~100m, 砂底)	
1004 <i>Niotha splendidula</i> (Dunker, 1846)	キビムシロ
産地:館山湾(水深17.4~32.7m;田村1987;佐々木1989;堀越1990;村越1998), 小湊(大島1993) 分布:銚子沖・九州西岸以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋(水深5~30m, 細砂底)	
1005 <i>Niotha livescens</i> (Philippi, 1849)	ムシロガイ
産地:小瀬川河口干潟(秋山1975), 富津(千葉県企業庁1978), 竹岡, 落生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(水深7.2m;田村1987;佐々木1989;堀越1990;村越1998;清水), 布良, 白浜(清水), 小瀬(岩川1900;猪野1942c;大島1993;小瀬1994;清水), 安房(福井市博1962), 勝浦(千葉水試1977;大島1993;清水), 飯岡(渡辺), 銚子(鹿股ら1962), 東京湾から銚子まで(黒住2000) 分布:陸中(大槌湾)・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深50m, 細砂底)	
1006 <i>Talasco gaudiosa</i> (Hinds, 1844)	ヒメヨフバイ
産地:館山湾(村越1998) 分布:駿河湾・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 台湾, インド・太平洋(潮間帯下部~水深5m, 細砂底)	
1007 <i>Talasco velatus</i> (Gould, 1850)	シイノミヨフバイ
産地:沖ノ島(お茶大館山1973), 天津, 小湊(大島1993) 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 台湾, フィリピン(潮間帯~水深30m, 岩礁底)	
1008 <i>Talasco sufflatus</i> (Gould, 1860)	ヨフバイ
産地:竹岡, 落生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(水深4.2m;田村1987;佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水), 布良, 白浜(清水), 天津(大島1993;清水), 小瀬(猪野1942c;大島1993;清水), 銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994) 分布:三陸・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾, 南シナ, フィリピン(潮間帯~水深30m, 細砂底)	
1009 <i>Zeuxis cautus</i> (Gould, 1850)	ハナムシロ
産地:中ノ瀬(風呂田1986a), 鮎洲沖(風呂田1984), 竹岡, 落生(清水), 館山湾(水深84m;藤田1929b;田村1987;奥谷ら*), 天津(大島1993), 小瀬(猪野1942c;火島1993), 九十九里浜, 九十九里沖ミゾ場(清水), 銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994) 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, インド・太平洋(水深10~200m, 砂泥底)	
1010 <i>Zeuxis dorsatus</i> (Röding, 1798)	キヨフバイ
分布:銚子沖・若狭湾以南, 四国, 九州, 台湾, 西太平洋(水深50~200m, 砂底)	
1011 <i>Zeuxis exellens</i> (Kuroda & Habe in Habe, 1961)	オボロヨフバイ
産地:銚子(渡辺1988) 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 東シナ海, 南シナ海(水深50~200m, 砂底)	
1012 <i>Zeuxis tateyamensis</i> (Kuroda in Fujita, 1929)	タテヤマヨフバイ
タイプ产地:千葉県館山湾水深84m 産地:館山湾(藤田1929b) 分布:房総半島以南, 四国, 九州(水深50~200m, 砂底)	
1013 <i>Zeuxis subtranslucidus</i> (E. A. Smith, 1903)	ヒダトリムシロ

- 产地:館山湾(田村1987;奥谷ら*),小湊(大島1993)
 分布:房総半島以西,遠州灘,志摩沖(水深50~100m,砂底)
- 1014 *Zeuxis protrusidens* (Melvill, 1918) シコロムシロ
 分布:相模湾・日本海西部以南,熱帯インド・西太平洋,マダガスカル(潮下帶~水深280m)
- 1015 *Zeuxis noguchii* Habe, 1958 ノグチムシロ
 产地:小湊(大島1993)
 分布:相模湾以南,土佐湾(水深100~200m,砂泥底)
- 1016 *Zeuxis nakayamai* Habe, 1958 ナカヤマムシロ
 产地:館山湾(土屋・奥谷2000)
 分布:館山湾以南,土佐湾,九州西岸(水深50~100m,砂泥底)
- 1017 *Profundinassa babylonica* (Watson, 1886) ワタゾコムシロ
 产地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995),銚子(渡辺1988)
 分布:房総半島・九州西岸以南,四国,インド・西太平洋(水深500~700m,砂泥底)
- 1018 *Profundinassa dilutus* (E. A. Smith, 1903) プトワタゾコムシロ
 产地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995)
 分布:房総沖(水深507~578m),三宅島沖(水深1,080~1,205m),紀伊本道(水深975~1,112m),三宅島沖(水深1,080~1,205m)
- 1019 *Reticumassa pauperus* (Gould, 1850) ナミヒメムシロ
 产地:富津(千葉県企業庁1979),竹岡,萩生(清水),館山湾(田村1987;奥谷ら*;清水),沖ノ島(お茶大館山1973),布良,白浜(清水),勝浦(大島1993),銚子(稻葉1963;宇野ら1965;渡辺1988;鶴岡ら1994)
 分布:北海道南部・九州北西岸以南,本州,四国,奄美,沖縄,台湾,フィリピン(潮間帶,細砂底)
- 1020 *Reticumassa festiva* (Powys, 1833) アラムシロ
 产地:浦安(千葉水試1957),江戸川放水路(市川市博1993),新浜(筑田1975),磐洲沖(風呂田1985b),小櫃川河口干潟(秋山1975),富津(千葉内湾水試1959;千葉県企業庁1977~1979;清水),竹岡,萩生,勝山,富山,富浦(清水),飯山湾(お茶大館山1973;田村1987;堀越1990;奥谷ら*;清水),布良,白浜,千倉(清水),鴨川,天津(大島1993;清水),小湊(大島1993;小池1994;清水),九十九里浜(清水),銚子(稻葉1963;渡辺1988;鶴岡ら1994)
 分布:北海道南部・男鹿半島以南,本州,四国,奄美,沖縄,台湾,フィリピン,朝鮮,中国(潮間帶,砂礫底)
- 1021 *Reticumassa fuscolineata* (E. A. Smith, 1875) フカボリヒメムシロ
 产地:館山湾(田村1987;奥谷ら*),銚子(渡辺1988)
 分布:房総半島・男鹿半島以南,四国,九州(水深10~50m,砂底)
- 1022 *Reticumassa multigranosa* (Dunker, 1847) ヒメムシロ
 产地:富津(千葉県企業庁1977:1979)富浦(水深9.0m,砂底:水産庁1982),館山湾(田村1987;清水),小湊(猪野1942c),銚子(宇野ら1965)
 分布:北海道以南,本州,四国,奄美,沖縄,朝鮮,中国北部(潮間帶~水深20m,岩礁底)
- 1023 *Reticumassa fratercula* (Dunker, 1860) クロスジムシロ
 产地:竹岡,萩生(清水),勝山(田中ら1974;清水),富山,富浦(清水),館山湾(堀越1990;佐々木1990;村越1998;奥谷ら*;水深20m:清水),白浜,千倉,鴨川(清水),天津(大島1993;清水),小湊(猪野1942c;大島1993;清水),勝浦(大島1993;清水),太原(清水),名洗(千葉県1977a),外川(千葉県1977b),銚子(稻葉1963;渡辺1988;鶴岡ら1994)
 分布:北海道以南,本州,四国,九州,朝鮮,中国(潮間帶,砂泥底や岩礁底)
- 1024 *Reticumassa japonica* A. Adams, 1852 in 1852-53 キヌボラ
 タイプ产地:日本,東京湾
 产地:船橋(黒住2000),盤洲(飯島ら1999),富津(千葉県企業庁1978),富津岬(黒住2000),竹岡(水深6m:千葉水試1980b;清水),萩生(清水),勝山(田中ら1974),館山湾(水深4.2~26.2m:田村1987;佐々木1989;堀越1990;村越1998;黒住2000;奥谷ら*;清水),小湊(猪野1942c),勝浦(大島1993),銚子(渡辺ら1988)
 分布:三陸沿岸・能登半島以南,四国,九州,奄美,沖縄,台湾,朝鮮,中国北部(潮間帶,細砂底)
- Family Buccinidae エゾバイ科
 1025 *Beringius (Beringion) polynematicus* Pilsbry, 1907 ナガバイ
 产地:銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
 分布:銚子沖以北,東北,北海道,ベーリング海,アラスカ(水深300~400m,泥底)
- 1026 *Japelion hirasei* Pilsbry, 1901 ネジヌキバイ
 产地:銚子沖水深370m(奥谷ら1988),銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;庖間・堀越1963;櫻井1964;神奈川県博1972;1991;渡辺1988;鶴岡ら1994;兵庫県博1999;清水)
 分布:銚子沖以北,東北,北海道(太平洋岸),オホーツク海,ベーリング海(水深200~400m,泥底)
- 1027 *Japelion pericochlion* (Schrenck, 1862) ネジボラ
 产地:銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;神奈川県博1991;鶴岡ら1994;兵庫県博1999;清水)
 分布:銚子沖以北,東北,北海道(太平洋岸,石狩沖)(水深100~400m,泥底)
- 1028 *Japelion adelphicus* (Dall, 1907) ツムガタネジボラ
 产地:天津(大島1993;清水),小湊(堀越ら1987;大島1993;清水),銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988),銚子沖水深200m(奥谷ら1988)
 分布:房総半島以南,駿河湾,遠州灘,紀伊半島沖,土佐沖,九州西岸,東シナ海(水深50~200m,細砂底)
- 1029 *Volutopsis middendorffii* (Dall, 1891) カミオボラ
 分布:鹿島灘・富山湾以北,三陸沖,北海道,オホーツク海,ベーリング海(水深22~450m,泥底)
- 1030 *Volutopsis (Habevolutopsis) hirasei* (Pilsbry, 1907) リクゼンボラ
 产地:銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;庖間・堀越1963;櫻井1964;渡辺1988;神奈川県博1991;鶴岡ら1994)
 分布:銚子沖以北,北海道(襟裳岬沖);但馬沖以北(水深80~300m,泥底)
- 1031 *Ancistrolepis (Parancistrolepis) kinoshitai* Kuroda, 1931 キノシタバイ
 分布:銚子沖以西,相模湾,遠州灘,紀伊半島沖,土佐沖(200~400m,砂泥底)
- 1032 *Ancistrolepis (Parancistrolepis) fujitai* Kuroda, 1931 フジタバイ
 产地:銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;神奈川県博1991;鶴岡ら1994;兵庫県博1999)
 分布:遠州灘以北,相模湾,鹿島灘,東北,北海道南部(水深80~300m,砂泥底)
- 1033 *Clinopegma unicum unicum* (Pilsbry, 1950) モロハバハイ
 产地:銚子東沖(35°39'27"N, 141°15'15"E水深350m:清水),銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
 分布:銚子沖以北,三陸沖,北海道南岸(水深50~200m,砂泥底)
- 1034 *Clinopegma unicum damon* (Dall, 1907) ヤゲンバイ
 产地:銚子沖(神奈川県博1991)

	分布:北海道室蘭, 帯広沖, 桶走沖(水深100~315m, 砂泥底)	
1035	<i>Bathyancistrolepis trochoideus trochoideus</i> (Dall, 1907)	ワタゾコヂヂワバイ
	分布:熊野灘以北, 三陸沿岸(水深200~2,000m, 泥底)	
1036	<i>Bathyancistrolepis trochoideus ovoideus</i> Habe & Ito, 1965	チヂワバイ
	タイプ产地:千葉県銚子沖(水深200m)	
	産地:銚子沖(Habe & Ito 1965;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;神奈川県博1991;鶴岡ら1994)	
	分布:相模湾~三陸沖(水深100~400m, 泥底)	
1037	<i>Mohnia (Retimohnia) multicostata</i> Habe & Ito, 1965	シワミドリホソバイ
	タイプ产地:千葉県銚子沖(水深100m)	
	産地:銚子沖(Habe & Ito 1965;神奈川県博1991;鶴岡ら1994)	
	分布:鹿島灘以北, 東北, 北海道, 千島; 日本海(但馬・能登半島沖) (水深100~300m, 泥底)	
1038	<i>Mohnia daphnelloides</i> Okutani, 1968	シャジクホソバイ
	分布:鹿島灘(36° 19.7'N, 141° 09.0'E, 水深870m)	
1039	<i>Colus (Aulacofusus) hiranoi</i> Shikama, 1962	ヒラノイトマキツムバイ
	タイプ产地:千葉県銚子沖	
	产地:九十九里沖水深855m(清水), 銚子沖(Shikama 1962;鹿島・堀越1963;櫻井1964;渡辺1988;清水)	
	分布:銚子沖以北, 東北(福島県・宮城県)沖(水深200~1,650m, 砂泥底)	
1040	<i>Plicifusus (Retifusus) rhyssoides</i> Dall, 1918	リクゼンシワバイ
	产地:銚子(櫻井1964;渡辺1988), 銚子沖(神奈川県博1991)	
	分布:鹿島灘以北, 東北, 北海道, サハリン, オホーツク(水深100~300m, 泥底)	
1041	<i>Pararetifusus tenuis</i> (Okutani, 1966)	
	分布:相模湾(水深1,470~1,500m), 鹿島灘(水深870m)	
1042	<i>Neptunea polycostata</i> Scarlato, 1952	エゾボラ
	产地:銚子(渡辺1988;神奈川県博1991)	
	分布:房総半島・但馬沖以北, サハリン, 千島, 沿海州(水深50~200m, 岩礁底)	
1043	<i>Neptunea intersculpta</i> (Sowerby III, 1899)	エゾボラモドキ
	产地:安房(福井市博1962), 銚子(鹿島ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988)銚子東沖(35° 41'05N, 141° 15'46E水深250m;清水)	
	分布:日本海(見島沖)以北, 富山湾, 山形県沖(水深150~750m, 砂底); 鹿島灘以北, 三陸沖, 北海道, 千島, ベーリング海(水深50~1,200m, 砂泥, 砂底)	
1044	<i>Neptunea frator</i> (Pilsbry, 1901)	コエゾボラモドキ
	产地:銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)	
	分布:銚子沖以北, 北海道東北部(水深50~1,000m, 砂泥底)	
1045	<i>Neptunea kuroshio</i> Oyama in Kira, 1958	ヒメエゾボラモドキ
	产地:竹岡, 萩生, 金谷, 富山沖水深320m(清水), 館山湾水深180~290m(清水), 鳴川(大島1993), 天津(大島1993;清水), 小湊(大島1993;水深270~280m;清水), 銚子沖(神奈川県博1991)	
	分布:相模湾以西, 遠州灘, 四国(土佐沖), 東シナ海(水深200~600m, 砂泥底)	
1046	<i>Neptunea constricta</i> (Dall, 1907)	チヂミエゾボラ
	产地:銚子(鹿島ら1962;櫻井1964;鶴岡ら1994)	
	分布:鹿島灘・但馬沖以北, 東北, 北海道東南部沖(水深200~600m, 砂泥底)	
1047	<i>Neptunea eulimata</i> (Dall, 1907)	カラフトエゾボラ
	产地:銚子(鹿島ら1962;渡辺1988;神奈川県博1991)	
	分布:銚子沖・北海道(宗谷沖)以北, サハリン沖(水深200~500m, 砂泥底)	
1048	<i>Neptunea heros</i> (Gray, 1850)	アツエゾボラ
	分布:銚子沖以北, 北海道, カムチャッカ沖, ベーリング海(水深100~200m, 砂礫底)	
1049	<i>Neptunea acutispiratus</i> Okutani, 1968	オシロイエゾボラ
	分布:相模湾~伊豆諸島(水深1,100~1,380m)	
1050	<i>Neptunea (Barbitonia) arthritica</i> (Bernardi, 1857)	ヒメエゾボラ
	产地:小湊(堀越ら1987), 銚子東沖(35° 39'27N, 141° 15'15E水深350m;清水), 銚子(鹿島ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;神奈川県博1991;鶴岡ら1994)	
	分布:銚子沖以北, 三陸沿岸, 青森県, 北海道(南部, 北見沿岸), 千島, サハリン, オホーツク海, 沿海州(潮間帶下部~水深20m, 岩礁底)	
1051	<i>Neptunea (Golikovia) fukueae</i> Kira, 1959	ユウビエゾボラ
	产地:銚子沖(Oyama & Takemura, 1961)	
	分布:四国, 東シナ海(水深100~300m, 砂底)	
1052	<i>Neptunea (Golikovia) ennae</i> Sakurai & Tiba, 1969	マドカエゾボラ
	タイプ产地:千葉県銚子沖	
	产地:銚子沖(Sakurai & Tiba 1969;櫻井1964;渡辺1988;長谷川・斎藤1995)	
	分布:銚子沖~岩手県沖(水深100~200m, 砂泥底)	
1053	<i>Phos senticosus</i> (Linnaeus, 1758)	トクサバイ
	产地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(船形:稻葉1963a;田村1987;奥谷ら*), 銚子(渡辺1988)	
	分布:房総半島・九州北西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(水深10~50m, 砂底)	
1054	<i>Phos naucratoros</i> Watson, 1882	ヒメトクサバイ
	产地:小湊(大島1993), 名洗(千葉県1977a), 銚子(神奈川県博1972;渡辺1988)	
	分布:房総半島以南, 四国, 九州, フィリピン(水深50~200m, 細砂底)	
1055	<i>Phos varicosus</i> Gould, 1851	コトクサバイ
	产地:館山湾(奥谷ら*), 小湊(大島1993)	
	分布:房総半島・日本海見島以南, 四国, 奄美, 沖縄, フィリピン(水深50~200m, 砂底)	
1056	<i>Phos laeve</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961	ミガキトクサバイ
	分布:房総半島・伊豆諸島以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深50~300m, 細砂底)	
1057	<i>Hindsta (Benthindsia) magnifica</i> (Lischke, 1871)	ナサバイ

- 产地:竹岡,萩生,金谷,富山沖水深320m(清水),館山湾(水深84m;藤田1929b;福井市博1962;水深180~290m清水),太海,天津(大島1993;清水),小湊(猪野1942c;大島1993;清水),銚子(渡辺1988)
分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州(水深30~200m, 砂底)
- 1058 *Hindsia (Benthindsia) lischkei* (Makiyama, 1927) リシケナサバイ
产地:萩生, 富山(清水), 館山湾(福井市博1962;水深180~290m清水), 小湊(清水), 銚子(渡辺1988)
分布:房総半島以南, 四国, 九州(水深50~200m, 砂底)
- 1059 *Hindsia (Benthindsia) solida* Kuroda & Habe in Habe, 1961 コンゴウナサバイ
产地:銚子(渡辺1988)
分布:房総半島以南, 四国, 九州, 北東オーストラリア, ニューカレドニア(水深100~600m, 砂底)
- 1060 *Hindsia (Benthindsia) acutispirata obesiformis* Yokoyama, 1920 ムサシノヒメニシ
产地:銚子(Shikama 1962;渡辺1988)
分布:銚子沖~相模湾(水深50~100m, 砂底)
- 1061 *Hindsia (Microfusus) acutispirata* (Sowerby III, 1913) ヒメニシ
产地:銚子(神奈川県博1972;渡辺1988)
分布:銚子沖・津軽半島以南, 日本海, 四国, 九州, フィリピン(水深50~200m, 砂底)
- 1062 *Microfusus aspera* (Kuroda, 1961) アラヒメニシ
产地:館山湾(田村1987;奥谷ら*)
分布:相模湾以西, 遠州灘, 伊勢湾(水深50~100m, 砂底)
- 1063 *Siphonalia cassidariaeformis* (Reeve, 1843) ミクリガイ
产地:竹岡, 萩生, 保田, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(田村1987;佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水), 布良, 白浜(清水), 千倉(清水1977), 太海(千葉水試1981a;大島1993;清水), 鶴川(大島1993;清水), 天津(猪野1942c;大島1993;清水), 小湊(猪野1942c;堀越ら1987;大島1993;清水), 安房(福井市博1962), 勝浦(清水), 銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:陸奥湾・男鹿半島以南, 四国, 朝鮮半島, 中国沿岸(水深10~300m, 砂底)
- 1064 *Siphonalia cassidariaeformis ornata* A. Adams, 1863 ヤナギノイト
产地:安房(福井市博1962), 銚子(櫻井1964;渡辺1988)
产地:安房(福井市博1962), 銚子(櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
- 1065 *Siphonalia sigma* (Reeve, 1846) シマミクリ
产地:竹岡, 萩生(清水), 太海(大島1993), 天津(清水), 安房(福井市博1962), 銚子(鹿股ら1962;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:房総半島以南, 四国(南岸), 九州南部(水深10~20m, 砂底)
- 1066 *Siphonalia fusoides* (Reeve, 1846) トウイト
产地:下洲, 竹岡, 萩生(清水), 館山湾(田村1987;堀越1990;奥谷ら*;清水), 天津(猪野1942c), 小湊(猪野1942c;堀越ら1987;清水), 安房(福井市博1962), 銚子(櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:青森県・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深10~100m, 砂底)
- 1067 *Siphonalia concinna* A. Adams, 1863 ミカドミクリ
产地:館山湾水深84m(藤田1929b)太海(大島1993), 天津(猪野1942c), 小湊(猪野1942c), 九十九里浜(清水)
分布:相模湾以西, 遠州灘, 四国(土佐沖), 沖縄(水深100m, 砂底)
- 1068 *Siphonalia trochula* (Reeve, 1843) ミオツクシ
产地:竹岡(清水), 鶴川(大島1993)
分布:房総半島以南, 四国, 九州(水深10~50m, 砂底)
- 1069 *Siphonalia spadicea* (Reeve, 1846) マユツクリ
产地:富山沖水深130m(清水), 館山湾(水深84m;藤田1929b;田村1987;堀越1990;奥谷ら*), 鶴川, 天津, 小湊, 勝浦(大島1993), 銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:北海道南西部・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深20~250m, 砂泥底)
- 1070 *Siphonalia spadicea fuscolineata* Pease, 1860 ナガミクリ
产地:天津, 小湊(猪野1942c)
分布:北海道南西部・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深20~250m, 砂泥底)
- 1071 *Siphonalia modificata* (Reeve, 1846) セコボラ
产地:館山湾(村越1998), 太海(大島1993)
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(水深20~50m, 砂底)
- 1072 *Siphonalia modificata stearnsii* Pilsbry, 1894 イトマキミクリ
产地:房総半島
分布:房総半島
- 1073 *Siphonalia hinnulus* (Adams & Reeve, 1849)
分布:太平洋(10~35°N?)
- 1074 *Kelleita lischkei* Kuroda, 1938 ミガキボラ
产地:竹岡, 萩生, 金谷, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(堀越1990;奥谷ら*;清水), 白浜, 千倉(清水), 太海(千葉水試1981a;大島1993;清水), 鶴川, 天津(大島1993;清水), 小湊(猪野1942c;大島1993;小池1994;清水), 鶴原(清水), 勝浦(岩川1900;大島1993;清水), 御宿, 大原(大島1993), 銚子(稻葉1963;宇野ら1965;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:三陸南部沿岸・男鹿半島以南, 四国, 九州(中西部)(潮間帯~20m, 岩礁)
- 1075 *Babylonia japonica* (Reeve, 1842) バイ
产地:五井沖(風呂田1985b), 富津(千葉県企業序1978), 島, 竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(水深17.4m;田村1987;佐々木1989;堀越1990;奥谷ら*;清水), 沖ノ島(お茶大館山1973), 白浜, 千倉(清水), 太海, 鶴川, 天津(大島1993;清水), 小湊(岩川1900;猪野1942c;1950;堀越ら1987;大島1993;奥谷1996;清水), 勝浦(清水), 御宿(大島1993), 九十九里浜(水深14~20m;海老原ら1970;清水), 銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;神奈川県博1972;鶴岡ら1994)
分布:北海道南部・男鹿半島以南, 四国, 九州, 朝鮮半島, 中国(潮間帯~水深30m, 砂底)
- 1076 *Enzinopsis menkeana* (Dunker, 1860) ナガゴマフホラダマシ
产地:館山湾(田村1987;佐々木1989;奥谷ら*;清水), 布良, 白浜(清水), 千倉(千葉水試1980a;清水), 天津, 小湊(大島1993), 安房(福井市博1962)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深20m, 岩礁)
- 1077 *Enzinopsis lanceolata* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 チャガスリノシガイ
产地:館山湾(田村1987;奥谷ら*)
分布:相模湾・能登半島以南, 四国, 九州北西岸(潮間帯~水深20m, 岩礁底)
- 1078 *Cantharus cecillei* (Philippi, 1884) オガイ
产地:竹岡, 館山湾水深20m(清水), 沖ノ島(お茶大館山1973), 白浜, 大原(清水)

- 分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州(潮間帯, 岩礁・岩礁底)
- 1079 *Cantharus (Pollia) mollis* (Gould, 1860) シワホラダマシ
産地:竹岡, 萩生, 鳥山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水), 沖ノ島(お茶大館山1973), 布良(清水), 白浜, 千倉(千葉水試1980a;清水), 太海(千葉水試1981a;大島1993;清水), 鶴川, 天津(大島1993;清水), 小湊(猪野1942c;福葉1963a;神奈川県博1972;大島1993;小池1994;清水), 浜行川, 勝浦(千葉水試1977;清水), 名洗(千葉県1977a), 銚子(福葉1963;宇野ら1965;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深10m, 岩礁・岩礁底)
- 1080 *Cantharus (Pollia) subrubiginosa* (E. A. Smith, 1879) コホラダマシ
産地:館山湾(佐々木1989;奥谷ら*), 銚子(福葉1963;渡辺1988)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 西太平洋(潮間帯~潮下带, 岩礁・岩礁底)
- 1081 *Ecnomis trionoides* (Reeve, 1846) マルベツコウバイ
産地:萩生(清水), 館山湾(堀越1990;佐々木1990;奥谷ら*;清水), 布良, 白浜(清水), 天津(大島1993)
分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, フィリピン(潮間帯下部~水深20m, 岩礁底)
- 1082 *Japeuthria ferrea* (Reeve, 1847) イソニナ
産地:竹岡, 萩生, 金谷, 鳥山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1989;奥谷ら*;清水), 沖ノ島(お茶大館山1973), 布良(清水), 白浜(神奈川県博1991;清水), 千倉, 太海, 鶴川(清水), 天津(大島1993;清水), 小湊(猪野1942c;福井市博1962;福葉1963a;神奈川県博1972;小池1994;Iijima, 1998;清水), 勝浦(千葉水試1977;清水), 銚子(福葉1963;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋(潮間帯, 岩礁・岩礁底)
- 1083 *Buccinum isaotakii* Kira, 1959 シライトマキ
産地:九十九里沖ミゾ場(清水), 大矢崎東沖水深250~400m(清水), 銚子(鹿股ら1962;福葉1963;鹿間・堀越1963;櫻井1964;渡辺1988;神奈川県博1991;鶴岡ら1991;兵庫県博1999;清水)
分布:鹿島灘以北, 東北, 北海道沖(水深300~600m, 砂泥底)
- 1084 *Buccinum nippонense* Dall, 1907 ヒメシライトマキ
産地:銚子(渡辺1988)
分布:房総半島沖以北, 三陸沿岸, 北海道南岸(水深100~300m, 砂泥底)
- 1085 *Buccinum leucostoma* Lischke, 1872 スルガバイ
タイプ産地:東京湾
産地:東京湾(Lischke 1872), 竹岡, 萩生, 金谷, 富山沖水深320m, 館山湾(清水), 太海(大島1993;清水), 天津(猪野1942c;大島1993;清水), 小湊(猪野1942c;福井市博1962;大島1993;水深270~280m;清水)
分布:房総半島沖以西, 駿河湾, 三河沖, 土佐沖(水深50~600m, 砂泥底)
- 1086 *Buccinum sagamianum* Okutani, 1977 サガミバイ
産地:竹岡, 金谷(清水)
分布:相模湾, 駿河湾(水深400~700m, 砂泥底)
- 1087 *Buccinum cnismatum chibamum* Kuroda, 1964 ユメバイ
タイプ産地:銚子沖(水深200m)
産地:銚子沖(Shikama 1962;Kuroda, 1964;渡辺1988)
分布:銚子沖(水深200m, 砂底)
- 1088 *Buccinum felis* (Okutani, 1964) チゴバイ
産地:竹岡, 萩生, 金谷, 富山沖水深320m, 天津, 小湊, 銚子沖水深300m砂泥底(清水)
分布:鹿島灘, 相模湾, 伊豆大島(水深200~600m, 砂底)
- 1089 *Buccinum felis shikamai* Habe & Ito, 1965 シカマバイ
産地:銚子沖(Shikama 1962;福葉1963)
分布:銚子沖, 鹿島灘(水深200~300m, 砂底)
- 1090 *Buccinum yoroiamum* Ozaki, 1958 ヨロイエゾバイ
産地:銚子沖(奥谷2000)
- 1091 *Buccinum soyomaruae* Okutani, 1977 ソウヨウバイ
分布:相模湾(水深1,250~1,500m, 泥底)
- 1092 *Buccinum kashimanum* Okutani, 1964 カシマナダバイ
分布:鹿島灘以北, 三陸沖, 北海道沖(水深500~2,000m, 砂泥底)
- 1093 *Buccinum schantaricum chosiensis* Shikama, 1962 チョウシバイ
タイプ産地:銚子沖
産地:銚子沖(Shikama 1962;渡辺1988)
分布:銚子沖, 本州東岸沖(水深400m)
- 1094 *Buccinum bombycinum* Dall, 1907 ウスカラバイ
分布:駿河湾(水深600~700m)以北, 北海道, サハリン, オホーツク海(水深50~200m, 砂泥底)
- 1095 *Buccinum hosoyai* Habe & Ito, 1965 ヒナエゾバイ
分布:相模湾, 伊豆大島沖, 東北(水深200~300m, 砂泥底)
- 1096 *Buccinum* sp. A
産地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995)
- 1097 *Buccinum* sp. B
産地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995)
- 1098 *Buccinum* sp. C
産地:和田沖水深150m(奥谷1973)
- 1099 *Volutharpa ampullacea perryi* (Jay, 1857) モスソガイ
タイプ産地:東京湾
産地:東京湾(Jay 1855), 富津(千葉内湾水試1960), 竹岡, 館山湾(清水), 鶴川, 小湊(大島1993), 銚子(福葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:伊勢湾・瀬戸内海・朝鮮南部以北の日本海, 北海道, ベーリング海(水深10~70m, 砂泥底)
- Family Colubrallidae セコバイ科
- 1100 *Kanamarua adonis* (Dall, 1919) ウツツムバイ
分布:遠州灘以北, 駿河湾, 相模湾(水深200~1,000m, 泥底)

- 1101 *Acampiochetus (Colubraria) metulina* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 キヌメセコボラ
分布:相模湾以南, 紀伊半島沖, 土佐沖, フィリピン(水深90~200m, 細砂底)
- 1102 *Colubraria castanea* Kuroda & Habe, 1952 セコバイ
産地:浜行川(大島1993)
分布:房総半島以南, 四国, 九州, フィリピン(水深10~30m, 岩礁)
- Family Melongenidae テングニシ科
1103 *Hemifusus tuba* (Gmelin, 1791) テングニシ
产地:富津, 濱根崎, 渥(千葉県企業庁1977-1979), 東京湾口水深20m(奥谷ら1988), 渥, 竹岡, 萩生, 金谷, 富浦, 館山湾(清水), 沖ノ島(お茶大館山1973), 安房北条(岩川1900)
分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, インド・西太平洋(水深10~100m, 砂底)
Family Fasciolariidae イトマキボラ科
1104 *Pleuroploca trapezium paeteli* (Strebel, 1912) ヒメイトマキボラ
产地:竹岡, 萩生, 金谷(清水), 勝山(田中ら1974), 富浦(清水), 安房北条(岩川1900), 館山湾(お茶大館山1973; 佐々木1989; 奥谷ら*; 清水), 太海, 鶴川, 天津(大島1993; 清水), 小湊(猪野1942c; 大島1993; 小池1994; 清水), 浜行川(大島1993; 清水)
分布:房総半島・九州北西岸以南, 四国, 西太平洋(潮間帶~水深20m, 岩礁・岩礫底)
- 1105 *Pleuroploca* sp. ベニマキ
产地:天津, 小湊(清水)
1106 *Bennimakia fastigium* (Reeve, 1847) チョウセンニシ
分布:房総半島・九州北西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮下部~水深20m, 岩礁底・死サンゴ礁上)
- 1107 *Fusolatirus coreanicus* (E. A. Smith, 1879) ヘソアキツノマタ
产地:館山湾(田村1987; 奥谷ら*), 名洗(千葉県1977a)
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 朝鮮南部(潮間帶~水深200m, 砂底)
- 1108 *Latirus recurvirostrum* (Schbert & Wagner, 1892) ナガサキニシキニナ
分布:三浦半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, フィリピン(潮下部~水深30m, 岩礁)
1109 *Latirulus nagasakiensis* (E. A. Smith, 1880) ナガニシ
产地:館山湾(堀越1990; 清水), 太海, 鶴川(大島1993), 天津, 小湊(大島1993; 清水), 安房福井市博1962), 鶴原, 勝浦, 御宿(大島1993)
分布:房総半島以南, 本州, 四国, 九州(潮間帶~水深50m, 岩礁)
- 1110 *Fusinus perplexus* (A. Adams, 1863c) ナガニシ
タイプ产地:千葉県館山
产地:富津(千葉内湾水試1959), 富津岬南(千葉内湾水試1961), 竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 安房北条(岩川1900), 館山湾(Pilsbry 1884; お茶大館山1973; 水深4.2~60.0m; 田村1987; 佐々木1990; 村越1998; 奥谷ら*; 水深210~240m; 清水), 東京湾(神奈川県博1972), 白浜, 千倉(清水), 太海, 鶴川, 天津(大島1993; 清水), 小湊(猪野1942c; 堀越ら197; 大島1993; 清水), 銚子(鎌股ら1962; 番葉1963; 櫻井1964; 宇野ら1965; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
分布:北海道南部・男鹿半島以南, 本州, 四国, 九州, 朝鮮半島(水深10~100m, 砂底)
- 1111 *Fusinus ferrugineus* Kuroda & Habe in Habe, 1961 コナガニシ
产地:館山湾水深210~240m(清水), 銚子(渡辺1988)
分布:陸奥湾・能登半島以南, 本州, 四国, 九州(潮下帶~水深50m, 砂泥底)
- 1112 *Fusinus nodosoplicatus* (Dunker, 1858) コブナガニシ
分布:相模湾・能登半島以南, 四国, 九州北西岸(水深50~150m, 砂底)
- 1113 *Fusinus longicaudus* (Lamarck, 1816) ハシナガニシ
产地:鶴川, 小湊(大島1993)
分布:駿河湾・山口県北部以南, 四国, 九州(水深50~100m, 砂底)
- 1114 *Fusinus grabaui* Kuroda & Habe, 1952 コブシナガニシ
分布:相模湾・能登半島~九州西岸(水深50~100m, 砂泥底)
- 1115 *Fusinus gemmuliferus* Kira, 1959 カゴメナガニシ
分布:相模湾・秋田県沖以南, 四国, 九州(水深50~100m, 砂泥底)
- 1116 *Fusinus forceps* (Perry, 1811) イトマキナガニシ
产地:館山湾水深70m(清水), 鶴川(大島1993), 小湊(清水)
分布:九州西岸以南, 奄美, 沖縄, 台湾, 東シナ海, 中国, フィリピン(水深50~100m, 細砂底)
- 1117 *Fusinus forceps salisburyi* Fulton, 1930 アライトマキナガニシ
产地:竹岡, 金谷(清水), 銚子(渡辺1988)
分布:房総半島以南, 四国, 九州西岸, 東シナ海, フィリピン, オーストラリア(クイーンズランド)(水深20~100m, 細砂底)
- 1118 *Fusinus spectrum* (Reeve, 1847) カドバリナガニシ
产地:萩生, 館山湾(清水), 鶴川, 小湊(大島1993)
分布:駿河湾・山口県北部以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深50~100m, 砂底)
- 1119 *Fusinus nicobaricus* (Röding, 1798) チトセボラ
产地:竹岡, 萩生, 千倉, 天津(清水), 小湊(猪野1942c; 清水)
分布:伊豆半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋, オーストラリア(クイーンズランド)(潮下帶~水深30m, 岩礁底)
- 1120 *Fusinus tuberosus* (Reeve, 1847) ミクリナガニシ
产地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(水深85.5m; 田村1987; 奥谷ら*; 清水), 太海(千葉水試1980a; 大島1993; 清水), 鶴川, 天津(大島1993; 清水), 小湊(猪野1942c; 大島1993; 清水), 鶴原(清水), 勝浦, 御宿(大島1993; 清水)
分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 朝鮮半島, 中国(潮間帶~水深40m, 岩礁底)
- 1121 *Fusinus tuberosus* form *nigrirostratus* (E. A. Smith, 1879) シノマタナガニシ
产地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(奥谷ら*; 清水), 天津(清水), 小湊(大島1993; 清水), 勝浦(岩川1900; 大島1993; 清水), 御宿(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布:房総半島・山形県(湯ノ田)以南, 四国, 九州, 濱戸内海(潮間帶~水深20m, 岩礁底)
- 1122 *Fusinus sagamiensis* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 サガミナガニシ
产地:竹岡, 金谷(清水), 銚子(渡辺1988)
分布:相模湾以西, 駿河湾, 遠州灘, 紀伊半島沖, 土佐沖(水深50~100m, 岩礁底)
- 1123 *Simplicifusus simplex* (E. A. Smith, 1879) シロヒメナガニシ
产地:小湊(大島1993; 清水)

分布:駿河湾以南, 四国, 九州, 東シナ海, 朝鮮南部(水深100~300m, 砂底)	
1124 <i>Simplicifusus hyphalus</i> (M. Smith, 1940)	ワタゾコナガニシ
産地:小湊(大島1993)	
分布:遠州灘以南, 土佐沖, 九州西岸, 東シナ海(水深100~200m, 砂泥底)	
1125 <i>Simplicifusus graciliformis</i> (Sowerby II, 1888)	ヒメナガニシ
産地:館山湾水深84m(藤田1929b), 天津, 小湊(猪野1942c;大島1993), 錦子(渡辺1984;渡辺1988)	
分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 東シナ海, 台湾, 南シナ海(水深50~300m, 砂底)	
1126 <i>Granulifusus niponicus niponicus</i> (E. A. Smith, 1879)	アラレナガニシ
産地:天津(清水)	
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 台湾, フィリピン(水深50~300m, 砂底)	
1127 <i>Granulifusus niponicus suboblitus</i> (Pilsbry, 1904)	サガミアラレナガニシ
産地:竹岡, 萩生, 金谷(清水), 館山湾(水深63.7m;田村1987;奥谷ら1993), 小湊(大島1993), 錦子(渡辺1988)	
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(水深50~200m, 砂底)	
1128 <i>Granulifusus kiramus</i> Shuto, 1958	キラアラレナガニシ
分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 台湾, フィリピン(水深150~300m, 砂底)	
1129 <i>Granulifusus musasiensis</i> (Makiyama, 1922)	ムサシノアラレナガニシ
タイプ産地:千葉県市原市市東(化石)	
産地:銚子沖(肥後・後藤1993)	
分布:銚子沖(水深50~250m, 砂底)	
1130 <i>Granulifusus makiyamai</i> (Otuka, 1937)	マキヤマアラレナガニシ
分布:相模湾(水深50~250m, 砂底)	
1131 <i>Trophonofusus muricatooides</i> (Yokoyama, 1920)	ツツカナガニシ
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖(水深50~150m, 砂底)	
Family Volutidae	ガクボラ科 スジボラ
1132 <i>Lyria cassidula</i> (Reeve, 1849)	
産地:竹岡, 萩生(清水), 勝山(岩川1900), 館山湾(水深47.5m;田村1987;堀越1990;佐々木1990;奥谷ら*;清水), 布良(清水), 白浜(福井市博1962;清水)	
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(水深50~200m, 細砂底)	
1133 <i>Lyria pallidula</i> Habe, 1961	ウスイロスジボラ
分布:房総半島(肥後・後藤1993)以南, 四国(水深50~200m, 砂底) 奥谷2000は紀伊半島以南	
1134 <i>Lyria nucleus</i> (Lamarck, 1811)	ウネスジボラ
分布:館山湾(肥後・後藤1993)以南, 四国, 沖縄, 小笠原諸島, オーストラリア(水深10~30m, 岩礁)	
1135 <i>Fulgoraria (Psephaea) concinna</i> form <i>rosea</i> Shikama, 1967	アカネヒタチオビ
分布:相模湾(水深100~150m, 細砂泥底)	
1136 <i>Fulgoraria (Psephaea) expotanda</i> Shikama, 1967	ダルマヒタチオビ
産地:銚子沖(Shikama, 1967)	
分布:銚子沖, 九州五島列島沖(水深100~200m, 砂泥底)	
1137 <i>Fulgoraria (Nipponomelon) prevostiana</i> (Crosse, 1878)	ホンヒタチオビ
産地:竹岡, 萩生, 金谷, 保田, 富山沖水深320m(清水), 館山湾(水深84m;藤田1929b;水深180~290m;清水), 太海, 鶴川(大島1993), 天津, 小湊(猪野1942c;福井市博1962;大島1993;清水), 鶴原(大島1993), 外房沖水深250m(奥谷ら1988), 九十九里沖水深950~1,100m(清水), 錦子(稻葉1963;神奈川県博1972;鹿間1976;渡辺1988;鶴岡ら1994)	
分布:駿河湾・但馬沖以北, 房総半島(水深50~450m, 泥底)	
1138 <i>Fulgoraria (Nipponomelon) megaspira</i> (Sowerby II, 1844)	マボロシヒタチオビ
分布:相模湾(漸深海帶)	
1139 <i>Fulgoraria (Nipponomelon) magna</i> Kuroda & Habe in Habe, 1950	オオヒタチオビ
産地:小湊(堀越ら1987;大島1993;清水), 錦子(稻葉1963;櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988;清水), 錦子沖(北水深200~400fms.;Shikama, 1967;水深250m;奥谷ら1988)	
分布:相模湾・男鹿半島以北, 三陸沖, 北海道(水深50~600m, 泥底)	
1140 <i>Fulgoraria (Nipponomelon) elongata</i> Shikama, 1962	ナガヒタチオビ
タイプ産地:銚子東沖(水深250~400fms.)	
産地:天津(清水), 錦子沖(Shikama, 1962;櫻井1964;東沖水深250~400fms.;Shikama, 1967;渡辺1988;清水)	
分布:銚子東沖(水深500~800m, 泥底)	
1141 <i>Fulgoraria (Kurodina) smithi</i> (Sowerby III, 1901)	ウスヒタチオビ
産地:九十九里沖ノゾ塙240m;855~1,100m(清水), 錦子(Sikama 1962;奥谷ら1962;稻葉1963;櫻井1964;南東52miles水深200~400fms.;Shikama, 1967;神奈川県博1972;渡辺1988;鶴岡ら1994;兵庫県博1999;清水)	
分布:銚子沖以南, 遠州灘, 紀伊半島沖(水深200~1,000m, 泥底)	
Family Olividae	マクラガイ科 タケノコボタル
1142 <i>Amalda hilgendorfi</i> (v. Martens, 1897)	
産地:小湊(大島1993), 錦子(櫻井1964;渡辺1988)	
分布:鹿島灘以南, 遠州灘, 九州西南沖, フィリピン(水深150~300m, 砂底)	
1143 <i>Amalda rubiginosa</i> (Swainson, 187)	リュウグウボタル
産地:館山湾(藤田1929b), 錦子(渡辺1988)	
分布:房総半島・山口県見島以南, 遠州灘, 紀伊半島沖, 濱戸内海, 四国沖(水深50~400m, 砂底)	
1144 <i>Amalda urasima</i> (Kira, 1959)	ウラシマボタル
産地:竹岡, 富山沖水深130m(清水), 小湊(大島1993), 錦子(渡辺1988)	
分布:房総半島以南, 遠州灘, 紀伊半島沖, 土佐沖, 九州(水深50~200m, 砂泥底)	
1145 <i>Amalda hinomotoensis</i> (Yokoyama, 1922)	ヒノモトボタル
タイプ産地:千葉県市原市市東(化石)	
1146 <i>Olivella japonica</i> Pilsbry, 1895	ホタルガイ

- タイプ産地:安房(千葉県)
 産地:竹岡,萩生,富浦(清水),館山湾(水深60.0~90.0m;田村1987;佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水),布良,白浜(清水),天津(大島1993;清水),小湊(大島1993;小池1994;清水),安房(Pilsbry 1895;福井市博1962),勝浦,御宿(大島1993;清水),大原(清水),九十九里浜,名洗(千葉県1977a),銚子(鹿島ら1962;福井1963;宇野ら1965;鶴岡ら1994)
 分布:三陸(氣仙沼)・山口県北部以南, 紀伊, 土佐, 九州(潮間帯下部~水深30m, 砂底)
- 1147 *Olivella fulgurata* (A. Adams & Reeve, 1850) ムシボタル
 産地:竹岡,萩生,勝山,富山,富浦(清水),館山湾(水深4.2m;田村1987;佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水),平砂浦(岩川1900),布良,白浜,千倉,鶴川(清水),天津(大島1993;清水),小湊(猪野1942c;大島1993;小池1994;清水),安房(岩川1900;福井市博1962),勝浦,御宿(大島1993;清水),大原(清水),九十九里浜(信太ら1994;清水),名洗(千葉県1977a),銚子(福井1963;櫻井1964;宇野ら1965)
 分布:三陸(山田湾)・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾, 南シナ海(潮間帯~水深20m, 砂底)
- 1148 *Olivella fulgurata* form *fabula* (Marrat, 1871) オオムシボタル
 産地:銚子(櫻井1964)
- 1149 *Olivella spretoides* Yokoyama, 1922 ワタゾコボタル
 タイプ産地:千葉県市原市市東(化石)
 産地:館山湾(村越1998)
 分布:三陸(大槌湾)・能登半島以南, 遠州灘, 紀伊半島沖, 土佐沖, 九州西岸, 東シナ海(水深30~450m, 砂底)
- 1150 *Olivella aureobalteata* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 コガネマキワタゾコボタル
 分布:房総半島以南, 遠州灘, 紀伊半島沖, 土佐沖, 九州西岸, 東シナ海水深(30~200m, 砂底)
- 1151 *Olivella spreta* Gould, 1861 ササノミガイ
 産地:館山湾(村越1998), 小湊(猪野1942c)
 分布:房総半島以南, 四国, 九州(潮間帯下部~水深100m, 砂底)
- 1152 *Olivella signata* Lischke, 1869 ハナアヤメ
 タイプ産地:東京湾
 産地:東京湾(Lischke 1869), 館山湾(堀越1990;村越1998), 銚子(渡辺1988)
 分布:三陸(大槌湾)以南, 四国, 九州, 中国(水深10~30m, 細砂底)
- 1153 *Olivella fortunei* (Marrat, 1871) アヤメボタル
 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美(潮間帯~水深20m, 砂底)
- 1154 *Oliva mustelina* Lamarck, 1811 マクラガイ
 産地:竹岡(清水), 館山湾(佐々木1989;奥谷ら*), 安房(岩川1900;福井市博1962)
 分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(水深5~30m, 細砂底)
- Family Harpidae ショクコウラ科
 1155 *Morum (Onisidria) teramachii* Kuroda & Habe in Habe, 1961 ショクコウオニムシロ
 産地:銚子(福井1963;櫻井1964)
 分布:銚子沖以南, 土佐沖, 九州西岸, 東シナ海, 台湾(水深100~200m, 砂底)
- 1156 *Morum (Onisidria) macandrewi* Sowerby III, 1889 コエボシ
 産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(堀越1990;村越1998), 天津(清水), 小湊(大島1993;清水), 安房(福井市博1962)
 分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 東シナ海, 南シナ海(水深30~200m, 貝砂底)
- Family Mitridae フデガイ科
 1157 *Mitra inquinata* (Reeve, 1844) フデガイ
 産地:竹岡, 萩生(清水), 小湊(大島1993)
 分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾, 東シナ海, 中国南部(水深20~110m, 砂底)
- 1158 *Mitra chinensis* Griffith & Pidgeon, 1834 チュウカフデ
 分布:相模湾以南, 四国, 九州, 東シナ海, 中国, ベンガル湾, 南アフリカ(水深50~100m, 岩礁)
- 1159 *Mitra nivea* (Broderip, 1836) ハブタエフデ
 分布:相模湾以南, 四国, 九州, ソロモン群島, ポリネシア(水深20~100m, 砂底)
- 1160 *Mita subflava* (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971) キバミフデ
 分布:相模湾(水深100m, 砂底)
- 1161 *Vicimitra kurakiensis* Hati & Nisiyama, 1952 クラキフデ
 分布:太平洋(35°N)
- 1162 *Nebularia suturata* (Reeve, 1844) アラタエフデ
 産地:浜行川(大島1993)
 分布:相模湾以南, 中国, フィリピン, インドネシア(水深40~311m, サンゴ礁・砂泥底)
- 1163 *Nebularia hayashii* (Kira, 1959) ダイモンジフデ
 産地:小湊(大島1993), 銚子(渡辺1988)
 分布:銚子沖以西, 紀伊半島沖, 土佐沖, 九州西岸沖, 台湾(水深100~150m, 砂礫底)
- 1164 *Nebularia rosacea* (Reeve, 1845) ベニフデ
 産地:竹岡, 金谷水深20m(清水), 館山湾(田村1987;佐々木1989;村越1998;奥谷ら*, 白浜(清水), 小湊(大島1993))
 分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, フィリピン, 南西太平洋, オーストラリア北西部, タイ(水深6~160m, 砂泥底)
- 1165 *Strigatella auriculoides* (Reeve, 1845) ヒメヤタデ
 産地:館山湾(村越1998)
 分布:伊豆諸島・紀伊半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋, モーリシャス, ポリネシア(潮間帯, 岩礁・サンゴ礁)
- 1166 *Strigatella scutula* (Gmelin, 1791) ヤタケガイ
 産地:竹岡, 萩生(清水), 緑南町鐘ヶ淵(坂井1989;池田1994 in 黒住2000), 館山湾(佐々木1989;奥谷ら*;清水), 小湊(猪野1942c;大島1993;小池1994), 銚子(渡辺1988)
 分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~20m, 岩礁・サンゴ礁間の砂地)
- 1167 *Strigatella retusa* (Lamarck, 1811) オオシマヤタデ
 産地:館山湾(清水), 安房(福井市博1962)
 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋, モーリシャス(潮間帯, 岩礁・サンゴ礁上)
- 1168 *Strigatella accuminata* (Swainson, 1824) ロウイロヤタデ

	分布:房総半島以南, 热帶印度・西太平洋(潮間帯, 岩礁・サンゴ礁上)	
1169	<i>Imbricaria vanikorensis</i> (Quoy & Gaimard, 1832)	チョウチンフデ
	産地:白浜(清水)	
	分布:奄美大島以南, 沖縄, インド・太平洋(外洋の潮間帯, 砂底)	
1170	<i>Ziba pretiosa</i> (Reeve, 1844 in 1843-65)	ヒメアラフデ
	産地:館山湾(神奈川県博1972;堀越1990)	
	分布:館山湾以南, 奄美, 沖縄(潮間帯～水深20m, 砂底)	
1171	<i>Cancilla isabella</i> (Swainson, 1831)	カラフデ
	産地:富山沖水深130m(清水), 館山湾(堀越1990), 白浜(根本:稻葉1963a), 鶴川(大島1993), 天津, 小湊(大島1993;清水), 安房(福井市博1962), 九十九里浜(清水)	
	分布:房総半島・山形県沖・九州西岸以南, 四国, 東シナ海, 中国(水深20～100m, 砂底)	
1172	<i>Cancilla abyssicola</i> (Schepman, 1911)	サメハグフデ
	産地:鶴川, 天津, 小湊(大島1993)	
	分布:相模湾以南, 四国, 九州, フィリピン, インドネシア(水深50～420m, 砂底)	
1173	<i>Scabridcola sigillata</i> (Azuma, 1965)	ヒメアヤフデ
	産地:銚子(渡辺1988)	
	分布:銚子沖以西, 紀伊半島沖, 土佐沖(水深50～100m, 砂底)	
1174	<i>Neocancilla clathrus</i> (Gmelin, 1791)	イワカワフデ
	産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(堀越1990;佐々木1990;村越1998;奥谷ら*, 清水), 小湊(清水)	
	分布:房総半島・山口県北部以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯～水深20m, 砂底)	
1175	<i>Pterygia japonica</i> Okutani & Matsukuma, 1982	ナガイモフデ
	産地:洲崎(稻葉1963a), 白浜(根本:稻葉1963a), 安房(福井市博1962)	
	分布:房総半島, 伊豆半島, 九州西岸(水深30～40m, 砂底)	
	Family Costellariidae	ツクシガイ科
1176	<i>Costellaria japonicus</i> (A. Adams, 1863)	ナガツクシ
	産地:館山湾(堀越1990)	
	分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, フィリピン(水深20～50m, 細砂底)	
1177	<i>Costellaria obeliscus</i> (Reeve, 1844)	アミツクシ
	産地:館山湾(堀越1990), 銚子(稻葉1963)	
	分布:房総半島・伊豆諸島以南, 四国, 奄美, 沖縄, フィリピン, インド・太平洋(水深10～100m, 砂底)	
1178	<i>Costellaria suluensis</i> (Adams & Reeve, 1850 in 1848-50)	オオツクシ
	産地:館山湾(堀越1990)	
	分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄(水深5～50m, 砂底)	
1179	<i>Costellaria fuscoapicatus</i> (E. A. Smith, 1879)	ツクシガイ
	産地:館山湾(清水), 小湊(大島1993)	
	分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋, フィジー諸島(水深10～30m, 砂底)	
1180	<i>Costellaria gotoensis</i> (E. A. Smith, 1879)	ゴトウツクシ
	産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*, 小湊(大島1993))	
	分布:相模湾以西, 四国, 九州(水深30～100m, 砂底)	
1181	<i>Costellaria angustissimus</i> (E. A. Smith, 1903)	オダヤカツクシ
	産地:館山湾(田村1987;堀越1990;奥谷ら*, 小湊(大島1993))	
	分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, インド・太平洋, 紅海, フィジー諸島(潮間帯下部～水深70m, 砂底)	
1182	<i>Costellaria unifasciata</i> (Wood, 1828)	ハナカゴオトメ
	産地:館山湾(佐々木1989;奥谷ら*, 白浜(清水), 小湊, 勝浦(大島1993))	
	分布:相模湾・山口県北部以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯下部～水深20m, 岩礁底)	
1183	<i>Costellaria rubella</i> (Adams & Reeve, 1850)	クロダツクシ
	分布:相模湾・伊豆諸島以西, 四国, 九州(水深100～200m, 砂底)	
1184	<i>Costellaria rustica</i> (Reeve, 1845 in 1843-65)	ベニオトメフデ
	産地:館山湾(佐々木1989;奥谷ら*, 小湊(大島1993))	
	分布:相模湾・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋, 紅海(潮間帯下部～水深30m, 岩礁底)	
1185	<i>Costellaria zelotyra</i> (Reeve, 1845 in 1843-65)	ヒシオトメ
	産地:館山湾(堀越1990)	
	分布:神奈川県三浦市・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, フィリピン(潮間帯～水深20m, 岩礁底)	
1186	<i>Costellaria sagamiensis</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	サガミツクシガイ
	産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*, 銚子(渡辺1988))	
	分布:銚子沖, 相模湾, 恵河湾, 伊豆諸島(黒瀬)(水深100～175m, 砂礫底)	
1187	<i>Costellaria hiliaris</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	ヨロコビツクシガイ
	産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*, 小湊(大島1993))	
	分布:相模湾	
1188	<i>Costellaria collinsoni</i> (A. Adams, 1864)	コリンソンミノムシ
	産地:館山湾(堀越1990)	
	分布:相模湾・山口県北部以南, 四国, 九州, 西太平洋, ハワイ(潮間帯～水深60m, 砂底)	
1189	<i>Pusia daedala</i> (Reeve, 1845)	ハマオトメ
	産地:館山湾(堀越1990), 銚子(稻葉1963)	
	分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 西太平洋(潮間帯～水深20m, 岩礁底)	
1190	<i>Pusia discoloria</i> (Reeve, 1845)	シマオトメ
	産地:館山湾(田村1987;佐々木1989;堀越1990;奥谷ら*, 白浜(清水))	
	分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 西太平洋(潮間帯, 岩礁)	
1191	<i>Pusia consanguinea</i> (Reeve, 1845)	ミヨリオトメ

	分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 西太平洋(潮間帯, 砂・サンゴ砂底)	
1192	<i>Pusia cavaea</i> (Reeve, 1844) 産地:館山湾(佐々木1989;奥谷ら*) 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, マルケサス(潮間帯~水深10m, 砂礫底)	ソメワケオトメ
1193	<i>Pusia microzonias</i> (Lamarck, 1811) 産地:館山湾(佐々木1989;堀越1990;奥谷ら*) 分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 西太平洋(潮間帯下部, 岩礁)	クロオトメ
1194	<i>Pusia adamsi</i> (Dohrn, 1861) 分布:房総半島(肥後・後藤1993)・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, 西太平洋(潮間帯, 岩礁) 土屋 in 奥谷2000は奄美以南とする	トリカゴオトメ
1195	<i>Pusia aenula</i> (E. A. Smith, 1879) 産地:館山湾(佐々木1989;堀越1990;奥谷ら*) 分布:三陸沿岸南部・男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深20m, 岩礫底)	シノミツクシ
1196	<i>Pusia inermis</i> (Reeve, 1845) 産地:萩生(清水), 館山湾(田村1987;佐々木1989;堀越1990;奥谷ら*, 清水), 布良, 白浜(清水), 太海, 天津(大島1993), 小濱(猪野1942c), 勝浦(大島1993), 銚子(稻葉1963;渡辺1988) 分布:房総半島・男鹿半島沖以南, 四国, 九州, フィリピン, 西太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礫底)	ヒゼンツクシ
1197	<i>Thala ogasawarana</i> Pilsbry, 1904 産地:館山湾(堀越1990;清水), 布良, 白浜(清水), 勝浦, 御宿(大島1993) 分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 小笠原諸島, 热帯インド・太平洋(潮間帯~水深10m, 岩礁底)	ノミフデ
1198	<i>Vexillum castum</i> (H. Adams, 1872) 分布:太平洋側(0~35°N) Family Volutomitridae	フデヒタチオビガイ科 フデヒタチオビ
1199	<i>Volutomitra alaskana</i> Dall, 1902 産地:銚子(櫻井1964;渡辺1988) 分布:鹿島灘以北, 三陸沿岸, 津軽海峡, 北海道南部, 千島, ベーリング海, 米国西岸(水深100~200m, 泥底), 相模湾, 岩手県沖, 佐渡島沖(水深400~1,000m, 砂泥底)	
1200	<i>Microvoluta hondoana</i> (Yokoyama, 1922) タイプ产地:千葉県市原市市東(化石) 产地:館山湾(田村1987;奥谷ら*) 分布:相模湾, 駿河湾, 伊豆半島沖(水深50~200m, 細砂底) Family Marginellidae	コピトオトメフデ
1201	<i>Hydroginella sagamiensis</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971) 分布:相模湾, 駿河湾(水深50~100m, 砂底)	ヘリトリガイ科 コハクコゴメガイ
1202	<i>Dentimargo makiyamai</i> (Habe, 1951) 产地:館山湾(田村1987;奥谷ら*) 分布:相模湾以南, 紀伊半島, 九州西岸, 奄美大島(水深50~100m, 砂底) Family Cystiscidae	フタスジコゴメガイ
1203	<i>Cystiscus nanaoensis</i> (Habe, 1951) 产地:館山湾(田村1987;田村・奥谷1989;奥谷ら*) 分布:千葉県館山湾・佐渡島以南, 紀伊半島, 九州西岸(潮間帯~水深50m, 砂礫底)	コゴメガイ科 チビツユダマガイ
1204	<i>Cystiscus hema</i> Kay, 1979 产地:館山湾(水深60.0m:田村1987;奥谷ら*) 分布:相模湾・佐渡島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深50m, 砂礫底)	ツユダマガイ
1205	<i>Gibberula sueziensis</i> (Issel, 1869) 产地:館山湾(水深12.1~60.0m:田村1987;奥谷ら*) 分布:三陸沿岸(気仙沼)・久六島以南, 四国, 九州(水深5~50m, 砂底)	コゴメガイ
1206	<i>Gibberula sandwicensis</i> (Pease, 1860) 分布:房総半島以南, 紀伊半島, 四国, 九州(潮間帯~水深20m, 砂底)	ニセコゴメガイ
1207	<i>Gibberula novemprovincialis</i> (Yokoyama, 1928) 产地:館山湾(田村1987;奥谷ら*), 銚子(渡辺1988) 分布:三陸南部沿岸以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深20~300m, 細砂底)	リュウグウコゴメガイ
1208	<i>Granulina tantilla</i> (Gould, 1860) 产地:館山湾(水深26.0~88.0m:田村1987;奥谷ら*), 沖ノ山(神奈川県博1972), 大原(清水) 分布:房総半島・久六島以南, 四国, 九州西南部, 東シナ海, 中国(潮間帯~水深100m, 砂底); 鹿児島県燃島(t.) Superfamily Cancellarioidea Family Cancellariidae	タカラコゴメガイ
1209	<i>Cancellaria (Merica) laticosta</i> (Löbbecke, 1881) 产地:竹岡, 枝生(清水), 館山湾(田村1987;村越1998;奥谷ら*), 小濱(猪野1942c), 銚子(鶴岡ら1994) 分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, フィリピン(水深10~50m, 細砂底)	コロモガイ上科 コロモガイ科 コンゴウボラ
1210	<i>Cancellaria (Momoebora) sinensis</i> Reeve, 1856 产地:太海, 鵠川(大島1993), 小濱(猪野1942c), 銚子(渡辺1988) 分布:銚子沖・男鹿半島以南, 四国, 九州, 台湾, 東アジア(水深10~50m, 泥底)	モモエボラ
1211	<i>Cancellaria (Sydaphera) spengleriana</i> Deshayes, 1830 产地:盤洲沖(風呂田1984), 東京湾(神奈川県博1972), 第1海堡南西水深21.5m, 竹岡, 枝生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(水深9.6m:田村1987;堀越1990;佐々木1990;村越1998;奥谷ら*:清水), 白浜, 千倉(清水), 太海, 鵠川(大島1993;清水), 天津(猪野1942c;大島1993;清水), 小濱(岩川1900;猪野1942c;堀越ら1987;大島1993;清水), 安房(岩川1900;福井市博1962), 勝浦(大島1993;清水), 九十九里浜(清水), 銚子(鹿島ら1962;稻葉1963;櫻井1964;鶴岡ら1994) 分布:北海道南部・男鹿半島以南, 日本各地, 中国, インド・太平洋(水深10~50m, 砂泥地)	コロモガイ
1212	<i>Cancellaria (Habesolatia) nodulifera</i> (Sowerby I, 1825)	トカシオリイレ

1213	<i>Nipponaphera habei</i> Petit, 1972	アサゴロモ
	分布: 房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 台湾(水深50~100m, 砂泥底)	
1214	<i>Axelella semipellucida</i> (Adams & Reeve, 1850)	オボロオリイレボラ
	分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州, 台湾, スールー海(水深50~150m, 砂泥底)	
1215	<i>Trigonostoma crenifera</i> (Sowerby I, 1833)	ヘソアキオリイレボラ
	分布: 房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, インド・太平洋(水深10~50m, 細砂底)	
1216	<i>Trigonostoma scalariformis</i> (Lamarck, 1822)	オリイレボラ
	分布: 房総半島・九州北西岸以南, 四国, 九州, 東シナ海, 中国(水深10~50m, 泥底)	
1217	<i>Trigonostoma amakusana</i> (Petit, 1974)	ホソオリイレボラ
	分布: 房総半島以南, 四国, 九州北西岸(水深10~50m, 砂泥底)	
1218	<i>Admete viridula</i> (Fabricius, 1780)	エゾゴロモ
	分布: 駿河湾・鹿島灘(水深1,000m)・但馬沖以北, 北海道, 千島, ベーリング, オホーツク海(水深50~300m, 砂泥底)	
1219	<i>Admete watanabei</i> Shikama, 1962	ヒメウスカワゴロモ
	タイプ产地: 錫子沖(100fms.)	
	産地: 錫子沖(Shikama, 1962; Oyama & Takemura, 1963; 渡辺1988)	
	分布: 錫子沖以北, 三陸沿岸(水深100~800m, 泥底)	
1220	<i>Admete choshiensis</i> Shikama, 1962	チヨウシゴロモ
	タイプ产地: 錫子沖(水深250~260fms.)	
	産地: 錫子沖(Shikama, 1962; Oyama & Takemura, 1963; 渡辺1988)	分布: 同
1221	<i>Admete profundicola</i> (Okutani, 1964)	ワタゾコゴロモ
	分布: 相模湾	
1222	<i>Neadmete okutanii</i> Petit, 1974	ニッポンコロモガイ
	産地: 錫子沖(渡辺1988)	
	分布: 錫子沖・若狭湾以南, 四国, 九州(水深100~200m, 砂泥底)	
1223	<i>Neadmete japonica lischkei</i> (Yokoyama, 1922)	
	タイプ产地: 上総層(化石)	
	分布: 三陸沿岸(大槌湾口の深所)	
1224	<i>Microsveltia sagamiensis</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	コビトコロモガイ
	産地: 錫子(渡辺1988)	
	分布: 相模湾, 駿河湾, 上佐湾(水深50~200m, 砂底)	
1225	<i>Iphinoopsis choshiensis</i> Habe, 1958	コエゾネジヌキ
	分布: 鹿島灘から相模湾(水深200mまでの陸棚上, 砂泥底)	
1226	<i>Iphinoopsis bathyalis</i> (Okutani, 1964)	ワタゾコネジヌキ
	分布: 相模湾(水深550m, 砂泥底)	
1227	<i>Fusiaphera macrospira</i> (Adams & Reeve, 1850)	
	分布: 房総半島以南, 土佐沖, 九州西岸, 東シナ海, 西太平洋(水深50~100m, 細砂底)	
1228	<i>Fusiaphera azumai</i> Habe, 1961	アズマモモエボラ
	産地: 館山湾(田村1987; 田村・奥谷1989; 奥谷ら*)	
	分布: 館山湾以南, 土佐沖, 九州西岸(水深50~150m, 砂底)	
	Superfamily Conoidea	イモガイ上科
	Family Conidae	イモガイ科
1229	<i>Conus (Lithoconus) tessulatus</i> Born, 1778	ハルシャガイ
	産地: 竹岡(清水), 富浦(福葉1963a; 清水), 館山湾(お茶大館山1973; 田村1987; 佐々木1989; 堀越1990; 村越1998; 奥谷ら*; 清水), 布良, 白浜(清水), 安房(杉谷1935), 房総半島(神奈川県博1972)	
	分布: 房総半島・九州西岸以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深50m, 砂礫・サンゴ砂底)	
1230	<i>Conus (Cleobula) quercinus</i> (Lightfoot, 1786)	ロウソクガイ
	産地: 館山湾(村越1998)	
	分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯下部~水深70m, 砂底)	
1231	<i>Conus (Virroconus) millaris</i> Hwass in Bruguière, 1792	サヤガタイモ
	産地: 竹岡, 萩生, 金谷(清水), 駿山(田中ら1974; 清水), 富山, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1989; 堀越1990; 奥谷ら*; 清水), 布良, 白浜, 千倉(清水), 太海(千葉水試1981a; 清水), 鶴川(清水), 小湊(猪野1942c; 福井市博1962; 大島1993; 清水), 安房(杉谷1935), 浜行川(清水), 興津(大島1993; 清水)	
	分布: 福島県・山口県北部以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯, 砂泥の多い岩礁)	
1232	<i>Conus (Virroconus) coronatus</i> Gmelin, 1791	ジュズカケサヤガタイモ
	産地: 館山湾(清水), 小湊(大島1993), 安房(杉谷1935)	
	分布: 紀伊半島・九州南部以南, 四国, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯, 岩礁)	
1233	<i>Conus (Stephanoconus) pauperculus</i> Sowerby I, 1834	ベニイモ
	産地: 竹岡, 萩生, 富浦(清水), 館山湾(佐々木1989; 堀越1990; 村越1998; 奥谷ら*; 清水), 布良(清水), 白浜(岩川1900; 清水), 小湊(猪野1942c), 安房(杉谷1935; 福井市博1962), 勝浦(大島1993)	
	分布: 房総半島・但馬沖以南, 四国, 九州, 奄美(潮間帯下部~水深50m, 岩礁底)	
1234	<i>Conus (Parviconus) tuberculatus</i> Tomlin, 1937	ミウライモ
	産地: 館山湾(奥谷ら*)	
	分布: 相模湾以南, 四国, 対馬沖(水深50~200m, 砂底)	
1235	<i>Conus (Chelyconus) catus</i> Hwass in Bruguière, 1792	アラレイモ
	産地: 安房北条(岩川1900)	
	分布: 房総半島・土佐以南, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帯~水深20m, 岩礁)	
1236	<i>Conus (Chelyconus) fulmen</i> (Reeve, 1843)	ベッコウイモ

- 产地:竹岡,萩生,勝山,富山,富浦(清水),館山湾(佐茶大館山1973;佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水),布良(清水),白浜(岩川1900;清水),千倉(清水),鶴川,天津(大島1993;清水),小湊(猪野1942c;福井市博1962;福葉1963a;大島1993;小池1994;清水),安房(岩川1900;杉谷1935),勝浦(大島1993;清水)
分布:房総半島・男鹿半島以南,四国,九州,奄美,沖縄,台湾(潮間帯~水深50m,礁の多い砂泥中)
- 1237 *Conus (Chelyconus) fulmen* form *kirai* Kuroda, 1956 キラベッコウイモ
产地:竹岡(清水),館山湾(佐々木1989;堀越1990),布良,白浜,小湊(清水)
分布:房総半島・日本海見島以南,四国,九州,奄美,沖縄,台湾(潮間帯~水深50m)
- 1238 *Conus (Phasmoconus) cinereus* Hwass in Bruguière, 1792 ハイイロイモ
产地:安房(*Pionoconus cinereus*:杉谷1935)
分布:紀伊半島以南,四国,九州,奄美,沖縄,インド・西太平洋(水深10~50m,岩礁底)
- 1239 *Conus (Rhizoconus) miles* Linnaeus, 1758 ヤナギシボリイモ
产地:館山湾(清水)
分布:紀伊半島・九州西岸以南,四国,奄美,沖縄,インド・太平洋(潮間帯~水深20m,岩礁及び砂底)
- 1240 *Conus (Rhizoconus) hischkeanus* Weinkauff, 1875 リシケイモ
产地:館山湾(佐々木1990;奥谷ら*),鶴川,勝浦(大島1993),銚子(渡辺1988)
分布:房総半島・日本海見島以南,九州西岸,奄美,沖縄,台湾(潮間帯~水深200m,砂底・岩礁底)
- 1241 *Conus (Rhizoconus) rattus* Hwass in Bruguière, 1792 ハイイロミナシ
产地:房総半島・山口県北部以南,四国,九州,奄美,沖縄,インド・太平洋域(潮間帯~水深20m,岩礁)
- 1242 *Conus (Vigiconus) flavidus* Lamarck, 1810 キヌカツギ
产地:館山湾(佐々木1989;奥谷ら*)
分布:房総半島・九州西岸以南,四国,奄美,沖縄,インド・太平洋(潮間帯下部,岩礁)
- 1243 *Conus (Vigiconus) lividus* Hwass in Bruguière, 1792 イボシマイモ
产地:竹岡,萩生,館山湾(清水)
分布:房総半島・山口県北部以南,四国,九州,奄美,沖縄,インド・太平洋(潮間帯下部~水深20m,岩礁)
- 1244 *Conus (Asprella) orbignyi* Andouin, 1831 オルビニイモ
产地:鶴川,小湊(大島1993),銚子(福葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布:房総半島・山形県沖以南,四国,九州,奄美,沖縄,インド,太平洋(水深30~100m,砂底)
- 1245 *Conus (Asprella) ichinoseana* (Kuroda, 1956) リュウオウイモ
产地:銚子(渡辺1988)
分布:銚子以南,奄美,沖縄,台湾,フィリピン(水深70~250m,砂底)
- 1246 *Conus (Conasprella) pagodus* Kiener, 1845 ヒシイモガイ
产地:鶴川(大島1993),銚子(福葉1963;渡辺1988)
分布:銚子沖・九州西岸以南,四国,奄美,沖縄,東シナ海,台湾,インド・太平洋(水深50~100m,砂泥底)
- 1247 *Conus (Conasprella) praeclens* A. Adams, 1854 キシュウイモ
产地:館山湾(田村1987;奥谷ら*),銚子(渡辺1970:1988)
分布:銚子沖・九州西岸以南,四国,奄美,沖縄,台湾,中・西太平洋(水深50~400m,砂底)
- 1248 *Conus elegans* Sowerby III, 1895 スイシイモ
产地:館山湾(藤田,1929b)
分布:千葉県館山湾以南
- 1249 *Conus (Endemoconus) sugimotoonis* Kuroda, 1929 スギモトイモ
产地:小湊(大島1993)
分布:房総半島・志摩半島・九州西岸以南,土佐沖,奄美,沖縄,東シナ海,南シナ海,オーストラリア(水深50~200m,砂泥底);燃島(化石)
- 1250 *Conus (Endemoconus) sieboldii* Reeve, 1848 アコメガイ
产地:竹岡,萩生,金谷(清水),館山湾(藤田1929b;奥谷ら*),鶴川(大島1993),天津,小湊(大島1993;清水),安房(杉谷1935),九十九里沖水深240m(清水),銚子(鹿股ら1962;福葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)
分布:房総半島・九州西岸以南,奄美,沖縄,東シナ海,フィリピン(水深50~200m,砂泥底);燃島(化石)
- 1251 *Conus (Endemoconus) ione* Fulton, 1938 イナズマアコメ
产地:銚子(渡辺1988)
分布:房総半島・九州西岸以南,奄美,沖縄,東シナ海,台湾,フィリピン(水深100~200m,砂泥底)
- 1252 *Conus (Profundiconus) profundorum* (Kuroda, 1956) ヨモスガライモ
产地:銚子(渡辺1988)
分布:銚子沖以南,四国,東シナ海,台湾(水深200~400m,砂泥底)
- 1253 *Conus (Profundiconus) ikedai* Ninomiya, 1987 サガミイモ
产地:相模湾(城ヶ島南水深250m,葉山沖・甘鯛場水深300m)
Family Turridae
- 1254 *Thatcheria mirabilis* (Angas, 1877) クダマキガイ科
产地:鶴川,天津,小湊,浜行川(大島1993),九十九里沖ミゾ場水深135m(清水),銚子(渡辺1988)
分布:銚子沖以南,四国,九州西岸,東シナ海,台湾,南シナ海,フィリピン(水深150~400m,砂底)
- 1255 *Clathrodrillia takeokensis* (Otuka, 1949) ミドリモミジボラ
タイプ产地:富津市竹岡(房総半島上総層群十宮層:化石)
产地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995),銚子(福葉1963;櫻井1964;鶴岡ら1994)
分布:駿河湾以北,鹿島灘,三陸沖,北海道(水深100~600m,砂泥底)
- 1256 *Clavus (Tylotiella) humilis* (E. A. Smith, 1879) ヒメウミクダマキ
分布:房総半島・男鹿半島以南,紀伊半島,四国,九州(水深5~40m,砂底)
- 1257 *Clavus (Tylotiella) subobliquata* (E. A. Smith, 1879) クリイロウミクダマキ
分布:房総半島・男鹿半島以南,四国,九州,台湾,フィリピン(潮下部~水深80m,砂泥)
- 1258 *Clavus (Tylotiella) japonica* (Lischke, 1869) オハグロシャジク
产地:館山湾(堀越1990;佐々木1990;奥谷ら*),布良,白浜(清水),勝浦(大島1993),銚子(鹿股ら1962;福葉1963;櫻井1964;渡辺1988)
分布:北海道南西部・青森県以南,四国,九州(潮間帯下部~水深50m,細砂底)

1259	<i>Elaeocyma benten</i> (Yokoyama, 1920)	ベンテンモミジボラ
	産地: 小湊(大島1993), 錦子(稻葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988) 分布: 房総半島・若狭湾以南, 四国, 九州, 東シナ海(水深50~100m, 砂底)	
1260	<i>Elaeocyma glabriuscula</i> (Yokoyama, 1922)	ミガキヒメモミジボラ
	タイプ産地: 千葉県市原市市東(化石) 分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(水深50~100m, 砂底)	
1261	<i>Elaeocyma glabriuscula brevis</i> (Yokoyama, 1922)	チビミガキヒメモミジボラ
	タイプ産地: 千葉県市原市市東(化石) 分布: 房総半島以南, 四国, 九州(水深50~100m, 砂底)	
1262	<i>Elaeocyma hyugana rognata</i> Kuroda (MS)	
	分布: 相模湾	
1263	<i>Elaeocyma (Splendrillia) braunsi</i> (Yokoyama, 1920)	リンドウクダマキ
	産地: 天津(清水), 小湊(大島1993), 錦子(渡辺1988) 分布: 錦子沖~遠州灘(水深60~200m, 細砂底), 佐渡島付近~但馬沖(水深50~300m)	
1264	<i>Elaeocyma (Splendrillia) solicitata</i> (Sowerby III, 1913)	モモイロモミジボラ
	産地: 館山湾(鶴越1990) 分布: 房総半島以南, 四国, 九州(水深60~200m, 砂底), 燐島(化石)	
1265	<i>Elaeocyma (Splendrillia) aomoriensis</i> (Nomura & Hatali, 1940)	ゴシキモミジボラ
	産地: 錦子(渡辺1988) 分布: 三陸沖, 錦子沖, 志摩半島沖, 青森県沖(水深60~200m, 砂底)	
1266	<i>Elaeocyma (Splendrillia) chinensis</i> (McNeil, 1960)	ヒナモミジボラ
	産地: 小湊(大島1993) 分布: 相模湾(水深50~200m, 砂底), 沖縄(化石)	
1267	<i>Austrodrillia hinomotoensis</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	コピトモミジボラ
	産地: 小湊(大島1993) 分布: 相模湾(水深60~150m, 砂底)	
1268	<i>Cymatosyrinx impolita</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	ツヤナシモミジボラ
	産地: 鶴川(大島1993), 錦子(渡辺1988) 分布: 錦子沖, 相模湾(水深50~200m, 砂底)	
1269	<i>Cymatosyrinx paricipata</i> (Sowerby III, 1915)	ヒメモミジボラ
	分布: 相模湾(水深100m前後), 燐島(化石)	
1270	<i>Leptadrillia cinereopellis</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	ハイギヌモミジボラ
	産地: 錦子(渡辺1988) 分布: 錦子沖, 相模湾(水深50~200m, 砂泥底)	
1271	<i>Haedropleura pygmaea</i> (Dunker, 1860)	チビシャジク
	産地: 小湊(大島1993), 錦子(渡辺1988) 分布: 房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(潮間帶~水深60m, 砂底)	
1272	<i>Haedropleura fukuchiana</i> (Yokoyama, 1922)	フクチチビシャジク
	タイプ産地: 千葉県成田市大竹(化石) 分布: 日本海但馬沖, 若狭湾(水深25~150m, 砂底)	
1273	<i>Inquierter jeffreysii</i> (E. A. Smith, 1875)	モミジボラ
	産地: 東京湾(神奈川県博1972), 巣洲沖(風呂田1985b), 竹岡, 萩生, 金谷, 富山(清水), 館山湾(佐々木1990; 奥谷ら*; 清水), 布良, 白浜(清水), 天津, 小湊(猪野1942c; 大島1993; 清水), 十九里浜(清水), 錦子(稻葉1963; 櫻井1964) 分布: 北海道南部・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深10~100m, 砂底)	
1274	<i>Inquierter vulpionis</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	ミガキモミジボラ
	産地: 竹岡, 萩生, 金谷, 富山, 鮎山湾(清水), 小湊, 浜行川(大島1993), 錦子(渡辺19988) 分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深10~100m, 砂底)	
1275	<i>Inquierter mudivaricosus</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	オボロモミジボラ
	産地: 竹岡, 金谷(清水), 錦子(渡辺1988) 分布: 房総半島以南, 四国, 九州西岸(水深20~50m, 砂底)	
1276	<i>Inquierter flavidula</i> (Lamarck, 1822)	タケノコシャジク
	産地: 錦子(稻葉1963; 鶴岡ら1994) 分布: 錦子沖・山口県見島以南, 四国, 九州西岸(水深30~80m, 砂底)	
1277	<i>Inquierter angustus</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	ハシナガモミジボラ
	産地: 鶴川(大島1993), 錦子(渡辺1988) 分布: 錦子沖・若狭湾以南, 紀伊半島, 九州西岸(水深15~100m, 砂泥底)	
1278	<i>Inquierter cosibensis</i> (Yokoyama, 1920)	
	分布: 本州太平洋岸(35° N)	
1279	<i>Pseudoinquierter exiguis</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	チイサモミジボラ
	産地: 錦子(渡辺1988) 分布: 錦子沖, 相模湾(水深50~200m, 砂泥底)	
1280	<i>Microdrillia sagamiensis</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	ツマミシャジク
	分布: 相模湾, 若狭湾(水深40~150m, 砂泥底)	
1281	<i>Imaclava hosoi</i> Okutani, 1964	
	分布: 相模湾	
1282	<i>Suavodrillia declivis</i> (v. Martens, 1880)	トガリクダマキ
	産地: 錦子(稻葉1963; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988; 鶴岡ら1994) 分布: 北海道南部・越前沖以南, 本州、四国, 九州(水深20~200m, 砂底)	

- 1283 *Horaiclavus splendidus* (A. Adams, 1867) ツヤシャジク
分布:相模湾・若狭湾以南, 四国, 九州, フィリピン(水深50~200m, 砂底); 鹿児島湾内燃島(化石)
- 1284 *Horaiclavus shitoensis* Oyama in Taki & Oyama, 1954 シトウイグチ
タイプ産地: 千葉県市原市市東(化石)
産地: 館山湾(肥後・後藤, 1993)
分布: 銚子沖以南, 四国(土佐沖)(水深60~200m, 砂底)
- 1285 *Horaiclavus (Cytharoclavus) filicinctus* (E. A. Smith, 1882) ヒサゴシャジク
分布: 相模湾以南, 四国, 九州(水深55~150m, 砂底)
- 1286 *Horaiclavus (Cytharoclavus) stenocyma* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ヌリツヤシャジク
産地: 銚子(神奈川県博1972)
分布: 銚子沖以南, 四国(土佐沖)(水深50~200m, 砂底)
- 1287 *Pulsarella komakimonos* (Otuka, 1935) コグシャジク
産地: 銚子(渡辺1989)
分布: 銚子沖・男鹿半島以南, 四国, 但馬沖(水深10~80m, 砂底)
- 1288 *Tomopleura nivea* (Philippi, 1851) マキモノシャジク
産地: 館山湾(堀越1990), 銚子(稻葉1963; 渡辺1988)
分布: 銚子沖・能登半島以南, 四国, 九州, 台湾, インド・西太平洋(水深5~70m, 細砂底)
- 1289 *Tomopleura pouloensis* (Jousseaume, 1883) コグマキモノシャジク
産地: 銚子(稻葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 銚子沖・若狭湾以南, 四国, 九州(水深10~130m, 砂底)
- 1290 *Kuroshioturris albogemmata* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 シロフシクダマキ
分布: 相模湾~土佐湾(水深50~150m, 砂底)
- 1291 *Kuroshioturris kurodai* (Makiyama, 1927) キリフシクダマキ
分布: 相模湾以南, 志摩半島沖, 遠州灘(水深100~200m, 砂底)
- 1292 *Gemmula pseudogranosa* (Nomura, 1940) ニシキジュズカケクダマキ
タイプ産地: 銚子の北
産地: 銚子の北(Nomura 1940)
分布: 銚子沖以南, 志摩半島沖, 四国(水深70~150m, 砂底)
- 1293 *Gemmula husamaru* (Nomura, 1940) ロザリオクダマキ
タイプ産地: 銚子の北
産地: 銚子(Nomura 1940; 櫻井1964)
分布: 銚子沖以南, 志摩半島沖, 土佐沖(水深50~100m, 砂底)
- 1294 *Gemmula pulchella* Shuto, 1961 ホソジュズカケクダマキ
産地: 小瀬(大島1993), 銚子(渡辺1988)
分布: 銚子沖以南, 志摩半島沖, 土佐沖, 九州, 日本海見島(水深20~110m, 砂底); 燐島(化石)
- 1295 *Gemmula rarimaculata* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 トビフクダマキ
産地: 銚子(渡辺1988)
分布: 銚子沖以南, 駿河湾, 志摩半島沖, 土佐沖, オーストラリア(水深60~150m, 砂底)
- 1296 *Gemmula congener cosmoi* (Sykes, 1830) メルビルクダマキ
産地: 鶴川, 天津, 小瀬(大島1993; 清水), 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, インド・太平洋(水深10~50m, 細砂底)
- 1297 *Gemmula kieneri* (Dumont, 1840) ジュズカケクダマキ
産地: 館山湾(藤田1929b), 天津(清水), 小瀬(大島1993)
分布: 銚子沖・日本海見島以南, 四国, 九州, 香港, 台湾, フィリピン(水深20~150m, 砂底)
- 1298 *Gemmula timorensis* (Tesch, 1915) トサトウガタクダマキ
分布: 銚子沖以南, 土佐沖, セレベス海, モルツカ沖(水深200~1,000m, 砂底)
- 1299 *Gemmula (Unedogemmula) unedo* (Kiener, 1839) ホンカリガネ
産地: 竹岡, 萩生, 金谷, 富山, 富浦(清水), 館山湾(藤田1929b; 清水), 鶴川(大島1993), 天津, 小瀬(猪野1942c; 福井市博1962; 大島1993; 清水), 銚子(稻葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)
分布: 房総半島・九州西岸以南, 四国, 中国, フィリピン, インド・西太平洋, ベルシャ湾(水深50~150m, 細砂底); 燐島(化石)
- 1300 *Gemmula (Unedogemmula) deshayesi* (Dumont, 1839) カリガネガイ
産地: 銚子(渡辺1988)
分布: 房総半島以南, 四国, 九州, 台湾, 香港, 中国(水深50~100m, 砂泥底)
- 1301 *Lophiotoma (Lophiotoma) notata* (Sowerby III, 1889) コガスリクダマキ
分布: 相模湾以南, 志摩半島沖, 四国, 奄美, 台湾, 南シナ海(水深50m~200m, 砂底)
- 1302 *Lophiotoma (Lophioturris) leucotropis* (Adams & Reeve, 1850) クダマキガイ
産地: 竹岡, 萩生, 富山, 富浦, 館山湾(清水), 安房北条(岩川1900), 天津(猪野1942c; 清水), 小瀬(猪野1942c; 堀越ら1987; 大島1993; 清水), 銚子(高木ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)
分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, フィリピン, 台湾, 南シナ海(水深20~100m, 細砂底)
- 1303 *Lophiotoma (Lophioturris) indica* (Röding, 1798) マダラクダマキ
分布: 房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, フィリピン, 西オーストラリア, フィジー, スリランカ(水深20~80m, 砂泥底)
- 1304 *Xenuroturrpis millepunctata* (Sowerby III, 1909) カスリクダマキ
産地: 小瀬(猪野1942c), 銚子(渡辺1988)
分布: 銚子以南, 四国, 奄美, 沖縄, 西太平洋(水深10~30m, 細砂底)
- 1305 *Turris gemmata* (Reeve, 1843)
分布: 太平洋側(0~35° N)
- 1306 *Turris pseudogranosa* Nomura, 1940
タイプ産地: 銚子の北

産地:銚子(Nomura 1940)	
分布:銚子の北	
1307 <i>Turris (Annulaturris) brevicanalis</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	ゴマフクダマキ
分布:相模湾以南, 四国, 九州(水深20m~50m, 砂底)	
1308 <i>Viridoturris feris</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	メデタコシャジク
産地:御宿(大島1993), 銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖, 相模湾, 駿河湾, 三陸(大槌湾)(水深67~300m, 砂底)	
1309 <i>Comitas kaderlyi</i> (Lischke, 1872)	イグチガイ
タイプ産地:東京湾(水深60~100m)	
産地:東京湾(Lischke 1872)秩生, 富山, 館山湾(清水), 鶴川(大島1993), 天津, 小湊(大島1993; 清水), 安房(福井市博1962), 銚子(稻葉1963; 渡辺1988)	
分布:房総半島・九州西岸以南, 四国, 東シナ海, 奄美, 沖縄, 台湾, フィリピン(水深140~1600m, 砂泥底)	
1310 <i>Comitas kirai</i> Powell, 1969	アケボノイグチ
産地:銚子(稻葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)	
分布:銚子沖以南, 遠州灘, 紀伊半島, 土佐沖, 九州西岸, 東シナ海, フィリピン(水深50~400m, 砂泥底)	
1311 <i>Comitas kamakurana</i> (Pilsbry, 1875)	カマクライグチ
産地:天津, 小湊, 勝浦(大島1993), 銚子(高木ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964)	
分布:房総半島以西, 駿河湾, 紀伊半島, 土佐沖, 九州西岸, フィリピン, ハワイ(水深10~100m, 砂底)	
1312 <i>Cretaspira cretacea</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	シロタエイグチ
産地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖以南, 相模湾, 志摩半島沖, 土佐沖(水深100~300m, 砂底)	
1313 <i>Makiyamaia coreanica</i> (Adams & Reeve, 1850)	チヨウセンイグチ
産地:竹岡, 金谷(清水), 天津, 小湊(大島1993), 銚子(稻葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)	
分布:銚子沖以南, 紀伊半島, 土佐沖, 九州西岸, 朝鮮(水深160~450m, 砂底)	
1314 <i>Makiyamaia mammillata</i> Kuroda, 1961	マキヤマイグチ
分布:相模湾以南, 四国, 九州(水深100~200m, 砂底)	
1315 <i>Makiyamaia subdeclinis</i> (Yokoyama, 1926)	クチヅノイグチ
分布:房総半島以南, 土佐沖, 九州西岸, 台湾, 南シナ海(水深100~400m, 砂底)	
1316 <i>Cochlespira pulchela pulcherrissima</i> Kuroda, 1959	テンジククダマキ
産地:天津(清水), 小湊(大島1993), 銚子(渡辺1988)	
分布:房総半島以南, 四国, 九州西岸, 東シナ海(水深100~200m, 砂礫底)	
1317 <i>Thatcheriasyrinx orientis kawamurai</i> (Kuroda, 1959)	ヨウラククダマキ
分布:相模湾, 神縄宮古島, フィリピン(水深100~200m, 砂底)	
1318 <i>Aforia japonica</i> Bartsch, 1945	ニホンヤゲンイグチ
分布:相模湾, 駿河湾(水深1,000~1,500m, 砂泥底)	
1319 <i>Aforia diomedea</i> Bartsch, 1945	ヤゲンイグチ
産地:九十九里沖水深950~1,100m(清水), 銚子沖水深250m(奥谷ら1988), 銚子(神奈川県博1991; 鶴岡ら1994)	
分布:銚子沖・能登半島以北, 東北, 北海道, ベーリング海, ア拉斯カ(水深60~600m, 泥底)	
1320 <i>Aforia hondoana</i> Dall, 1925	ヒメヤゲンイグチ
産地:銚子(稻葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)	
分布:相模湾, 鹿島灘(水深200~250m)	
1321 <i>Aforia otohimei</i> (Ozaki, 1958)	オトヒメイグチ
タイプ産地:千葉県銚子市常世田町(飯岡層, 化石)	
1322 <i>Antiplanes contaria</i> (Yokoyama, 1926)	ヒダリマキイグチ
産地:銚子(鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)	
分布:鹿島灘・但馬以北, 北海道, オホーツク海, ベーリング海(水深50~500m, 細砂底)	
1323 <i>Antiplanes osimai</i> Oyama (MS)	カシマヒダリマキイグチ
分布:鹿島灘以北, 三陸沿岸	
1324 <i>Rectiplanes sanctioannis</i> (E. A. Smith, 1875)	エゾイグチ
産地:銚子(稻葉1963; 櫻井1964; 神奈川県博1972; 渡辺1988; 鶴岡ら1994)	
分布:相模湾・但馬湾以北, 東北, 北, オホーツク海(水深50~1000m, 砂泥底)	
1325 <i>Rectiplanes (Rectisulcus) kawamurai</i> Habe, 1958	カワムラエゾイグチ
タイプ産地:銚子沖(100~150fms.)	
産地:銚子沖(Habe 1958; Shikama 1962; 鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)	
分布:相模湾以北, 千島列島(水深200~300m, 砂泥底)	
1326 <i>Rectiplanes (Rectisulcus) yukiae</i> Shikama, 1962	チチカケイグチ
タイプ産地:銚子沖(水深250~300fms.)	
産地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995), 銚子沖(Shikama 1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)	
分布:銚子沖以北, 北海道(水深200~600m, 砂泥底)	
1327 <i>Rectiplanes (Rectisulcus) motojimai</i> Habe, 1958	モトジマイグチ
タイプ産地:銚子沖	
産地:銚子沖(Habe 1958; 鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 神奈川県博1991; 鶴岡ら1994)	
分布:銚子沖以北, 三陸沖・但馬沖(水深200~400m, 砂泥底)	
1328 <i>Rectiplanes (Rectisulcus) isaotakii</i> Habe, 1958	タキエゾイグチ
タイプ産地:銚子沖	
産地:銚子沖(Habe 1958; 鹿股ら1962; 稲葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988; 長谷川・齊藤1995)	
分布:銚子沖以北, 三陸沿岸沖(水深200~600m, 砂泥底)	
1329 <i>Crassispira ryuvaricosa</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	トラフモミジボラ
産地:銚子(渡辺1988)	

分布:伊豆諸島・銚子沖以南, 志摩半島沖, 四国(水深60~200m,砂礫底)	
1330 <i>Crassispira recurvirostrata</i> Kuroda (MS)	クビマキシャジク
产地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖以西, 四国(水深150~300m,砂泥底)	
1331 <i>Crassispira</i> sp.	ウネダカシャジク(大島1993)
产地:小湊(大島1993)	
1332 <i>Monilispira crassiplicata</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	フトウネシャジク
分布:(水深50~150m,砂底)	
1333 <i>Pilsbryspira alboguttata</i> (Pilsbry, 1904)	シラボシシャジク
产地:小湊(大島1993),銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖・山口県北部以西, 遠州灘, 紀伊半島, 九州(潮間帶下部~水深20m,砂泥底)	
1334 <i>Pilsbryspira kandai</i> (Kuroda, 1950)	カンダイボシシャジク
产地:小湊(大島1993)	
分布:房総半島以西, 紀伊半島, 九州西岸(潮間帶下部~水深30m,砂泥底)	
1335 <i>Compsodrillia (Mammillaedrillia) mammillata</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	チクビモジボラ
产地:小湊(大島1993),銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖以西, 相模湾, 伊豆半島, 遠州灘, 志摩半島沖(水深80~110m,砂細泥底)	
1336 <i>Compsodrillia (Mammillaedrillia) nakamurai</i> Makiyama, 1931	オキナモジボラ
产地:小湊(大島1993)	
分布:銚子沖以西, 相模湾, 遠州灘, 志摩半島(水深50~100m,砂泥底)	
1337 <i>Paradrillia consimilis</i> (E. A. Smith, 1879)	ヒメシャジク
产地:館山湾(横田1929b),天津(清水),小湊(猪野1942c),大原(清水),銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988;鶴岡ら1994)	
分布:三陸沿岸・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深20~150m,砂泥底);燃島(化石)	
1338 <i>Paradrillia patruelis</i> (E. A. Smith, 1875)	オビヒメシャジク
产地:天津,小湊(大島1993),銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988)	
分布:三陸沿岸・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深20~150m,砂泥底)	
1339 <i>Paradrillia inconstans</i> (E. A. Smith, 1875)	イボヒメシャジク
产地:館山湾(横越1990),興津(大島1993),九十九里浜(清水),銚子(渡辺1988;鶴岡ら1994)	
分布:三陸沿岸・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深10~100m,砂泥底)	
1340 <i>Paradrillia nivaloides</i> (Yokoyama, 1920)	ニバヒメシャジク
分布:房総半島以南, 四国, 九州(水深50~100m,砂泥底)	
1341 <i>Micantapex (Parabathytoma) luehdorfi</i> (Lischke, 1872)	シャジク
产地:館山湾(船形:稻葉1963a),銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988)	
分布:銚子沖以南, 遠州灘, 紀伊半島, 土佐沖, 九州西岸(水深50~200m,細砂底)	
1342 <i>Riuguhdrillia engonia</i> (Watson, 1881)	ヤゲンクダマキ
产地:銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;庵間1964;櫻井1964;渡辺1988)	
分布:相模湾以北, 鹿島灘, 三陸沿岸(水深200~1000m,泥底)	
1343 <i>Taranis japonicus</i> Okutani, 1964	
分布:本州東岸沖(水深500~800m)	
1344 <i>Taranis corneus</i> Okutani, 1966	
分布:相模湾, 駿河湾, 北海道恵山沖(水深1,000~1,500m)	
1345 <i>Ophiodermella miyataensis</i> (Yokoyama, 1920)	クリロフタマンジ
タイプ产地:千葉県市原市東及神奈川県三浦市下宮田(化石)	
分布:北海道以南, 三陸沿岸, 能登半島, 対馬(?) (潮間帶下部~水深250m,岩礁)	
1346 <i>Ophiodermella pseudepannus</i> (Yokoyama, 1922)	ポロクチナワマンジ
タイプ产地:千葉県成田市大竹(化石)	
分布:東シナ海, 紀伊半島, 若狭湾(水深100~150m)	
1347 <i>Mitromorpha (Amarithma) dorcas</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	アデヤカシズクニナ
分布:相模湾以南, 四国, 九州, フィリピン(水深50~200m,砂底)	
1348 <i>Etrema (Eremopha) texta</i> (Dunker, 1860)	アミコシボソクチキレ
产地:天津,小湊(猪野1942c)	
分布:三陸沿岸・能登半島以南, 四国, 九州(潮間帶~水深20m,砂礫底)	
1349 <i>Etrema (Eremopha) subauriformis</i> (E. A. Smith, 1879)	ヌノメシャジク
产地:館山湾(村越1998),銚子(Oyama & Takemura, 1959b;鶴岡ら1994)	
分布:三陸沿岸・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深10~100m,砂底)	
1350 <i>Etrema (Eremopha) streptonotus</i> (Pilsbry, 1904)	ホソヌメシャジク
产地:銚子(櫻井1964;渡辺1988)	
分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州(水深10~100m,砂底)	
1351 <i>Cytharopsis cancellata</i> A. Adams, 1865	ワタゾココツヅブ
产地:小湊(大島1993),銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖・日本海見島以南, 四国沖, 九州南西岸沖(水深50~200m,砂底)	
1352 <i>Cytharopsis radulina</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	ヤスリコツヅブ
产地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖, 相模湾, 遠州灘, 志摩半島沖;若狭湾(水深40~100m,砂底)	
1353 <i>Cytharopsis kyushuensis</i> (Shuto, 1965)	オトヒメコツヅブ
产地:銚子(渡辺1988)	
分布:銚子沖以南, 相模湾, 遠州灘沖, 紀伊半島沖;若狭湾(水深100~200m,砂底);燃島(化石)	
1354 <i>Cytharopsis buttonensis</i> (Schepman, 1913)	ツヤコツヅブ

	分布:相模湾,セレベス沖(水深50~100m,砂底)	
1355	<i>Hemicythere octangulata</i> (Dunker, 1860) 産地:館山湾(佐々木1990;奥谷ら89) 分布:房総半島・男鹿半島以南,四国,九州,奄美,沖縄(潮間帯~水深100m,岩礁・砂底)	ハツカククフナシシャジク
1356	<i>Leiocithara longispira</i> (E. A. Smith, 1879) 産地:小湊(大島1993) 分布:三陸沿岸・佐渡島以南,四国,九州西岸(水深5~30m,細砂底)	ヤセシャジク
1357	<i>Lienardia (Lienardia) mighelsi</i> Iredale & Tomlin, 1917 産地:小湊(大島1993),銚子(渡辺1988) 分布:房総半島・佐渡島以南,四国,九州,奄美,沖縄,インド・太平洋(潮間帯~水深20m,砂礫底)	ノシメアラボリクチキレツブ
1358	<i>Lienardia fuscolineolata</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 産地:勝浦(大島1993),銚子(渡辺1988) 分布:銚子沖,相模湾,伊豆半島,伊豆七島(水深20~110m,砂底)	イトマキクチキレツブ
1359	<i>Lienardia piperata</i> (E. A. Smith, 1882) 分布:太平洋岸(35°N)	ヒメモモイロフナシシャジク
1360	<i>Lienardia (Hemlienardia) rubicunda</i> (Gould, 1860 in 1859-61) 産地:小湊(大島1993)	ホソシャジク
1361	<i>Pseudoetrema fortilirata</i> (E. A. Smith, 1879) 産地:銚子(福葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1991) 分布:三陸沿岸・山形県沖以南,四国,九州(水深10~50m,砂底);燃島(化石)	カタカドマンジ
1362	<i>Guraleus deshayesii</i> (Dunker, 1860) 産地:小湊(大島1993) 分布:三陸沿岸・佐渡島以南,四国,九州(水深5~50m,砂底)	スソチヤマンジ
1363	<i>Guraleus semicarinata</i> (Pilsbry, 1904) 分布:房総半島・佐渡島以南,瀬戸内海,四国,九州,奄美,沖縄(水深5~35m,砂底)	カマクラマンジ
1364	<i>Guraleus kamakurana</i> (Pilsbry, 1904) 分布:相模湾・能登半島以南,四国,九州(潮間帯~水深20m,砂底)	ヌノメツブ
1365	<i>Paracalathrella gracilenta</i> (Reeve, 1843) 産地:銚子(櫻井1964;渡辺1988) 分布:銚子沖・能登半島以南,四国,九州,中国,フィリピン,インド洋,ペルシャ湾(水深10~100m,砂礫底);燃島(化石)	ムカドケボリクチキレツブ
1366	<i>Pseudoraphithoma bipyramidata</i> (Hedley, 1922) 分布:相模湾・佐渡島以南,熱帯西太平洋(潮下帶~水深100m,砂底)	キバコツブ
1367	<i>Ithyocythere oyiana</i> (Yokoyama, 1922) タイプ産地:千葉県印旛郡酒々井(化石) 分布:房総半島・能登半島以南,四国,九州西岸(潮間帯~水深20m,砂礫底)	シロヌノメツブ
1368	<i>Venustoma lacunosa</i> (Gould, 1860) 分布:志摩半島・九州北西岸以北,宮城県,佐渡島(水深20~260m,砂底);燃島(化石)	サガミマンジ
1369	<i>Oenopota sagamiana</i> Okutani & Fujikura, 1992 分布:相模湾(水深1,170m,砂泥底,シロウリガイ群集付近)	ウスベニハラブトクダマキ
1370	<i>Obesotoma oyashio</i> Shikama, 1962 タイプ産地:銚子東沖(200~350fins.) 産地:銚子沖(Shikama 1962;福葉1963;鹿間1964;櫻井1964;渡辺1988) 分布:鹿島灘以北,東北(水深400~700m,砂底)	ヨワカドバリフタマンジ
1371	<i>Propebela (Propebela) venusta</i> Okutani, 1964 分布:相模湾,日本海中部(水深200~300m,砂泥底)	ヨコヤマニヨリマンジ
1372	<i>Propebela yokoyamai</i> (Oyama, 1973) タイプ産地:千葉県成田市大竹(化石) 産地:館山湾(肥後・後藤,1993) 分布:館山湾・但馬沖以北,三陸沿岸,北海道(潮間帯~20m,砂泥底)	
1373	<i>Propebela</i> sp. 産地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995)	
1374	<i>Propebela (Turritoma)</i> sp. 産地:沖ノ山(神奈川県博1972)	
1375	<i>Funitoma (Funitoma) dericata</i> Okutani, 1964 分布:三陸沿岸・佐渡島以南,四国,九州(水深5~50m,砂底)	
1376	<i>Lora kazuensis</i> Nomura, 1940 タイプ産地:千葉県太東岬北東沖,水深104m 産地:太東岬北東沖(Nomura 1940) Higo et al.(1999)は <i>Oenopota kazuensis</i> とする	
1377	<i>Lora suganumana</i> Nomura, 1940 タイプ産地:千葉県太東岬東沖,水深130.5m 産地:太東岬東沖(Nomura 1940) Higo et al.(1999)は <i>Horaiclavus (Cytharoclavus) filicintus</i> E. A. Smith, 1882 ヒサゴシャジクの異名とする	
1378	<i>Mangelia subgracilenta</i> Nomura, 1940 タイプ産地:千葉県安房郡千倉町南朝夷から野島崎の沖,水深130~147m 産地:千倉~白浜沖(Nomura 1940) 分布:同	
1379	<i>Pleurotomella virgo</i> Okutani, 1966 分布:本州中部沖(水深1,500m)	
1380	<i>Pleurotomella granulispicata</i> Okutani, 1964 産地:房総半島沖水深507~578m泥底(土田ら1995)	

	分布:本州中部沖(水深710~5,160m)	
1381	<i>Philbertia (Pseudodaphnella) leuckarti</i> (Dunker, 1860)	クリイロマンジ
	産地:竹岡北西水深25.0m(清水),小湊(大島1993)	
	分布:三陸沿岸・男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帶~水深20m, 岩礁・砂礫底)	
1382	<i>Philbertia (Pseudodaphnella) phaedra</i> (Hervier, 1895)	シロコウシツブ
	分布:相模湾以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帶~水深20m, 砂礫底)	
1383	<i>Kermia tokyoensis</i> (Pilsbry, 1895)	トウキョウコウシツブ
	産地:勝浦(大島1993),銚子(渡辺1988)	
	分布:銚子沖・男鹿半島以南, 四国, 九州西岸(潮間帶~水深20m, 砂礫底)	
1384	<i>Kermia bernardi</i> (Brazier, 1876)	チチジマコウシツブ
	分布:房総半島・山口県萩以南, 四国, 九州(潮間帶~水深20m, 砂礫及びサンゴ砂底)	
1385	<i>Veprecula pungens</i> (Gould, 1860)	トゲコウシツブ
	産地:銚子(渡辺1988)	
	分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州, 南シナ海, ベルシャ湾(水深10~140m, 砂底)	
1386	<i>Veprecula arethusa</i> (Dall, 1918)	ハリコウシツブ
	分布:相模湾・能登半島以南, 四国, 九州, ベルシャ湾(水深50~140m, 砂底)	
1387	<i>Veprecula gracilispira</i> (E. A. Smith, 1879)	ナガトゲコウシツブ
	産地:館山湾(村越1998),小湊(大島1993)	
	分布:相模湾・能登半島以南, 四国, 九州西岸(水深30~130m, 砂底)	
1388	<i>Clathromangelia coffeea</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	チャイロコウシツブ
	産地:銚子(渡辺1988)	
	分布:相模湾・若狭湾;若狭湾	
1389	<i>Asperdaphne peradmirabilis</i> (E. A. Smith, 1879)	ムラクモフタナシシャジク
	分布:相模湾・能登半島以南, 四国, 九州, 朝鮮南部(水深20~90m, 砂泥底)	
1390	<i>Asperdaphne reticostulata</i> (Yokoyama, 1922)	
	タイプ産地:千葉県市原市東(化石)	
1391	<i>Kuroshiodaphne fuscobalteata</i> (E. A. Smith, 1879)	ツクシフタナシシャジク
	産地:銚子(櫻井1961;渡辺1988)	
	分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 九州北西岸, 有明海(水深10~100m, 砂底);燃島(化石)	
1392	<i>Kuroshiodaphne subula</i> (Reeve, 1845)	カスリマンジ
	分布:房総半島・佐渡島以南, 四国, 九州, フィリピン, ニューカレドニア(水深10~50m, 砂底)	
1393	<i>Kuroshiodaphne saturata</i> (Reeve, 1845)	カワリボリフデシャジク
	産地:安房郡(神奈川県博1972),勝浦(大島1993)	
	分布:相模湾以南, 四国, 九州フィリピン, ニューカレドニア(水深10~50m, 砂底)	
1394	<i>Eubela nipponica</i> Kuroda, 1938	ネグケシャジク
	分布:相模湾以西, 遠州灘, 志摩半島沖, 土佐沖(水深300~400m, 岩礁底)	
1395	<i>Nepotilla nezi</i> (Okutani, 1964)	
	分布:鹿島灘以北, 東北地方沖(水深800~900m)	
1396	<i>Daphnella ornata</i> Hinds, 1844	フイリフデシャジク
	産地:館山湾(堀越1990)	
	分布:房総半島以南, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帶~水深20m, 砂泥底)	
1397	<i>Daphnella paucivaricosa</i> Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	ホソウネフデシャジクガイ
	分布:相模湾(水深68m, 砂底)	
1398	<i>Daphnella pilosbryi</i> Kuroda, 1947	フデシャジク
	産地:館山湾(村越1998),小湊(大島1993),銚子(福葉1963;渡辺1988)	
	分布:銚子沖・若狭湾以南, 四国, 九州北西岸(潮間帶~水深50m, 砂泥底)	
1399	<i>Daphnella mitrellaformis</i> (Nomura, 1940)	スイヒツシャジク
	タイプ産地:房総半島鶴原沖(水深130~177m)	
	産地:鶴原沖(Nomura 1940)	
	分布:房総半島以南, 四国, 九州西岸, 台湾(水深100~200m, 砂底)	
1400	<i>Phymorhynchus buccinoides</i> Okutani, Fujikura & Sasaki, 1993	ツブナリシャジク
	分布:相模湾(水深1,000m)	
1401	<i>Pontiothauina viridis</i> (Okutani, 1966)	
	産地:相模湾(34° 56.8' N, 139° 27.0' E, 水深1,470~1,500m)	
	Family Terebridae	タケノコガイ科
1402	<i>Hastula rufopunctata</i> (E. A. Smith, 1877)	シチクガイ
	産地:竹岡, 萩生, 勝山, 富山, 富浦(清水), 館山湾(福井市博1962;田村1987;佐々木1989;堀越1990;村越1998;奥谷ら*;清水), 沖ノ島(お茶大館山1973), 布良, 白浜, 千倉, 太海(清水), 鶴川, 天津(猪野1942c;大島1993;清水), 小湊(猪野1942c;清水), 安房(岩川1900;平瀬1917), 勝浦, 御宿(大島1993;清水), 九十九里浜(大山1961;清水), 銚子(福葉1963;渡辺1988;鶴岡ら1994)	
	分布:九十九里浜・能登半島以南, 四国, 九州, オーストラリア西部, 南アフリカ(潮間帶~水深10m, 砂底)	
1403	<i>Hastulina albula</i> (Menke, 1843)	ミガキタケ
	産地:館山湾(堀越1990)	
	分布:房総半島以南, 奄美, 沖縄, 熱帯インド・太平洋, 紅海, メキシコ(潮間帶~水深116m, 砂底)	
1404	<i>Duplicaria kirai</i> (Oyama, 1961)	キラトクサ
	産地:小湊(大島1993)	
	分布:相模湾以南, 四国, 九州(水深60~150m, 砂底)	
1405	<i>Duplicaria evoluta</i> (Deshayes, 1859)	イワカワトクサ
	産地:銚子(渡辺1988)	

	分布:茨城県・山形県(吹浦)以南, 四国, 九州, (水深10~50m, 砂底)	
1406	<i>Duplicaria badia</i> (Pilsbry, 1921)	トクサガイ
	産地:竹岡(清水),館山湾(藤田1929b;村越1998),鶴川湾(清水),鶴川,小湊(猪野1942c;大島1993),銚子(渡辺1988;鶴岡ら1994)	
	分布:房総半島;駿河湾以南, 九州, 五島(潮間帯~水深50m, 砂底)	
1407	<i>Duplicaria recticostata</i> (Yokoyama, 1920)	スグウェトクサ
	産地:鶴川,小湊(大島1993),銚子(神奈川県博1972;渡辺1988)	
	分布:銚子沖・山口県北方沖以南, 遠州灘, 九州(水深20~100m, 細砂泥底)	
1408	<i>Duplicaria? latisulcata</i> (Yokoyama, 1922)	ヒロウネトクサ
	タイプ産地:千葉県市原市市東(化石)	
	産地:銚子(渡辺1988)	
	分布:銚子沖以南, 遠州灘(水深5~40m, 砂底)	
1409	<i>Hastulopsis melanacme</i> (E. A. Smith, 1875)	シラネタケ
	産地:天津(大島1993),銚子(櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988)	
	分布:房総半島・山形県(湯ノ浜)以南, 四国, 九州(水深20~50m, 砂底)	
1410	<i>Hastulopsis gotoensis</i> (E. A. Smith, 1879)	ゴトウタケ
	産地:銚子(渡辺1988)	
	分布:銚子沖・山口県(北部)以南, 四国, 九州(潮間帯~水深10m, 砂底)	
1411	<i>Pristiterebra bifrons</i> (Hinds, 1843)	オオコゲチャタケ
	産地:館山湾(肥後・後藤1993),天津,小湊,勝浦(大島1993)	
	分布:千葉県館山, 愛知県沖, 高知県沖, 宮崎県沖(水深20m, 砂礫底)	
1412	<i>Pristiterebra tsuboiiana</i> (Yokoyama, 1922)	コグチャタケ
	タイプ産地:千葉県印旛郡木下, 同成田市大竹(化石)	
	産地:竹岡, 萩生, 館山湾(清水), 小湊(猪野1942c;大島1993),九十九里浜(清水), 銚子(Oyama & Takemura, 1961;鹿股ら1962;稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988;鶴岡ら1994)	
	分布:仙台付近(七ヶ浜, 塩釜)以南, 銚子沖, 相模湾, 駿河湾(潮間帯下部~水深20m, 砂底)	
1413	<i>Pristiterebra pustulosa</i> (E. A. Smith, 1879)	ホソコゲチャタケ
	産地:館山湾(村越1998),小湊(大島1993-ヒメコゲチャタケ, <i>P. chibana</i>),銚子(櫻井1964;神奈川県博1972;渡辺1988)	
	分布:宮城県塩竈沖以南, 高知県, 宮崎県沖(潮間帯下部~水深50m, 砂底)	
1414	<i>Pristiterebra cocana</i> Oyama, 1961	ココアタケ
	タイプ産地:千葉県上総層, 成田層(化石)	
	産地:銚子沖(肥後・後藤1993)	
	分布:銚子沖, 愛知県沖(水深90~100m, 砂底)	
1415	<i>Pristiterebra? suavidica</i> (Yokoyama, 1922)	ムサシノヒメタケ
	タイプ産地:千葉県印旛郡酒々井(化石)	
	分布:伊豆半島以南, 遠州灘, 四国(高知県沖)(水深20~50m, 砂底)	
1416	<i>Laeviacus?</i> sp.	モンナシシチク
	産地:房州(平瀬1917),房総半島(Oyama & Takemura, 1961)	
1417	<i>Strioterebrum loebbeckeana</i> (Dunker, 1882)	レベックタケ
	産地:天津,小湊(猪野1942c)	
	分布:房総半島;紀伊半島・山口県北部以南, 潛戸内海, 九州(水深10~30m, 砂底)	
1418	<i>Strioterebrum subtextilis</i> (E. A. Smith, 1879)	シラタケ
	産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*),安房(高井市博1962),勝浦(大島1993)	
	分布:相模湾以南, 高知県柏島, 山口県(潜戸内海), 九州(富岡)(水深10~30m, 砂底)	
1419	<i>Strioterebrum textilis</i> (Hinds, 1844)	ヒメクサモドキ
	分布:相模湾以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 热带太平洋(潮下部~水深30m, 砂底)	
1420	<i>Cinguloterebra jeffreysii</i> (E. A. Smith, 1879)	ツクシタケ
	産地:館山湾(堀越1990;村越1998),天津,勝浦(大島1993),銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;渡辺1988;鶴岡ら1994)	
	分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深5~100m, 砂底)	
1421	<i>Cinguloterebra adamsii</i> (E. A. Smith, 1873)	シロコニクタケ
	産地:館山湾(田村1987;堀越1990;奥谷ら*),小湊(猪野1942c),勝浦,御宿(大島1993),銚子(渡辺1988)	
	分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, フィリピン(水深50~100m, 細砂底)	
1422	<i>Cinguloterebra quadriarata</i> (Yokoyama, 1922)	アザラシタケ
	タイプ式産地:千葉県市原市市東(化石)	
	産地:館山(神奈川県博1972),銚子(稻葉1963;櫻井1964;渡辺1988)	
	分布:銚子沖以南, 四国, 九州西岸(水深5~20m, 砂底)	
1423	<i>Cinguloterebra fenestrata</i> (Hinds, 1844)	ヤスリギリ
	産地:館山湾(田村1987;奥谷ら*)	
	分布:房総半島・若狭湾以南, 四国, 九州, フィリピン, フィジー諸島(潮間帯下部~70m, 砂底)	
1424	<i>Cinguloterebra stearnsii</i> (Pilsbry, 1891)	オオギリ
	産地:白浜(清水)	
	分布:紀伊半島以南, 四国, 東シナ海(水深100~200m, 砂底)	
1425	<i>Cinguloterebra jeffreystii</i> (E. A. Smith, 1879)	ツクシタケ
	産地:館山湾(堀越1990;村越1998),天津,勝浦(大島1993),銚子(鹿股ら1962;稻葉1963;渡辺1988;鶴岡ら1994)	
	分布:房総半島・男鹿半島以南, 四国, 九州(水深5~100m, 砂底)	
1426	<i>Cinguloterebra serotina</i> (Adams & Reeve, 1850)	ヒメキリガイ
	産地:小湊,勝浦(大島1993),銚子(渡辺1988)	
	分布:銚子沖以南, 四国, 九州西岸, 東シナ海, 台湾(水深20~100m, 砂底)	
1427	<i>Cinguloterebra</i> sp.	チマキタケ

1428	<i>Decorihastula undulata</i> (Gray, 1834)	コシゴウトクサ
	産地:小湊(大島1993)	
	分布:紀伊半島以南, 四国, 九州(水深5~100m, 砂底)	
1429	<i>Decorihastula nebulosa</i> (Sowerby I, 1825)	シユマグラギリ
	産地:館山湾(堀越1990;奥谷ら*, 鶴原(清水))	
	分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 热帶印度・太平洋(潮間帶~水深165m, 砂底)	
1430	<i>Terebra subulata</i> (Linnaeus, 1767)	タケノコガイ
	産地:勝山(田中ら1974)	
	分布:潮岬以南, 九州, 奄美, 沖縄, 热帶印度・太平洋(潮間帶~水深20m, 砂底)	
1431	<i>Dimidacus laevigata</i> (Gray, 1834)	ホソニクタケ
	産地:館山湾(堀越1990)	
	分布:房総半島以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(潮間帶~水深20m, 砂底)	
1432	<i>Dimidacus amanda</i> (Hinds, 1844)	コニクタケ
	産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(堀越1990), 鶴川, 天津(大島1993)	
	分布:相模湾・若狭湾以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄, 热帶印度・太平洋(潮間帶下部~水深30m, 砂底)	
1433	<i>Brevimyurella japonica</i> (E. A. Smith, 1873)	ヒメクサ
	産地:館山湾(田村1987;堀越1990;奥谷ら*, 鈴子(櫻井1964;渡辺1988))	
	分布:茨城県・秋田県以南, 四国, 九州, 濱戸内海, 稚子島(潮間帶~水深50m, 砂底)	
1434	<i>Brevimyurella awajiensis</i> (Pilsbry, 1904)	アワジタケ
	産地:館山湾(堀越1990), 鶴川(大島1993), 鈴子(櫻井1964;渡辺1988)	
	分布:房総半島・山形県以南, 濱戸内海(水深10~20m, 砂底)	
1435	<i>Granuliterebra bathyraphe</i> (E. A. Smith, 1875)	イボヒメトクサ
	タイプ产地:東京湾	
	産地:東京湾(Smith 1875; 平瀬1917), 鈴子(櫻井1964; 渡辺1988)	
	分布:茨城県・男鹿半島以南, 濱戸内海, 九州, アラビア海, ベルシャ湾, 北オーストラリア(水深12~100m, 砂底)	
1436	<i>Granuliterebra tricincta</i> (E. A. Smith, 1877)	トクナガイボヒメトクサ
	産地:鈴子(=tokunaga:Oyama & Takemura, 1961; 櫻井1964; 渡辺1988)	
	分布:鈴子沖以南, ベルシャ湾, 北オーストラリア(水深10~50m, 細砂泥底)	
1437	<i>Clathroterebra fortunei</i> (Deshayes, 1857)	ヒメヌノメギリ
	産地:鶴川, 小湊(大島1993)	
	分布:房総半島以南, 四国, 九州, 中国, フィリピン(潮間帶~水深200m, 砂底)	
1438	<i>Triplostephanus pretiosa</i> (Reeve, 1842)	フトギリ
	産地:富浦(大島1993), 天津(清水), 太東崎沖(渡辺1970), 鈴子(渡辺1988)	
	分布:鈴子沖以南, 四国, 九州西岸, 東シナ海, フィリピン(水深100~200m, 砂底)	
1439	<i>Triplostephanus lima</i> (Deshayes, 1857)	ヒメフトギリ
	産地:鶴川, 天津, 小湊, 浜行川(大島1993), 鈴子(渡辺1988)	
	分布:相模湾・若狭湾以南, 四国, 九州, 東シナ海, インド・太平洋(水深35~350m, 砂底)	
1440	<i>Triplostephanus triseriata</i> (Gray, 1834)	キリガイ
	産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(田村1987; 奥谷ら*, 鶴川(大島1993), 天津(清水), 小湊(猪野1942c), 鈴子(渡辺1988))	
	分布:鈴子沖以南, 四国, 九州西岸, 奄美, 沖縄, オーストラリア(潮間帶~水深150m, 砂底)	
	[Superorder Heterobranchia]	[異鰓上目]
	Order Heterostropha	異旋目
	Superfamily Valvatoidea	ミズシタダミ上科
	Family Cimidae	キマツボ科
1441	<i>Graphis infans</i> (Laseron, 1951)	キリツボ
	分布:相模湾以南, 热帶西太平洋(潮下帶~水深100m, 海藻上, 転石下)	
	Family Orbitestellidae	
1442	<i>Orbitestella bermudezi</i> (Aguayo & Borro, 1946)	ミジンハグルマガイ科
	産地:房総半島(長谷川 In 奥谷2000)	ヨワミジンハグルマガイ
	分布:房総半島・能登半島以南, 热帶印度・西太平洋から西インド諸島まで(潮下帶, 海藻上, 転石下)	
	Superfamily Architectonoidea	クルマガイ上科
	Family Mathildidae	タクミニナ科
1443	<i>Turritellopsis subvenustellus</i> (Okutani, 1964)	サガミヒメニナ
	分布:相模湾(水深700m, 砂泥底)	
1444	<i>Mathilda sinensis</i> (Fischer, 1867)	タクミニナ
	分布:房総半島・但馬沖以南, 四国, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帶~水深300m, 内湾の砂底)	
1445	<i>Mathilda cancellata</i> Kuroda, 1958	ウスギヌタクミニナ
	産地:鈴子(渡辺1988)	
	分布:鈴子沖, 相模湾~四国(土佐沖); 若狭湾(水深100~200m, 砂底)	
1446	<i>Mathilda cerea</i> Kuroda, 1958	ロウイロタクミニナ
	分布:房総半島沖以南, 遠州灘, 四国(水深100~300m, 砂底)	
1447	<i>Mathilda gemmifera</i> Kuroda, 1958	アラレロウイロタクミニナ
	分布:房総半島沖以南, 遠州灘, 土佐沖(水深50~200m, 砂底)	
1448	<i>Mathilda scalaris</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	イトカケタクミニナ
	産地:鈴子(渡辺1988)	
1449	<i>Mathilda amanda</i> Thiele, 1925	オオタクミニナ

産地:勝浦(大島1993)	
分布:相模湾以南, 九州西岸(水深20~50m, 砂底)	
1450 <i>Mathilda sagamiensis</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	ジュズカケタクミニナ
分布:相模湾(水深50~150m, 砂底)	
Family Architectonidae	クルマガイ科
1451 <i>Architectonica perspectiva</i> (Linnaeus, 1758)	クロスジグルマ
産地:保田, 勝山(清水), 館山湾(佐々木1990; 村越1998; 奥谷ら*), 錫子(鹿股ら1962)	
分布:房総半島以南, 奄美, 沖縄, インド・太平洋(水深20~60m, 砂底)	
1452 <i>Architectonica trochlearis</i> (Hinds, 1844)	クルマガイ
産地:館山湾(田村1987; 堀越1990; 佐々木1990; 奥谷ら*), 天津, 小湊(大島1993), 安房(岩川1900), 錫子(渡辺1988)	
分布:房総半島・見島以南, 四国, 九州, インド・太平洋(水深30~60m, 砂底)	
1453 <i>Architectonica maxima</i> (Philippi, 1849)	マキミシグルマ
産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(佐々木1989; 奥谷ら*), 天津(猪野1942b; 大島1993), 小湊(猪野1942b), 安房(鷹井市博1962), 錫子(福葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)	
分布:房総半島・見島以南, 四国, 九州, インド・太平洋(水深10~50m, 砂底)	
1454 <i>Architectonica reevei</i> (Hanley, 1862)	アデヤカグルマ
産地:錫子(福葉1963; 櫻井1964; 渡辺1988)	
分布:錫子沖以南, 相模湾, 紀伊半島沖, 土佐沖(水深100~200m, 砂底)	
1455 <i>Architectonica kuroharai</i> (Kuroda & Habe in Habe, 1961)	ハナガサグルマ
産地:錫子(渡辺1988)	
分布:房総半島以南, 紀伊半島沖, 四国(水深100~150m, 砂底)	
1456 <i>Architectonica yokoyamai</i> Oyama in Taki & Oyama, 1954	
タイプ産地:千葉県市原市市東(化石)	
分布:詳細不明(水深100~250m, 砂底)	
1457 <i>Philippia japonica</i> (Pilsbry & Steans in Pilsbry, 1895)	ヤツコグルマ
分布:房総半島以南, 四国(土佐沖)(水深10~30m, 砂底)	
1458 <i>Psilaxis radiata</i> (Röding, 1798)	コグルマ
産地:館山湾(佐々木1990; 村越1998; 奥谷ら*), 布良, 白浜(清水), 錫子(渡辺1988)	
分布:房総半島・男鹿半島以南, 奄美, 沖縄, 热带太平洋(水深10~30m, 砂底)	
1459 <i>Psilaxis oxytropis</i> (A. Adams, 1855)	スダレグルマ
産地:館山湾(田村1987; 奥谷ら*)	
分布:相模湾以南, 四国, 九州(水深50~200m, 砂底)	
1460 <i>Discotectonica acutissima</i> (Sowerby III, 1914)	ウスバグルマ
産地:鶴川(大島1993), 小湊(清水), 錫子(福葉1963; 渡辺1988)	
分布:房総半島・山口県北部以南, 四国, 九州, 热带西太平洋(水深50~200m, 砂礫底)	
1461 <i>Discotectonica nipponicus</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	チリメングルマ
産地:錫子(渡辺1988)	
分布:錫子沖, 相模湾(水深50~200m, 砂底)	
1462 <i>Glanosolarium asperus</i> (Hinds, 1844)	チヂミナワメグルマ
産地:錫子(渡辺1988)	
分布:錫子沖・若狭湾以南, 四国(南部), インドネシア(水深40~120m, 砂底)	
1463 <i>Glanosolarium elegantissima</i> (Kuroda & Habe in Habe, 1961)	ウスバナワメグルマ
分布:相模湾以南, 遠州灘, 紀伊半島沖, 土佐沖(水深100~300m砂底)	
1464 <i>Heliacus (Heliacus) variegatus</i> (Gmelin, 1791)	ヒクナワメグルマ
産地:館山湾(田村1987; 奥谷ら*), 布良, 白浜(清水), 小湊(大島1993)	
分布:房総半島以南, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~水深20m, 砂底)	
1465 <i>Heliacus (Torinista) implexus</i> (Mighels, 1845)	クリロナワメグルマ
分布:房総半島以南, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~水深20m, 砂底)	
1466 <i>Heliacus (Torinista) enoshimensis</i> (Melvill, 1891)	ナワメグルマ
産地:竹岡, 萩生(清水), 館山湾(田村1987; 堀越1990; 奥谷ら*), 錫子(渡辺1988)	
分布:房総半島, 男鹿半島以南, 四国, 九州(潮間帯~水深100m, 砂底) 八放サンゴの一種に外部寄生	
1467 <i>Heliacus (Torinista) infundibuliformis</i> (Gmelin, 1791)	ヒラマキナワメグルマ
分布:相模湾以南, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~水深20m, 砂底)	
1468 <i>Heliacus (Torinista) fenestratus</i> (Hinds, 1844)	ヒロベソナワメグルマ
産地:錫子(渡辺1988)	
分布:錫子沖以南, 九州, 奄美, 沖縄(潮間帯~水深20m, 砂底)	
1469 <i>Heliacus (Torinista) granulata</i> Habe, 1961	トグロナワメグルマ
分布:相模湾以南, 四国(土佐沖)(水深10~50m, 砂底)	
1470 <i>Heliacus (Torinista)? elegantula</i> (Yokoyama, 1922)	ヒグルマガイ
タイプ産地:千葉県市原市市東(化石)	
分布:錫子沖(?)	
1471 <i>Pseudomalaxis zonclaeus meridionalis</i> (Hedley, 1903)	シカクウズマキグルマ
産地:館山湾(田村1987; 奥谷ら*), 錫子(渡辺1988)	
分布:錫子沖・相模湾以南, 遠州灘, 熊野灘(水深50~200m, 砂礫底)	
1472 <i>Spirolaxis rotulacathartinea</i> (Melvill & Standen, 1903)	ガラスツボ上科
分布:房総半島・能登半島以南, 热带インド・西太平洋(水深150~300m, 砂底)	
Superfamily Rissoelloidea	ガラスツボ科
Family Rissoellidae	

1473	<i>Rissoella</i> sp.		ガラスツボ
	分布:北海道から九州(潮間帯, 海藻上)		
	Superfamily Omalogyroidea		ミジンワダチガイ上科
	Family Omalogyridae		ミジンワダチガイ科
1474	<i>Ammonicera japonica</i> Habe, 1972		ミジンワダチガイ
	分布:北海道北部以南, 热帶印度・西太平洋(潮間帯から潮下带, 転石下, 海藻の間)		
1475	<i>Omalogyra atomus</i> (Philippi, 1841)		スペリワダチガイ
	分布:房総半島, 日本海西部, 北半球の温帶域に広く分布(潮間帯下部, 海藻の上)		トウガタガイ上科
	Superfamily Pyramidelloidea		トウガタガイ科
	Family Pyramidellidae		トウガタガイ
1476	<i>Pyramidella dolabrata</i> (Linnaeus, 1758)		
	産地:館山湾(奥谷ら*)		
1477	<i>Leucotuna adamsi</i> Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971		シロヒメゴウナ
	産地:館山湾(奥谷ら*)		
1478	<i>Longchaeus teres</i> (A. Adams in H. & A. Adams, 1853)		カズマキクチキレ
	産地:銚子(稻葉1963)		
	分布:房総半島・九州以南, 四国, 奄美, 沖縄, 热帶印度・西太平洋(潮間帯～水深10m, 砂底)		
1479	<i>Longchaeus canaliculata</i> (Sowerby II, 1873)		マキミンクチキレ
	産地:竹岡, 萩生(清水)		
	分布:房総半島・九州以南, 奄美, 沖縄, 热帶太平洋(潮間帯～水深10m, 砂底)		
1480	<i>Milda ventricosa</i> (Guérin, 1830)		オオシイノミクチケレ
	分布:房総半島以南, 热帶西太平洋(潮間帯～水深20m, 砂底)		
1481	<i>Tiberia pusilla</i> (A. Adams in H. & A. Adams, 1853)		クチヒダクチキレ
	分布:房総半島・能登半島以南, 四国, 濱戸内海, 九州, フィリピン(潮間帯～水深30m, 砂泥底)		
1482	<i>Tiberia trifasciata</i> (A. Adams, 1863)		ミスジクチキレ
	分布:三浦半島, 紀伊半島, 濱戸内海西部		
1483	<i>Tiberia nitidula</i> (A. Adams, 1860)		ツヤクチキレ
	分布:房総半島・見島以南, 四国, 九州(潮間帯～水深20m, 砂泥地)		
1484	<i>Tiberia balteata</i> (A. Adams, 1854)		
	分布:太平洋側(33°～35° N)		
1485	<i>Orinella pulchella</i> (A. Adams in H. & A. Adams, 1853)		クチキレガイ
	産地:盤洲沖(飯島ら1999), 竹岡, 萩生(清水), 小湊(猪野1942b), 勝浦(大島1993), 銚子(稻葉1963; 櫻井1964; 宇野ら1965; 神奈川県博1972; 渡辺1988)		
	分布:陸奥湾, 男鹿半島以南, 九州南部までの日本全国(潮間帯下部～水深30m)		
1486	<i>Orinella dunkeri</i> (Dall & Bartsch, 1906)		ドウンケルクチキレ
	産地:銚子(渡辺1988)		
	分布:三陸沿岸, 能登半島以南, 四国, 濱戸内海, 九州(潮間帯～水深49m, 内湾の砂泥底)		
1487	<i>Orinella ebarana</i> (Yokoyama, 1927)		エバラクチキレ
	産地:銚子(渡辺1988)		
	分布:三陸沿岸, 房総半島, 志摩半島, 濱戸内海, 四国, 九州(水深10～50m, 砂泥底)		
1488	<i>Orinella eburnea</i> (A. Adams, 1860)		
	分布:房総半島以南, 四国, 九州(潮間帯～水深30m, 砂底)		
1489	<i>Stylopygma taeniatum</i> A. Adams, 1863a		スジイリクリムシクチキレ
	タイプ産地:千葉県館山湾内麿ノ島		
	産地:館山湾(麿ノ島:A. Adams, 1863; 奥谷ら*)		
	分布:房総半島・但馬沖以南, 紀伊, 濱戸内, 四国, 九州(潮間帯～水深30m, 砂泥底)		
1490	<i>Stylopygma cerea</i> (A. Adams, 1863)		
	分布:太平洋側(34°～35° N), 日本海(36° N)		
1491	<i>Mormula philippiana</i> (Dunker, 1860)		チョウジガイ
	産地:館山湾(奥谷ら*), 布良, 白浜(清水), 小湊(猪野1942b), 勝浦(大島1993)		
	分布:房総半島・男鹿半島以南, 濱戸内海, 四国, 九州, 沖縄(潮間帯～水深20m, 砂礫地)		
1492	<i>Tropaea castaneus</i> (A. Adams, 1863)		クリイロヒダクチキレ
	分布:房総半島・但馬沖以南, 志摩半島, 四国, 玄界灘, 九州(潮間帯～水深20m, 砂泥底)		
1493	<i>Cossmannica aciculata</i> (A. Adams in H. & A. Adams, 1853)		クリクリクチキレ
	分布:房総半島以南, 四国, 九州(潮間帯～水深30m, 砂底)		
1494	<i>Colsynola brunnea</i> (A. Adams in H. & A. Adams, 1853)		チャイロクチキレ
	産地:館山湾(佐々木1989; 堀越1990; 奥谷ら*; 村越1998), 布良, 白浜(清水), 勝浦(大島1993), 銚子(宇野ら1965; 渡辺1988)		
	分布:房総半島・男鹿半島以南, 濱戸内海, 四国, 九州(北西岸)(水深5～30m, 砂泥底)		
1495	<i>Colsynola ornata</i> (Gould, 1861)		キザミメクチキレ
	産地:銚子(渡辺1988)		
	分布:銚子沖・山口県北部以南, 四国, 九州, 東シナ海, 南シナ海(水深20～200m, 細砂底)		
1496	<i>Syrnola cinctella</i> A. Adams, 1860		ホソクチキレ
	産地:木更津沖(嵐呂田1983), 勝浦(大島1993), 銚子(渡辺1988)		
	分布:三陸沿岸・男鹿半島以南, 濱戸内海, 四国, 九州(水深10～90m, 砂泥底)		
1497	<i>Syrnola subcinctella</i> Nomura, 1936		コホソクチキレ
	産地:銚子(櫻井1964; 渡辺1988)		
	分布:三陸沿岸(大槌湾, 気仙群島/浦)・若狭湾以南, 濱戸内海, 四国, 九州(水深10～140m, 砂泥底)		
1498	<i>Syrnola subulina</i> A. Adams, 1863		ナガホソクチキレ
	分布:相模湾(江ノ島)以南, 四国, 九州, (潮間帯～水深30m, 砂泥底)		