

# ビワ生育情報

第 3 報  
千葉県農林水産部  
令和元年 12 月号

本年の開花は、8月以降の高温の影響により出蕾が遅れ、11月も高温で推移したため、開花始期は3品種とも平年よりも遅くなっている。

## 令和元年11月の気象

令和元年11月の半旬別の気象を表1に示した。平均気温は第3～第5半旬は平年よりも高く推移し、第6半旬は平年よりも低く推移した。月平均気温は13.7℃で、平年より0.5℃、前年より0.3℃低かった。

降水量は第3～第6半旬は平年よりも多く、特に、第5半旬は158mmと平年の一か月分の雨が降った。月合計は252mmで平年の170%、昨年156%であった。

日照時間は第1～第4半旬は平年よりも多く、第5、第6半旬は平年よりも少なかった。月合計は142時間で平年の98%、前年の105%であった。

表1 令和元年11月の気象(暖地園芸研究所)

半旬	平均気温 (°C)			降水量 (mm)			日照時間 (hr)		
	本年	平年	前年	本年	平年	前年	本年	平年	前年
1	15.5	15.4	14.5	0	25	33	35	25	17
2	14.8	14.6	17.6	0	34	13	33	25	14
3	15.4	14.0	14.1	33	18	24	27	24	26
4	14.7	12.3	12.9	34	23	5	36	24	21
5	14.1	11.7	10.9	158	22	71	12	24	27
6	7.8	11.2	13.7	28	26	16	0	25	30
平均/計	13.7	13.2	14.0	252	148	162	142	145	135

## 1月の作業(花房の発育は次ページ)

ビワは、厳寒期に入ると枝葉の伸長及び根の活動は停滞するが、開花は引き続き進行し、幼果はわずかながら肥大する。本年は、開花の進みが平年より遅く、寒害を受けにくいと考えられるが、寒害には十分注意する。1月は春からの本格的な果実肥大に備える追肥時期である。

### 苗木の植え付け

ビワの苗木の植え付けは、発芽直前で根の活動が緩慢な時期が良く、通常は2月中下旬が適期であるので、早めに準備しておく。枝や根の伸長が始まってからでは、植え傷みが激しく、発芽が遅れるので、天候や苗の発育をみて時期を逃さないようにする。

### 寒害対策

ビワの幼果は、-3℃以下の低温に遭遇すると、胚(種子)が凍死し、生育が止まり落果してしまう。蕾あるいは開花中の花は寒害を受けにくいですが、受精後は幼果の発育が進むにつれて凍死しやすくなる。本年の開花の進みは平年より遅いため(表3)、寒害を受けにくいと考えられる。

ビワの寒害は大陸性高気圧のもたらす寒波によって引き起こされる。本格的な寒波は1月中旬から3月上旬の間に数回襲来する。年内に準備する寒害対策としては、燃焼法、送風法、被覆法、耕種的方法がある。燃焼法は、園内をヒーターで加温して寒害を防止する方法である。送風法は、防霜ファンを設置することで、逆転層内の上方の暖かい空気と樹冠面付近の冷たい空気をかくはんし、気温を均等にする効果がある。燃焼

法、送風法ともに、寒波が襲来する前に設置場所の整備と機器の点検等の準備をしておく。被覆法は、こも等の被覆資材で樹体を覆う方法であり、樹高の高い成木では難しいが、若木、幼木では利用可能である。耕種的方法は、樹体管理が基本であり、樹勢が旺盛になると着葉数が多くなることから、樹冠内の保温効果が増す。年間を通じて、施肥、病虫害防除及び樹体管理を適切に行う。また、冷気の停滞を防ぐため、防風林の下枝は事前に刈り込んでおく。

## 施肥

時期別の標準施肥量は表2に示した。果実の肥大及び春枝の発芽、伸長のための追肥は、春肥または実肥と呼ばれ、1月中に施用する。ビワの根は冬期もわずかながら伸長しており、2月下旬には活発になる。春肥はこの時期に合わせて施すのが一般的で、年間施肥量の30%程度を目安に施用する。土壌pHが低い場合には、苦土石灰などの石灰資材を施用し、pH6.0～6.5に矯正する。

表2 ビワの時期別標準施肥量(成分量 kg/10a)

時 期	耕土の浅い園			耕土の深い園		
	窒素	りん酸	加里	窒素	りん酸	加里
9月上旬(基肥)	12	9	9	11	9	7
1月中旬(春肥)	10	9	5	7	8	3
6月上旬(夏肥)	5	4	4	5	3	3
合 計	27	22	18	23	20	13

(千葉県主要農作物等施肥基準より)

### 管理上の留意事項

1. 土壌pHは6.0～6.5に矯正する。
2. 苦土石灰は、化学肥料施用の2週間前に施用し、その後耕うんする。
3. 施肥後は軽く耕うんする。ただし、夏肥施用後は、その必要はない。
4. 有機物は積極的に投入する。有機物の深層施用には必ず完熟堆肥を用いる。

## 樹及び花房の発育

ビワの開花期は表3に示した。

暖地園芸研究所の開花始期は、「楠」が11月25日で、平年より17日、前年より24日遅かった。「大房」は12月1日時点で開花は始まっているものの開花始期に至っていない。「田中」は11月25日で、平年より13日、前年より20日遅かった。

花房の出蕾は平年より遅く、11月は平均気温が高い状態で推移したため、開花の進みは平年より遅い。樹及び花房の生育は良い。

表3 ビワの開花期(暖地園芸研究所)

品 種	開花始期(月.日)			開花盛期(月.日)			開花終期(月.日)		
	本年	平年	前年	本年	平年	前年	本年	平年	前年
楠	11.25	11.8	11.1	—	11.26	11.19	—	12.24	12.8
大房	—	11.24	11.17	—	12.18	12.3	—	1.27	12.29
田中	11.25	11.12	11.5	—	12.3	11.19	—	1.7	12.11

平年：1989年～2018年の30年間の平均

なお、表の数値は、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

【問合せ先:千葉県農林総合研究センター 暖地園芸研究所 特産果樹研究室 電話 0470-22-2961】

※果樹の生育情報は「ちばの農林水産業」の「生育情報」でも御覧いただけます。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/seisan/seiiku/index.html>