

5 千葉県の外来生物 平成 24（2012）年度版

シダ植物		イワヒバ科		国RDB:VU	影響度	緊急度
1	イヌカタヒバ		<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron.		D	C

【原産】中国～東南アジア 【国内分布】石垣,西表(園芸逸出) 【県内分布】分布度b 北部, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草
 【繁殖】孢子:風散:夏 【国内侵入】161:大正 【県内侵入】161:大正 【影響】- 【緊急】侵入性は低い 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109 【文献県内】39

シダ植物		イワヒバ科			影響度	緊急度
2	コンテリクラマゴケ		<i>Selaginella uncinata</i> (Desv.) Spring		D	C

【原産】中国南部 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 各地で栽培,西船橋駅構内, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草
 【繁殖】孢子,匍匐枝で栄養繁殖:風散:夏 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:明治 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】ヨーロッパ経由で観賞用に導入 【文献全般】60,109,285,311,165,349 【文献県内】39

シダ植物		イノモトソウ科			影響度	緊急度
3	ホウライシダ	Adiantum capillus-veneris L.			D	C

【原産】熱帯,暖帯(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草
 【繁殖】孢子:風散:夏～秋 【国内侵入】161:江戸から観賞用に栽培 【県内侵入】161:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】285,311,78,165 【文献県内】39

シダ植物		イノモトソウ科			影響度	緊急度
4	コバホウライシダ		<i>Adiantum raddianum</i> C.Presl		D	C

【原産】熱帯アメリカ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 非常にまれ(千葉市,船橋市), 極少 【形態・生態】夏緑・多年草
 【繁殖】孢子:風散:夏 【国内侵入】161:昭和以前(栽培) 【県内侵入】161:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】39

シダ植物		オシダ科		国内外来生物	影響度	緊急度
5	イヌケホシダ				D	C
Christella dentata (Forssk.) Brownsey et Jermy						

【原産】世界の暖帯～熱帯 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 非常にまれ(船橋市), 極少 【形態・生態】夏緑・多年草
 【繁殖】孢子,匍匐枝で栄養繁殖:風散:夏 【国内侵入】300:- 【県内侵入】300:昭和 【影響】- 【緊急】- 【対策】温室効果ガスの排出抑制,生育状況モニタリング 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】39

シダ植物	ツルシダ科	影響度	緊急度
6	タマシダ <i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C.Presl	D	C

【原産】世界の熱帯 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 各地に散在(生垣), 少ない 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】胞子, 地下茎で栄養繁殖: 風散: 夏 【国内侵入】161: - 【県内侵入】161: 明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

シダ植物	サンショウモ科	特定外来生物	影響度	緊急度
7	アメリカオオアカウキクサ <i>Azolla cristata</i> Kaulf.		A	A

【原産】南北アメリカ, ヨーロッパ, アジア, オセアニア, アフリカ 【国内分布】西日本を中心(宮城県～福岡県) 【県内分布】分布度a 分布不確定, 極多 【形態・生態】水生シダ植物 【繁殖】胞子, 茎葉体が分裂して栄養繁殖: 水散: 一年中 【国内侵入】110: 2000年前後 【県内侵入】110: 2005年? 【影響】121, 150(水中の酸欠, 光量不足. 静岡県, 岡山県ではため池のフナが死んだ) 【緊急】- 【対策】外来生物法の遵守 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】308, 309

シダ植物	サンショウモ科	特定外来生物	影響度	緊急度
8	アイオオアカウキクサ <i>Azolla cristata</i> x <i>A. filiculoides</i>		A	A

【原産】- 【国内分布】西日本 【県内分布】分布度a 市原市, 大多喜町, 習志野市, 極多 【形態・生態】水生シダ植物 【繁殖】正常な胞子生産できない. 茎葉体が分裂して栄養繁殖 【国内侵入】110: 2000年前後 【県内侵入】110: 2005年? 【影響】121, 150(水中の酸欠, 光量不足. 静岡県, 岡山県ではため池のフナが死んだ) 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】*A. cristata*(アメリカオオアカウキクサ)とオオアカウキクサ大和型(ニシノオオアカウキクサ)の人工雑種, 標本CBM(BS-277201) 【文献全般】- 【文献県内】309, 310

種子植物	ヒノキ科	国内外来生物	影響度	緊急度
9	ヒノキ <i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Siebold et Zucc.		D	C

【原産】日本 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 各地に植林から逸出, 少ない 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉: 風媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】110: 日本原産 【県内侵入】110: 江戸 【影響】240(花粉アレルギー) 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】94, 336, 222, 109, 273, 190, 165 【文献県内】39, 34

種子植物	ヒノキ科	国内外来生物	影響度	緊急度
10	サワラ <i>Chamaecyparis pisifera</i> (Sieb. et Zucc.) Endlicher		D	C

【原産】日本 【国内分布】本州, 九州 【県内分布】分布度c 各地に植林から逸出, 少ない 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉: 風媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】110: 日本原産 【県内侵入】110: 江戸 【影響】240(花粉アレルギー) 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 336, 222, 109, 273, 190, 165 【文献県内】39, 34

種子植物	ヒノキ科	国内外来生物	影響度	緊急度
11	アスナロ		D	C
<i>Thujopsis dolabrata</i> (L. fil.) Siebold et Zucc.				

【原産】日本 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に植林から逸出, 極小 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】110: 日本原産 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,336,222,109,273,190,165 【文献県内】39,34

種子植物		イチョウ科		影響度	緊急度
12	イチョウ	D			C
Ginkgo biloba L.					

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に植林から逸出, 少ない 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:鎌倉 【県内侵入】110:鎌倉～室町 【影響】220(外種皮によるかぶれ) 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,336,222,109,273,190,165 【文献県内】39,34

種子植物	ソテツ科	国内外来生物	影響度	緊急度
13	ソテツ	CITES:II	D	C
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.				

【原産】日本 【国内分布】九州南部以南 【県内分布】分布度b 各地に植栽,館山で逸出, 中程度 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:- 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,332,165 【文献県内】39,34

	種子植物	クルミ科		
14	ペカン		影響度	緊急度
	Carya illinoides Koch		D	C

【原産】北米南東部 【国内分布】- 【県内分布】分布度a 極小 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:明治 【県内侵入】110:明治 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】各地で単木植栽 【文献全般】336,241,273,312,332,71,165 【文献県内】39

種子植物		クルミ科	影響度	緊急度
15	シナサワグルミ		D	C
<i>Pterocarya stenocarpa</i> DC.				

【原産】中国 【国内分布】- 【県内分布】分布度a 少ない 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】110:明治初期 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】公園等に植栽 【文献全般】336,232,273,300,332,202,165 【文献県内】39

種子植物	ヤナギ科	影響度	緊急度
16	ウラジロハコヤナギ <i>Populus alba</i> L.	D	C

【原産】欧州,西アジア,ロシア,ヒマラヤ,コーカサス 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 各地の公園等に単木植栽,極小 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:風媒,種子:種毛による風散:夏 【国内侵入】110:明治 【県内侵入】110:明治? 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,109,273,300,317,311,312,332,190,202 【文献県内】39

種子植物	ヤナギ科	影響度	緊急度
17	カリリナポプラ <i>Populus angulata</i> Aiton	C	C

【原産】北米東部(改良品種) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 各地に並木又は単木植栽,市川市で種子散布してやや増えている 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:風媒,種子:種毛による風散:夏 【国内侵入】110:明治 【県内侵入】110:明治? 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,109,300,312,332,202 【文献県内】39

種子植物	ヤナギ科	影響度	緊急度
18	ナミキドロ <i>Populus deltoides</i> Bartr.ex Marshall	D	C

【原産】北米東部 【国内分布】- 【県内分布】分布度a 少ない 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:風媒,種子:種毛による風散:夏 【国内侵入】110:明治 【県内侵入】110:明治? 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】各地に植栽 【文献全般】94,336,109,300,312,332,202 【文献県内】39

種子植物	ヤナギ科	影響度	緊急度
19	シダレヤナギ <i>Salix babylonica</i> L.	D	C

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 極小 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】110:平安? 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】各地に植栽 【文献全般】94,336,109,273,300,312,332,190,202,165 【文献県内】214,39,34

種子植物	ヤナギ科	影響度	緊急度
20	セイコヤナギ <i>Salix babylonica</i> L. form. <i>seiko</i> Kimura	D	C

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 極小 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】110:江戸? 【県内侵入】110:明治? 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】各地に植栽 【文献全般】336,232,109,273,300,312,332 【文献県内】39

種子植物	ヤナギ科	国内外来生物	影響度	緊急度
21	ネコヤナギ <i>Salix gracilistyla</i> Miq.		D	C

【原産】日本 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 極小 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】-:日本原産 【県内侵入】110:明治? 【影響】141 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】各地に植栽 【文献全般】336,273,300,332,165 【文献県内】39,34

種子植物	ヤナギ科	国内外来生物	影響度	緊急度
22	クロヤナギ <i>Salix gracilistyla</i> Miq. var. <i>melanostachys</i> (Makino) C.K.Schneider		D	C

【原産】日本 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 極小 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】110:江戸に作出 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】花材として各地で植栽 【文献全般】336,273,300,332 【文献県内】39

種子植物	ヤナギ科	影響度	緊急度
23	キヌヤナギ <i>Salix kinuyanagi</i> Kimura	D	C

【原産】朝鮮半島 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に逸出, 極小 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,332,165 【文献県内】39,34

種子植物	ヤナギ科	影響度	緊急度
24	コリヤナギ <i>Salix koriyanagi</i> Kimura ex Grz.	D	C

【原産】朝鮮半島 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 極小 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】110:江戸? 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】各地に植栽 【文献全般】336,273,300,332,165 【文献県内】39

種子植物	ヤナギ科	影響度	緊急度
25	ウンリュウヤナギ <i>Salix matsudana</i> Koidz. var. <i>tortuosa</i> Vilm.	D	C

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 各地に花材として栽培, 極小 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】110:江戸? 【県内侵入】110:明治? 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,336,232,109,300,317,312,332,190,202 【文献県内】39

種子植物	ヤナギ科	国内外来生物	影響度	緊急度
26	シグレヤナギ <i>Salix x eriocataphylla</i> Kimura		D	C

【原産】日本(雑種) 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 泉自然公園, 極小 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:風散:夏 【国内侵入】-:日本原産 【県内侵入】-:昭和 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】336,300,312 【文献県内】39

種子植物	ヤナギ科	国内外来生物	影響度	緊急度
27	フリソデヤナギ <i>Salix x leucopithecia</i> Kimura		D	C

【原産】日本(雑種) 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 各地で花材として栽培, 極小 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:風散:夏 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,300,332 【文献県内】39

種子植物	カバノキ科	国内外来生物?	影響度	緊急度
28	ヒメヤシャブシ <i>Alnus pendula</i> Matsum.		D	C

【原産】北海道, 本州北部 【国内分布】北海道, 本州北部 【県内分布】分布度a 極小 【形態・生態】夏緑・中高木 【繁殖】花粉:風媒, 種子:風散:秋 【国内侵入】日本原産:- 【県内侵入】110:明治? 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】東京大学演習林見本林に植栽 【文献全般】336,273,300,332,165 【文献県内】39,34

種子植物	ブナ科	国内外来生物?	影響度	緊急度
29	マテバシイ <i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai		B	B

【原産】九州 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 中程度(植林地では極多) 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:重散:秋 【国内侵入】日本原産:- 【県内侵入】240:江戸 【影響】280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止 【備考】公園に植栽, 主に県南部に植林 【文献全般】336,273,300,332,165 【文献県内】39,34

種子植物	ブナ科	国内外来生物	影響度	緊急度
30	アベマキ <i>Quercus variabilis</i> Blume		D	C

【原産】日本 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 北総, 南総丘陵, 極小 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:秋 【国内侵入】日本原産:- 【県内侵入】132植栽木から逸出?:明治以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】273,300,332,165 【文献県内】39,34

種子植物	ニレ科	国内外来生物	影響度	緊急度
31	アキニレ <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.		D	C

【原産】日本 【国内分布】本州(西部), 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主に北総に逸出, 少ない 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:風媒, 種子:風散:秋 【国内侵入】日本原産:- 【県内侵入】110:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,332,165 【文献県内】39,34

種子植物	トチュウ科	影響度	緊急度
32	トチュウ <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 極小 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:風媒, 種子:風散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:昭和 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】薬用植物園に植栽 【文献全般】336,300,332,165 【文献県内】39

種子植物	クワ科	影響度	緊急度
33	コウゾ <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold x <i>B. papyrifera</i> (L.) L' Her. ex Vent.	C	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 各地に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・中高木 【繁殖】花粉:風媒, 種子:食散:夏 【国内侵入】110:奈良以前 【県内侵入】110:江戸 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,332,165 【文献県内】39,34

種子植物	クワ科	影響度	緊急度
34	カジノキ <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent	D	C

【原産】インド, 中国, 太平洋諸島 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 北総散在(船橋, 野田), 極小 【形態・生態】夏緑・中高木 【繁殖】花粉:風媒, 種子:食散:夏 【国内侵入】110:弥生以降 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,311,312,332 【文献県内】39,34

種子植物	クワ科	影響度	緊急度
35	イチジク <i>Ficus carina</i> L.	D	C

【原産】小アジア 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度b 各地に散在, 極小 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:食散:秋 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:明治 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,312,332,165 【文献県内】39,34

種子植物	クワ科	影響度	緊急度
36	マゲワ <i>Morus alba</i> L.	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 各地に散在(かつて桑畑として存在), 少ない 【形態・生態】夏緑・中高木 【繁殖】花粉:風媒, 種子:食散:秋 【国内侵入】110: 弥生以降 【県内侵入】110: 弥生～室町 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 273, 300, 332, 165 【文献県内】39, 34

種子植物	アサ科	影響度	緊急度
37	アサ <i>Cannabis sativa</i> L.	D	A

【原産】インド 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 北総に散在, 極小 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:秋 【国内侵入】110: 弥生 【県内侵入】110: 江戸 【影響】210 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】272, 302, 312, 165 【文献県内】39, 34

種子植物	イラクサ科	影響度	緊急度
38	カラムシ <i>Boehmeria nipponivea</i> Koidz.	C	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 各地に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:秋 【国内侵入】110: 弥生 【県内侵入】110: 弥生～室町 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】272, 302, 312, 165 【文献県内】39, 34

種子植物	イラクサ科	影響度	緊急度
39	ナンバンカラムシ <i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich.	C	C

【原産】中国中南部 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:秋 【国内侵入】110: 江戸 【県内侵入】110: 明治～昭和30年代 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 214, 222, 238, 239, 60, 109, 272, 285, 286, 302, 311, 312, 40, 71, 165, 349, 344 【文献県内】39, 34

種子植物	イラクサ科	影響度	緊急度
40	カベイラクサ <i>Parietalia judaica</i> L.	D	C

【原産】南欧 【国内分布】兵庫県, 神奈川県 【県内分布】分布度a 千葉市千葉港, 少ない 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒?, 種子:重散:夏 【国内侵入】240:- 【県内侵入】240: 1982年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】標本CBM(千葉市千葉港 1982.10.24 BS-259703) 【文献全般】109, 286, 317, 40, 202 【文献県内】-

種子植物	イラクサ科	影響度	緊急度
41	セイヨウイラクサ <i>Urtica dioica</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】岡山県,千葉県 【県内分布】分布度a 勝浦市杉戸で記録, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】240:平成 【県内侵入】240:平成 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】286,319,312,40,202 【文献県内】-

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
42	シャクチリソバ <i>Fagopyrum cymosum</i> Meissn.	D	C

【原産】インド北部～中国 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 主に北総に散在, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】110:明治 【県内侵入】110:昭和 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,222,238,60,109,285,286,300,317,319,311,40,71,165,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
43	ソバ <i>Fagopyrum esculentum</i> Gilib.	D	C

【原産】東アジアの温帯北部 【国内分布】日本各地で栽培 【県内分布】分布度b 各地で栽培,まれに逸出, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:縄文以降 【県内侵入】110:弥生～室町 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312,332,165 【文献県内】39

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
44	ソバカズラ <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	D	C

【原産】欧州～西アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】240:1910年以前 【県内侵入】240:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,241,238,239,60,109,272,285,286,317,319,311,312,40,190,202,78,165,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
45	ツルタデ <i>Fallopia dumetora</i> (L.) Holub	D	C

【原産】欧州～西アジア 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 松戸, 極小 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】250:1950年以前 【県内侵入】250:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,232,60,109,285,286,311,312,40,190,165,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
46	ツルドクダミ <i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	C	B

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主に北総に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・つる多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 地下茎で栄養繁殖, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】161 (薬用植物): 江戸 【県内侵入】161: 明治～昭和30年代 【影響】150 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 222, 238, 239, 60, 109, 272, 285, 286, 317, 311, 312, 40, 332, 190, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 39, 34

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
47	ヒメツルソバ <i>Persicaria capitata</i> (Hamilt.) H. Gross	C	C

【原産】ヒマラヤ 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主に北総各地に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 匍匐枝で栄養繁殖, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 明治中期 【県内侵入】161: 明治～昭和30年代 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 232, 239, 60, 109, 285, 286, 317, 311, 312, 326, 40, 202, 349, 344 【文献県内】39

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
48	オオベニタデ <i>Persicaria orientalis</i> (L.) Assenov	D	C

【原産】インド, マレーシア, 中国南部 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 各地に栽培, 中程度 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 明治以降 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 222, 109, 286, 319, 332, 165, 349 【文献県内】39

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
49	オオケタデ <i>Persicaria pilosa</i> (Roxb.) Kitagawa	D	C

【原産】インド, マレーシア, 中国南部 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 各地に栽培, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 明治以降 【県内侵入】161: 明治～昭和30年代 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 82, 94, 241, 222, 238, 239, 109, 285, 286, 317, 319, 311, 312, 40, 331, 202, 71, 165 【文献県内】39, 34

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
50	ニオイタデ <i>Persicaria viscosa</i> (Hamilt.) H. Gross	D	C

【原産】東アジア 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 市川, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】240: 江戸 【県内侵入】240: 江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】94, 232, 238, 239, 60, 272, 285, 286, 311, 312, 40, 202, 78, 165, 349, 344 【文献県内】39, 34

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
51	ハイミチヤナギ <i>Polygonum arenastrum</i> Boreau.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度b 主として千葉市周辺の湾岸,市街地の道端や空き地に 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】240:1964年以前 【県内侵入】240:明治～昭和30年代 【影響】280 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,232,238,239,60,109,285,286,302,317,311,40,202,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
52	ミチヤナギ <i>Polygonum aviculare</i> L.	C	C

【原産】世界中 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 県下全域, 多 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:弥生以降 【県内侵入】210:弥生～室町 【影響】310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,222,109,312,190,71,165 【文献県内】39,34

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
53	ヤンバルミチヤナギ <i>Polygonum plebeium</i> R.Br.	D	C

【原産】熱帯アジア 【国内分布】九州 【県内分布】分布度a 野田市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:江戸? 【県内侵入】210:平成 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,286,319,311,312,165 【文献県内】39,34

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
54	ホザキニワヤナギ <i>Polygonum ramosissimum</i> Michx.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市,富里市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:1970年以前 【県内侵入】210:昭和 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,241,238,109,302,317,311,312,40,349,344 【文献県内】264,39,34,367

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
55	ヒメスイバ <i>Rumex acetosella</i> L.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 安房地方を除く全県下, 中程度 【形態・生態】夏緑・草本 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏 【国内侵入】210(牧草):1884年以前 【県内侵入】210:明治 【影響】310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,238,239,60,272,285,286,302,317,319,311,40,190,202,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
56	アレチギンギン <i>Rumex conglomeratus</i> Murr.	B	B
【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 東京湾側に多く、全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏 【国内侵入】250:1905年 【県内侵入】250:明治～昭和7年 【影響】310 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,241,222,238,239,60,109,272,285,286,302,317,319,311,40,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34			

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
57	ナガバギンギン <i>Rumex crispus</i> L.	B	B
【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏 【国内侵入】210:1891年以前 【県内侵入】210:明治～昭和10年 【影響】310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,272,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】39,34			

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
58	コガネギンギン <i>Rumex maritimus</i> L.	D	C
【原産】欧州・北米 【国内分布】北海道(自生),本州 【県内分布】分布度a 野田市,佐原市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏 【国内侵入】240:- 【県内侵入】400(河川):昭和 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,272,286,319,311,312,40,202,71,165 【文献県内】39			

種子植物	タデ科	要注意外来生物(情報不足)	影響度	緊急度
59	エゾノギンギン <i>Rumex obtusifolius</i> L.		B	B
【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏 【国内侵入】210:1909年以前 【県内侵入】210:明治 【影響】310 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,272,285,286,302,317,319,311,312,40,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34				

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
60	アレチエゾノギンギン <i>Rumex x abortivus</i> Ruhmer	C	C
【原産】ユーラシア 【国内分布】不明 【県内分布】分布度a 千葉市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散?(不稔?):夏 【国内侵入】日本で交雑:- 【県内侵入】現地で交雑:- 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】39			

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
61	ノハラダイオウ <i>Rumex x pratensis</i> Mert. et Koch.	D	C

【原産】ユーラシア 【国内分布】不明 【県内分布】分布度a 千葉市,佐倉市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏 【国内侵入】日本で交雑:明治～昭和30年代 【県内侵入】現地で交雑:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,272,286,302,312,40 【文献県内】39,34

種子植物	タデ科	影響度	緊急度
62	アレチナガバギシギシ <i>Rumex x schulzei</i> Hausskn.	C	C

【原産】ユーラシア 【国内分布】不明 【県内分布】分布度a 千葉市,船橋市,八日市場, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散?(不稔?):夏 【国内侵入】日本で交雑:- 【県内侵入】現地で交雑:- 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】39

種子植物	ヤマゴボウ科	影響度	緊急度
63	ヨウシュヤマゴボウ <i>Phytolacca americana</i> L.	C	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県下, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】240: 明治 【県内侵入】240: 明治～昭和30年代 【影響】280 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,272,285,286,302,317,311,40,332,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	ヤマゴボウ科	影響度	緊急度
64	ヤマゴボウ <i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte	D	C

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 丘陵地に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161(薬用):江戸 【県内侵入】161:江戸以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,60,272,286,302,317,312,40,190,202,165,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	オシロイバナ科	影響度	緊急度
65	ナハカノコソウ <i>Boerhavia diffusa</i> L.	D	C

【原産】太平洋諸島,中国 【国内分布】沖縄県に自生 【県内分布】分布度a 船橋市に一次帰化, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:着散:秋 【国内侵入】不明:- 【県内侵入】250:平成 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】272,202,71 【文献県内】39

種子植物	オシロイバナ科	影響度	緊急度
66	オシロイバナ <i>Mirabilis jalapa</i> L.	C	C

【原産】南米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県下, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:江戸 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,239,109,272,285,286,302,317,319,311,312,40,331,332,202,78,165,349 【文献県内】214,263,34

種子植物	ザクロソウ科	影響度	緊急度
67	ホソバモンパミナグサ <i>Glinus oppositifolius</i> (L.) A.DC.	D	C

【原産】世界の熱帯～亜熱帯 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市で一時帰化, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】250:平成 【県内侵入】250:平成 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】286,312 【文献県内】39

種子植物	ザクロソウ科	影響度	緊急度
68	ハナビザクロソウ <i>Mollugo nudicaulis</i> Lam.	D	C

【原産】アフリカ 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市で一時帰化, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】250:平成 【県内侵入】250:平成 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】286,312 【文献県内】39

種子植物	ザクロソウ科	影響度	緊急度
69	クルマバザクロソウ <i>Mollugo verticillata</i> L.	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】240:江戸末期 【県内侵入】240:明治～昭和30年代 【影響】310 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,232,239,60,109,272,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】263,39,34

種子植物	ツルナ科	影響度	緊急度
70	ハナツルソウ <i>Aptenia cordifolia</i> Schw.	D	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 各地に散在, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】161:江戸末期 【県内侵入】161:昭和 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】332 【文献県内】39

種子植物	ツルナ科	影響度	緊急度
71	バクヤギク <i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E.Br.	D	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】愛知県渥美半島 【県内分布】分布度a 館山市, - 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒, 匍匐枝で栄養繁殖, 種子:食散:秋 【国内侵入】161: 明治 【県内侵入】161: ? 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】不法投棄と思われる愛知県渥美半島の西の浜に広がっている 【文献全般】332 【文献県内】-

種子植物	ツルナ科	影響度	緊急度
72	マツバギク <i>Lampranthus spectabilis</i> N.E.Br.	D	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 全県で栽培, 時に逸出, 少ない(一株で一面に広がる) 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒, 匍匐枝で栄養繁殖, 種子:重散:秋 【国内侵入】161: 明治(導入) 【県内侵入】161: 昭和? 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232, 302, 312, 40, 332, 71 【文献県内】39

種子植物	スベリヒユ科	影響度	緊急度
73	タチスベリヒユ <i>Portulaca oleracea</i> L. var. <i>sativa</i> DC.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】野菜として稀に栽培 【県内分布】分布度a 松戸?, 極小 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:重散:夏~秋 【国内侵入】161: 明治 【県内侵入】161?: 昭和? 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】302 【文献県内】39

種子植物	スベリヒユ科	影響度	緊急度
74	ヒメマツバボタン <i>Portulaca pilosa</i> L.	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県の平野部, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:重散:夏~秋 【国内侵入】240: 1963年頃 【県内侵入】240: 明治~昭和30年代 【影響】280 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】94, 232, 241, 238, 239, 60, 109, 286, 302, 319, 311, 312, 40, 202, 71, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39, 34, 368

種子植物	スベリヒユ科	影響度	緊急度
75	ハゼラン <i>Talinum crassifolium</i> Willd.	C	C

【原産】西インド諸島 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主として北総の平野部, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年~多年草 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:重散:秋 【国内侵入】161: 明治初期 【県内侵入】161: 明治~昭和30年代 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 232, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 312, 40, 332, 202, 71, 165, 349 【文献県内】214, 39

種子植物	ツルムラサキ科	影響度	緊急度
76	アカザカズラ <i>Anderera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	D	C

【原産】南米熱帯 【国内分布】本州(神奈川県～岡山県) 【県内分布】分布度a 南房総市, 極小 【形態・生態】つる・夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:むかご:秋 【国内侵入】161:1905年 【県内侵入】161:昭和? 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,238,109,285,286,302,311,40,202,78,349,344 【文献県内】39,久内清孝. 1971. マディラカズラが房州に逸出している. 植物研究雑誌46(6):192.

種子植物	ツルムラサキ科	影響度	緊急度
77	ツルムラサキ <i>Basella rubra</i> L. var. <i>alba</i> Makino	D	C

【原産】熱帯アフリカ～アジア 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 東京湾沿岸の平野に散在, 極小 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:明治～昭和10年代 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,109,286,302,316,311,312,40,332,202,71,165,349 【文献県内】39

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
78	ネバリノミノツヅリ <i>Arenaria serpyrifolia</i> L. var. <i>viscida</i> (Loisel.) Ascherson	D	C

【原産】ユーラシア? 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】240:不明 【県内侵入】240:昭和 【影響】121 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,312 【文献県内】39

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
79	オランダミミナグサ <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県下, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】240:明治末期 【県内侵入】240:明治～昭和10年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,272,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】214,270,39,34

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
80	ノハラナデシコ <i>Dianthus armeria</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1966年 【県内侵入】220:昭和30年代 【影響】280 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,317,311,312,40,202,349,344 【文献県内】142,268,39,34,斉藤吉永.1971.千葉県野田に帰化したノハラナデシコ.植物採集ニュース(57):88-89.

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
81	カスミノウ <i>Gypsophila elegans</i> Bieb.	D	C

【原産】コーカサス 【国内分布】全国で栽培 【県内分布】分布度a 各地でワイルドフラワーとして栽培, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:大正 【県内侵入】161:昭和 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,286,302,317,319,311,312,332,202,165 【文献県内】39

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
82	ヌカイトナデシコ <i>Gypsophila muralis</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 東京湾岸の平野に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】240:1997年以前 【県内侵入】240:1999年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】109,286,302,317,40 【文献県内】39

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
83	イヌコモチナデシコ <i>Petrorhagia nanteuilli</i> (Burnat) P. W. Ball et Heywood	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州,九州 【県内分布】分布度b 北総の平野部に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】240:1960年 【県内侵入】240:平成以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】232,241,238,239,60,109,285,286,317,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
84	アライツツメクサ <i>Sagina procumbens</i> L.	D	C

【原産】欧州,北アメリカ,オーストラリア 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 佐倉市, 中程度 【形態・生態】冬緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】240:昭和30年代以前 【県内侵入】240:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,109,285,286,302,317,319,40,202,349 【文献県内】39

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
85	シバツメクサ <i>Scleranthus annuus</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 千葉市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】240:戦後 【県内侵入】240:平成 【影響】280 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,239,286,302,319,312,40,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
86	マツヨイセンノウ <i>Silene alba</i> (Mill.) E.H. L.Krause	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 主として北総の平野部, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:明治～昭和10年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,241,109,272,285,286,302,317,319,312,40,332,202,349,344 【文献県内】269,39,34

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
87	ムシトリマンテマ <i>Silene antirrhina</i> L.	D	C

【原産】中南米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地の平野部に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:1951年以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,238,60,109,286,302,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】267,268,39,34

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
88	ムシトリナデシコ <i>Silene armeria</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県の平野部に逸出, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:明治～昭和10年代 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,60,109,272,285,286,317,319,311,312,40,331,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,332

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
89	オオシラタマソウ <i>Silene conoidea</i> L.	D	C

【原産】欧州～西アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 鴨川市, 極小 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1912年以前 【県内侵入】210:昭和20年代以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,241,238,239,60,109,285,302,319,311,312,40,71,349,344 【文献県内】269,39,34

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
90	ホザキマンテマ <i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 富里市, 極小 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1950年 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,60,109,285,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】214,142,267,269,39,34

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
91	シロバナマンテマ <i>Silene gallica</i> L.	B	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主に北総に分布, 中程度. 千葉県では空き地などで割にみかける 【形態・生態】夏緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:江戸末期 【県内侵入】210:昭和20年代以前 【影響】280,121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,241,222,238,239,60,109,302,319,311,312,40,34,202,78,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
92	マンテマ <i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) Koch	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主に北総に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:江戸末期 【県内侵入】161:昭和10年代以前 【影響】280,121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】元々観賞用.シロバナマンテマよりずっと少ない 【文献全般】94,241,222,238,239,60,109,285,302,317,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
93	ツキミセンノウ <i>Silene noctiflora</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 富里市,印西市, 極小 【形態・生態】夏緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1899年 【県内侵入】210:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,241,238,239,60,109,285,302,317,319,311,40,202,78,349,344 【文献県内】142,267,269,39,34

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
94	シラタマソウ <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 千葉市,印西市, 極小 【形態・生態】夏緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:明治 【県内侵入】210:昭和40年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,241,238,239,60,109,285,302,319,311,40,202,165,349,344 【文献県内】269,39,34

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
95	ノハラツメクサ <i>Spergularia arvensis</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 富津市,南房総市,浦安市,印西市(旧本埜村),千葉市,君津市, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】240:明治 【県内侵入】240:昭和30年代以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,238,239,60,109,285,302,319,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
96	ウシオハナツメクサ <i>Spergularia bocconii</i> (Scheele) Ascherson et Graebn.	B	B

【原産】欧州 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主として東京湾岸に分布, 中程度, 塩湿地生の植物 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 水散: 夏 【国内侵入】240: 1934年以前 【県内侵入】240: 1934年以前 【影響】280, 121 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】94, 109, 286, 317, 312, 40, 202, 71 【文献県内】39, 木村陽子. 1989. 船橋市・海浜公園の帰化植物3種. 千葉生物誌39(1): 32-34.

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
97	ウスベニツメクサ <i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C. Presl	D	C

【原産】北半球温帯 【国内分布】北海道, 本州, 四国 【県内分布】分布度a 勝浦市?(標本未見), 極小? 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】240: 1932年以前 【県内侵入】240: 昭和40年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81, 232, 241, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】39, 34

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
98	ノミノコブスマ <i>Stellaria alsine</i> Grimm Var. <i>alsine</i>	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道, 本州, 九州 【県内分布】分布度a 八街市, 極小 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】240: 1978年以前 【県内侵入】240: 平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】232, 285, 286, 302, 317, 319, 312, 202, 349 【文献県内】-

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
99	コハコベ <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	C	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 春~秋 【国内侵入】210: 明治 【県内侵入】210: 明治 【影響】310 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】232, 241, 222, 238, 60, 109, 285, 319, 311, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 317, 34

種子植物	ナデシコ科	影響度	緊急度
100	イヌコハコベ <i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crep.	C	B

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 砂質生. 市川市, 船橋市の沿海部では多い, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】210: 1978年以前 【県内侵入】210: 1978年以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 232, 109, 285, 286, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 349 【文献県内】214, 39, 木村陽子. 1998. イヌコハコベとコハコベ. 千葉県植物誌資12: 81-82, 倉俣武男. 1998. イヌコハコベの分布について. 八千代市および和田町・富山町. 千葉県植物誌資料13: 93.

種子植物	アカザ科	影響度	緊急度
101	アメリカビユ <i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 袖ヶ浦市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:1948年以前 【県内侵入】210:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,241,238,109,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	アカザ科	影響度	緊急度
102	ホコガタアカザ <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC. (syn. <i>A. hastata</i> non. L.)	B	B

【原産】欧州 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県の海岸部に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】240:1940年以前 【県内侵入】240:昭和20年代以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,60,109,285,302,317,319,311,312,40,78,165,349,344 【文献県内】269,39,34

種子植物	アカザ科	影響度	緊急度
103	ホソバアカザ <i>Chenopodium album</i> L. var. <i>stenophyllum</i> Makino (syn. <i>C. stenophyllum</i> (Makino) Koidz.)	D	C

【原産】アジア北部 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 海岸部に散在, 中程度. 海岸・河原にでる 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:昭和以前 【県内侵入】210:昭和10年代 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】39

種子植物	アカザ科	影響度	緊急度
104	アリタソウ <i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	C	C

【原産】南米 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:昭和10年代以前 【影響】250,121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】別名ケアリタソウ 【文献全般】81,94,222,238,239,60,109,285,286,317,319,311,312,40,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	アカザ科	影響度	緊急度
105	アメリカアリタソウ <i>Chenopodium anthelminticum</i> L. (syn. <i>Ambrina anthelminticum</i> (L.) Spach)	C	C

【原産】南米 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 富津市, 佐倉市, 鴨川市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:昭和以前 【県内侵入】110:昭和10年代以前 【影響】250,121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】別名アリタソウ 【文献全般】232,241,238,239,60,109,272,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】312,34

種子植物	アカザ科	影響度	緊急度
106	コアカザ <i>Chenopodium ficiforium</i> Sm. (syn. <i>C. serotinum</i> non. L.)	B	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 主として東京湾岸の平野部に分布, 極多
 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:春～秋 【国内侵入】210:弥生～室町 【県内侵入】210:弥生～室町
 【影響】310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,109,285,286,302,317,319,311,202,71,78,165,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	アカザ科	影響度	緊急度
107	ウラジロアカザ <i>Chenopodium glaucum</i> L.	B	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総内陸部及び全県海岸に分布, 多い
 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:1891年以前 【県内侵入】210:昭和初期 【影響】121
 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,165,349,344 【文献県内】214,269,39,34

種子植物	アカザ科	影響度	緊急度
108	ヒメハマアカザ <i>Chenopodium leptophyllum</i> Nutt.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 木更津市, 極少 【形態・生態】夏緑・一年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏
 【国内侵入】210:1973年以前 【県内侵入】210:1973年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,109,286,317,319,311,312,40,34,202,71,349 【文献県内】39,34

種子植物	アカザ科	影響度	緊急度
109	ミナトアカザ <i>Chenopodium murale</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 富里市,芝山町, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草
 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1965年 【県内侵入】250:平成以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり
 在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】-
 【文献全般】81,232,241,222,238,109,285,302,319,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】39

種子植物	アカザ科	影響度	緊急度
110	ゴウシュウアリタソウ <i>Chenopodium pumilio</i> R.Br.	B	B

【原産】豪州 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度b 北総(柏市,山武市,佐倉市), 多い 【形態・生態】夏緑・1年草
 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:春 【国内侵入】250:1933年 【県内侵入】250:昭和20年代以前 【影響】310,250 【緊急】- 【対策】
 可能なかぎり
 在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止
 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	アカザ科	影響度	緊急度
111	ホウキギ <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. var. <i>scoparia</i>	D	C

【原産】ユーラシア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総に散在, 少ない 【形態・生態】-
 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸以前 【県内侵入】161:昭和以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】栽培植物 【文献全般】81,232,241,239,285,286,312,40,34,190,71,165 【文献県内】263,39,34

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
112	ケイノコヅチモドキ(仮称) <i>Achyranthes</i> sp.	D	C

【原産】亜熱帯アジア? 【国内分布】千葉県のみ? 【県内分布】分布度a 富里市両国, 少ない 【形態・生態】夏緑一年草? 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:2008年 【県内侵入】210:2008年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】木村陽子.2009.ケイノコヅチモドキ(仮称)が富里市に一時帰化.千葉県植物誌資料25:247-248.

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
113	ホソバツルノゲイトウ <i>Alternanthera nodiflora</i> R.Br.	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 市川市,柏市, 少ない 【形態・生態】夏緑・匍匐1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1897年以前 【県内侵入】250:昭和30年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能な限り在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,344 【文献県内】39,34

種子植物	ヒユ科	特定外来生物	影響度	緊急度
114	ナガエツルノゲイトウ <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.		A	A

【原産】中央米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 印旛沼周辺, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,枝がちぎれて栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】163:1989年 【県内侵入】163:1992年以前 【影響】350,121 【緊急】- 【対策】外来生物法の遵守 【備考】- 【文献全般】60,285,286,319,311,312,40,202,349 【文献県内】214,39

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
115	ツルノゲイトウ <i>Alternanthera sessilis</i> (L.) DC.	B	B

【原産】南米? 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として利根川・江戸川流域, 多い 【形態・生態】夏緑・匍匐1年草 【繁殖】花粉:虫媒,枝がちぎれて栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】163:明治中期以前 【県内侵入】163:1984年以前 【影響】121,350 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,321,319,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
116	ヒメシロビユ <i>Amaranthus albus</i> L.	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 銚子など各地に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・匍匐1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1941年以前 【県内侵入】250:昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
117	ヒメアオゲイトウ <i>Amaranthus arenicola</i> I.M.Johnst.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 市川市,一宮町, 少ない 【形態・生態】夏緑・匍匐1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1958年以前 【県内侵入】250:昭和20年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94,232,241,239,60,109,285,286,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
118	スギモリゲイトウ <i>Amaranthus cruentus</i> L.	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 北総に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:明治以降 【県内侵入】161:昭和50年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241,238,109,286,302,317,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】39

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
119	ハイビユ <i>Amaranthus deflexus</i> L.	D	C

【原産】広域分布 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 各地に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・匍匐1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:1921年 【県内侵入】210:昭和20年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,241,238,239,60,109,286,302,317,319,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
120	ホソバイヌビユ <i>Amaranthus graecizans</i> L.	D	C

【原産】欧州,アフリカ 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1920年頃 【県内侵入】250:昭和50年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】302,202 【文献県内】39,34

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
121	ホソアオゲイトウ <i>Amaranthus hybridus</i> L.(syn. <i>Amaranthus patulus</i> Bertol.)	B	B

【原産】南米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:1937年以前 【県内侵入】210:昭和20年代以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,311,40,71,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
122	ヒユ <i>Amaranthus mangostanus</i> L.	D	C

【原産】アジア 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 各地に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・匍匐1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:奈良以前 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】古来食用とされた 【文献全般】238,302,202 【文献県内】39

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
123	オオホナガアオゲイトウ <i>Amaranthus palmeri</i> S.Watson	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州,九州 【県内分布】分布度a 船橋, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1964年以前 【県内侵入】250:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】232,241,222,239,60,109,285,286,317,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
124	イガホビユ <i>Amaranthus powellii</i> S.Watson	B	B

【原産】中央米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 北総及び東京湾岸に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1937年以前 【県内侵入】250:平成以前 【影響】310 【緊急】全国的にかなり広がっている 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】232,241,109,286,302,317,311,312,326,40,202,71,349 【文献県内】214,39,34

種子植物	ヒユ科	影響度	緊急度
125	アオゲイトウ <i>Amaranthus retroflexus</i> L.	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総の分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:明治30年代以前 【県内侵入】250:昭和30年代 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,109,285,286,302,317,312,40,202,71,165 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	ヒユ科		影響度	緊急度
126	ハリビユ	要注意外来生物(情報不足)	B	B
<i>Amaranthus spinosus</i> L.				

【原産】熱帯米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主として北総に分布, 中程度. 畑地の強害草 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】250: 明治 【県内侵入】250: 昭和30年代 【影響】220, 310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94, 232, 241, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】263, 39, 34

種子植物	ヒユ科		影響度	緊急度
127	ホナガイヌビユ		B	B
<i>Amaranthus viridis</i> L.				

【原産】熱帯米 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 極多 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】210: 大正 【県内侵入】210: 昭和10年代後半以降 【影響】310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 222, 238, 239, 109, 286, 302, 317, 311, 312, 40, 202, 78, 165, 344 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	ヒユ科		影響度	緊急度
128	ノゲイトウ		D	C
<i>Celosia argentea</i> L.				

【原産】熱帯米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 佐倉, 富里, 富津, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 1856年以前 【県内侵入】161: 平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 232, 241, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 331, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 39

種子植物	ヒユ科		影響度	緊急度
129	ケイトウ		D	C
<i>Celosia cristata</i> L.				

【原産】熱帯アジア 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主として北総に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 室町以降 【県内侵入】161: 江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】園芸植物として広く栽培 【文献全般】238, 286, 302, 317, 40, 165 【文献県内】39

種子植物	サボテン科		影響度	緊急度
130	ウチワサボテン		B	B
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.				

【原産】南米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 銚子・館山など太平洋岸の海岸, 少ない 【形態・生態】常緑・半低木 【繁殖】花粉: 虫媒, 枝がちぎれて栄養繁殖, 種子: 食散: 夏～秋 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 昭和 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】202, 165 【文献県内】39

種子植物	モクレン科	影響度	緊急度
131	ユリノキ <i>Liriodendron tulipifera</i> L.	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 各地に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:昭和30年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,300,165 【文献県内】39

種子植物	バンレイシ科	影響度	緊急度
132	アケビガキ <i>Asimina triloba</i> Dunal	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 主として東京湾岸の都市に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】110:明治 【県内侵入】110:昭和30年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,109,202 【文献県内】214,39

種子植物	クスノキ科	影響度	緊急度
133	クスノキ <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Siebold	C	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州(自生) 【県内分布】分布度c 全県に分布, 極少 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】110:縄文(日本原産?) 【県内侵入】110:弥生~室町 【影響】141,121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,336,241,109,273,71 【文献県内】277,39

種子植物	クスノキ科	国RDB:NT	影響度	緊急度
134	ニッケイ <i>Cinnamomum sieboldii</i> Meissn.		D	C

【原産】アジア南部 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 極少 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】110:江戸以前 【県内侵入】110:江戸 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,241,109,292,317 【文献県内】39

種子植物	クスノキ科	影響度	緊急度
135	ゲッケイジュ <i>Laurus nobilis</i> L.	D	C

【原産】南欧 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総に散在,暖地では自然散布する, 極少 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:明治 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,109,317 【文献県内】214,263,39

種子植物	クスノキ科	国内外来生物	影響度	緊急度
136	アオモジ <i>Litsea citriodora</i> (Siebold et Zucc.) Hatus.		D	C

【原産】中国,日本 【国内分布】本州(山口),九州,国内帰化 【県内分布】分布度b 安房地方に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・中高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161: 日本原産 【県内侵入】161:戦後 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,241,273,312,165 【文献県内】39

種子植物	クスノキ科	国内外来生物	影響度	緊急度
137	タブノキ <i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.		C	C

【原産】朝鮮半島,日本 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 極少(自生のものは極多) 【形態・生態】常緑高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】132: 県内原産+昭和 【県内侵入】132: 県内原産+昭和 【影響】141 【緊急】- 【対策】他県産の植木を導入しない 【備考】西日本,近畿,中部以東で種内に遺伝的分化がある. 県外産の植木が植栽され逸出している遺伝的汚染の可能性はあるが,詳細は不明 【文献全般】94,336,214,213,237,109,272,317,332,71,300 【文献県内】39,34

種子植物	キンポウゲ科	国内外来生物	影響度	緊急度
138	シュウメイギク <i>Anemone hupehensis</i> Lemoine var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles et Stearn		D	C

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・草本 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161: 室町 【県内侵入】161:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,317,319,311,312,40,331,202,165,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	キンポウゲ科	国内外来生物	影響度	緊急度
139	キクバオウレン <i>Coptis japonica</i> (Thunb.) Makino var. <i>anemonifolia</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohba		D	C

【原産】日本 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度a 柏市,富津市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】110: 日本原産 【県内侵入】110:昭和以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】214,272,302,165 【文献県内】39

種子植物	キンポウゲ科	国内外来生物	影響度	緊急度
140	セリバヒエンソウ <i>Delphinium anthriscifolium</i> Hance		D	C

【原産】中国 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 佐倉市,袖ヶ浦市, 少ない. 薬草園や庭先にもうえられている 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】240: 明治 【県内侵入】240:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】94,238,239,60,109,286,302,317,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	キンポウゲ科	影響度	緊急度
141	ヒメリュウキンカ <i>Ranunculus ficaria</i> L.	C	B

【原産】ヨーロッパ 【国内分布】近畿,関東 【県内分布】分布度a 千葉市,八街市,柏市, 少 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】161:1992年 【県内侵入】161:1992年 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止 【備考】標本CBM(BS-275886,306241) 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	キンポウゲ科	影響度	緊急度
142	トゲミノキツネノボタン <i>Ranunculus muricatus</i> L.	B	B

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 八街市,館山市,大多喜町, 中程度 【形態・生態】冬緑 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:春～夏 【国内侵入】240:1915年 【県内侵入】240:昭和30年代以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】
241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	キンポウゲ科	影響度	緊急度
143	ハイキンポウゲ <i>Ranunculus repens</i> L.	B	B

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 芝山町, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:1983年 【県内侵入】161:平成以前 【影響】121栽培植物であるが、宝塚市にはクレソンと同等に繁殖がみられるところがあり、要注意 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,109,317,319,311,312,40,202,165 【文献県内】-

種子植物	キンポウゲ科	影響度	緊急度
144	イボミキンポウゲ <i>Ranunculus sardous</i> Grantz	B	B

【原産】ヨーロッパ 【国内分布】九州,関東 【県内分布】分布度a 館山市,南房総市,いすみ市, 少 【形態・生態】冬緑・一年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】250:1980年 【県内侵入】250:1980年 【影響】310 【緊急】- 【対策】適切な除草 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	メギ科	影響度	緊急度
145	ホソバヒイラギナンテン <i>Mahonia fortunei</i> Fedde	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 少ない 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:明治初期 【県内侵入】161:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,109,317,312,202,165 【文献県内】39

種子植物	メギ科	影響度	緊急度
146	ヒイラギナンテン <i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC.	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主として北総の丘陵に分布, 少ない 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 336, 109, 317, 312, 165 【文献県内】214, 39

種子植物	メギ科	影響度	緊急度
147	ナンテン <i>Nandina domestica</i> Thunb.	D	C

【原産】東アジア, インド 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 少ない 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】161: 日本原産 【県内侵入】161: 江戸 【影響】141(もし県内在来種があるなら) 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 336, 232, 222, 109, 273, 300, 302, 317, 332, 190, 165 【文献県内】214, 39, 34

種子植物	スイレン科	影響度	緊急度
148	フサジュンサイ <i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray	A	A

【原産】北米東南部 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 北総の水辺に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・浮葉多年水草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 水散: 秋 【国内侵入】163: 昭和初期 【県内侵入】163: 昭和30年代 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 232, 241, 239, 101, 109, 285, 286, 302, 317, 40, 202, 165 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	ハス科	国RDB: VU	影響度	緊急度
149	ハス <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.		C	C

【原産】アジア 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県の水辺に散在, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 地下茎で栄養繁殖, 種子: 水散: 秋 【国内侵入】110: 日本原産? 【県内侵入】110: 江戸以前 【影響】350, 121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 222, 109, 272, 317, 331, 165 【文献県内】39, 34

種子植物	マタビ科	影響度	緊急度
150	シナサルナシ <i>Actinidia chinensis</i> Planch.	C	C

【原産】中国南部 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に丘陵地に分布, 極小 【形態・生態】夏緑・つる性 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】110: 昭和30年代後半以降 【県内侵入】110: 昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 336, 109, 317, 312, 202 【文献県内】214, 39

種子植物	ツバキ科	影響度	緊急度
151	チャノキ <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	D	C

【原産】中国南部,東南アジア 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 少ない 【形態・生態】常緑・低木
 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋～冬 【国内侵入】110:鎌倉 【県内侵入】110:鎌倉～室町 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,336,232,222,109,273,300,312,332,165 【文献県内】39,34

種子植物	ツバキ科	国内外来生物	影響度	緊急度
152	ハマヒサカキ <i>Eurya emarginata</i> (Thunb. ex Murray) Makino		D	C

【原産】日本自生 【国内分布】本州西南部,四国,九州 【県内分布】分布度b 一部半野生化,各地の海岸に分布, 中程度 【形態・生態】常緑・低木
 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:日本原産 【県内侵入】161:江戸 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,222,109,273,312,332,71,165 【文献県内】39

種子植物	ツバキ科	国内外来生物	影響度	緊急度
153	ナツツバキ <i>Stuartia pseudo-camellia</i> Maxim.		D	C

【原産】日本自生 【国内分布】本州(中部以西),四国,九州 【県内分布】分布度a 全県の丘陵地に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・高木
 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:日本原産 【県内侵入】161:江戸以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,222,273,300,312,332,165 【文献県内】39

種子植物	オトギリソウ科	影響度	緊急度
154	トミサトオトギリ <i>Hypericum mutilum</i> L.	B	B

【原産】北米 【国内分布】千葉県 【県内分布】分布度b 富津市, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】240:1998年 【県内侵入】240:1998年 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】312,202 【文献県内】39,大場・木村.2000.トミサトオトギリ(新称)*Hypericum mutilum* L.の帰化.植物研究雑誌75(5):316-318.

種子植物	オトギリソウ科	影響度	緊急度
155	コゴメバオトギリ <i>Hypericum perforatum</i> L. var. <i>angustifolium</i> DC.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総の丘陵部に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草
 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】240:1934年 【県内侵入】240:昭和50年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,311,312,40,202,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	オトギリソウ科	影響度	緊急度
156	セイヨウトギリ <i>Hypericum perforatum</i> L. var. <i>perforatum</i>	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:昭和以前 【県内侵入】161:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,336,241,238,239,285,286,311,312,40,202,349 【文献県内】39

種子植物	オトギリソウ科	影響度	緊急度
157	ビョウヤナギ <i>Norysta chinensis</i> (L.) Spach	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 各地の丘陵地に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:昭和以前 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,239,109,273,300,331,332,165 【文献県内】39

種子植物	オトギリソウ科	影響度	緊急度
158	キンシバイ <i>Norysta patula</i> (Thunb.) Voigt	C	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地の丘陵地に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:昭和以前 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,60,109,273,300,331,332,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	モウセンゴケ科	影響度	緊急度
159	アフリカナガバモウセンゴケ <i>Drosera capensis</i> L.	C	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 茂原市で逸出がある,山野草屋で売られている, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:戦後? 【県内侵入】161:昭和以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	モウセンゴケ科	影響度	緊急度
160	ナガエモウセンゴケ <i>Drosera intermedia</i> Hayne	A	A

【原産】欧州,北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 長生村, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:戦後? 【県内侵入】161:昭和以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	ケシ科	影響度	緊急度
161	シラユキゲシ <i>Eomecon chionantha</i> Hance	B	B

【原産】中国 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 千葉市, 少ない 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,根茎で暗い林床でも生育をひろげる,種子:自散:夏 【国内侵入】161:平成 【県内侵入】161:平成 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,317,312,40,202 【文献県内】39

種子植物	ケシ科	影響度	緊急度
162	ハナビシソウ <i>Eschscholtzia californica</i> Cham.	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 市街地に散在, 少ない. ワイルドフラワーでまかれたものがある 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:1870年頃 【県内侵入】161:昭和 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,286,317,319,40,331,202,165 【文献県内】39

種子植物	ケシ科	影響度	緊急度
163	ハカマオニゲシ <i>Papaver bracteatum</i> Lindl.	A	A

麻薬及び向精神薬取締法指定種

【原産】イラン 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 芝山町, 極少 【形態・生態】冬緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】210:平成以前 【県内侵入】210:平成以前 【影響】210麻薬及び向精神薬取締法指定種 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底 【備考】別名ボタンゲシ 【文献全般】312 【文献県内】39

種子植物	ケシ科	影響度	緊急度
164	ナガミヒナゲシ <i>Papaver dubium</i> L.	B	B

【原産】地中海沿岸,欧州中部 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 主として北総の平野部に分布, 極多 【形態・生態】冬緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1961年 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,285,286,302,317,319,311,312,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	ケシ科	影響度	緊急度
165	モンツキナガミヒナゲシ(仮称) <i>Papaver dubium</i> L. form. prov.	B	B

【原産】地中海沿岸,欧州中部 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 野田市, 極少, ナガミヒナゲシのなかに稀に混じる 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】-:平成以前 【県内侵入】210:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】岩槻秀明.2008.モンツキナガミヒナゲシ(仮称)の発見.千葉県植物誌資料24:218.

種子植物	ケシ科	影響度	緊急度
166	トゲミゲシ <i>Papaver hybridum</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸,欧州中部 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 市川, 極少 【形態・生態】冬緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】210:1961年 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,241,238,239,109,286,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39,34,368

種子植物	ケシ科	影響度	緊急度
167	オニゲシ <i>Papaver orientale</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】全国で栽培 【県内分布】分布度a 佐倉, 極少 【形態・生態】冬緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:昭和以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241,302,317,319,331,202 【文献県内】39

種子植物	ケシ科	影響度	緊急度
168	ヒナゲシ <i>Papaver rhoeas</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】全国で栽培 【県内分布】分布度a 北総に散在, 極少 【形態・生態】冬緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,331,202,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	ケシ科	影響度	緊急度
169	アツミゲシ <i>Papaver setigerum</i> L.	あへん法指定種 A	A

【原産】北アフリカ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 船橋, 少ない 【形態・生態】夏緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】210:1964年 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】210あへん法指定種. 麻薬成分がある 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】232,241,239,109,285,286,317,319,311,312,331,202,349,344 【文献県内】39,吉川代之助.1974.千葉の新帰化植物アツミゲシとノスズメノテッポウ.植物採集ニュース(74):24.

種子植物	ヤブケマン科	影響度	緊急度
170	カラクサケマン <i>Fumaria officinalis</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 南房総市, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1981年 【県内侵入】210:平成以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,241,239,285,286,302,317,319,311,312,202,349,344 【文献県内】-

種子植物	フウチョウソウ科	影響度	緊急度
171	キバナヒメフウチョウ <i>Cleome icosandora</i> L.	D	C

【原産】熱帯アジア 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市に一時帰化, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 夏 【国内侵入】250: 平成以前 【県内侵入】250: 平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止, 県内土壌で育苗する, 輸送時の洗浄, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】286,317,312,326,202 【文献県内】39

種子植物	フウチョウソウ科	影響度	緊急度
172	アフリカフウチョウソウ <i>Cleome rutidosperma</i> DC.	C	B

【原産】熱帯アフリカ 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 市川市, 船橋市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】250: 1999年 【県内侵入】250: 平成 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止, 県内土壌で育苗する, 輸送時の洗浄, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】ヒメムラサキフウチョウとしてあるデータを入れれば、県内でときおりみかける 【文献全般】286,317,312,40 【文献県内】39

種子植物	フウチョウソウ科	影響度	緊急度
173	セイヨウフウチョウソウ <i>Cleome spinosa</i> L.	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】各地で栽培 【県内分布】分布度b 北総各地に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 1870年頃 【県内侵入】161: 明治以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,241,60,109,285,286,302,317,319,331,202,165,349 【文献県内】263,39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
174	アレチナズナ <i>Alyssum alyssoides</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋など東京湾岸に散在, 極少 【形態・生態】冬緑・2年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 夏 【国内侵入】210: 1961年 【県内侵入】210: 1969年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,238,239,285,286,302,311,312,40,202,349,344 【文献県内】267,269,39,34,366

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
175	シロイヌナズナ <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	C	C

【原産】ユーラシア 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 北総の市街地に散在, 極多 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】220: 不明(日本原産の可能性あり) 【県内侵入】220: 昭和以前 【影響】200,280シバ地 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】81,222,109,272,286,317,312,202,165 【文献県内】214,39,大野景徳・竹内美亀.1995.シロイヌナズナが八千代市に生育する.千葉県植物誌資料3:8.,田井中 信子.1995.千葉市内のシロイヌナズナ.千葉県植物誌資料3:8.,大場達之.1995.シロイヌナズナ蛇足.千葉県植物誌資料3:8.

種子植物	アブラナ科	国内外来生物	影響度	緊急度
176	ミヤマハタザオ <i>Arabis lyrata</i> L. var. <i>kamtschatica</i> Fischer		D	C

【原産】日本,北東アジア 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 船橋(一時帰化?), 極少 【形態・生態】夏緑・草本 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】240:日本原産 【県内侵入】240:昭和 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
177	セイヨウワサビ <i>Armoracia rusticana</i> P.Gaert., B.May. et Schreb."	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 柏市,富里市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:明治 【県内侵入】110:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,238,239,60,109,285,286,302,319,311,312,40,202,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	要注意外来生物(情報不足), 生態学会100	影響度	緊急度
178	ハルザキヤマガラシ <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.		C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総の市街地に散在, 中程度 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:明治 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】150 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,165,349,344 【文献県内】142,39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
179	カラシナ <i>Brassica juncea</i> Czern.	B	B

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総に分布, 極多 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161,220:1976年以前 【県内侵入】161,220:昭和30年代後半以降 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,94,232,239,60,109,285,286,302,319,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
180	セイヨウアブラナ <i>Brassica napus</i> L.	B	B

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】110:明治 【県内侵入】110:昭和 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】214,39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
181	クロガラシ <i>Brassica nigra</i> Koch	D	C

【原産】欧州～西アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 富里市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草
 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1947年以前 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,238,60,109,285,286,319,311,349,344 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	国内外来生物	影響度	緊急度
182	アブラナ <i>Brassica rapa</i> L.		D	C

【原産】日本で育種 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 北総の市街地,ワイルドフラワーの残存, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草
 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:昭和 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】ハナナを含む
 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
183	ハリゲナタネ <i>Brassica tournefortii</i> Gouan	C	A

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度a 柏市,流山市, 中程度. 柏市中心にふえており、一面群生し、微細なとげがある 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1978年以前 【県内侵入】210:平成 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】285,286,312 【文献県内】木村陽子・蓮見和子・小土井智行.2007.ハリゲナタネの千葉県での分布状況.千葉県植物誌資料23:202-203.

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
184	オニハマダイコン <i>Cakile edentula</i> (Bigel.) Hook.	A	A

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 銚子市,いすみ市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:海散:夏 【国内侵入】240:1981年 【県内侵入】400(海流):2007年以前 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,60,285,286,311,312,40,202,349 【文献県内】鶴岡繁・木村陽子.2008.ハマベンケイソウ(ムラサキ科)銚子に出現.千葉県植物誌資料24:226-228. (タイトルにははいっていないがこの中でオニハマダイコンも新産報告)

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
185	アマナズナ <i>Camelina alyssum</i> Thell.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 成田市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1956年頃 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,241,222,238,60,109,286,302,317,319,311,312,202,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
186	ヒメアマナズナ <i>Camelina microcarpa</i> Andr. et DC.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,九州 【県内分布】分布度a 袖ヶ浦市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】210:1957年 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】267,269,39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
187	ミチタネツケバナ <i>Cardamine hirsuta</i> L.	C	C

【原産】欧州～東アジア 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度b 主として北総に分布, 極多 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散:夏 【国内侵入】210:1988年 【県内侵入】210:平成以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,60,109,285,286,317,319,312,40,202,349 【文献県内】214,39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
188	コタネツケバナ <i>Cardamine parviflora</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,九州 【県内分布】分布度a 成田市, 極多 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1952年 【県内侵入】210:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,202,71,349,344 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
189	アコウゲンバイ <i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度a 市川市,富津市, 少ない 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1951年 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】238,109,285,286,302,317,319,311,312,202,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
190	ツノミナズナ <i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.	D	C

【原産】地中海東部～中央アジア 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 習志野市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】250:1953年 【県内侵入】250:1953年 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,109,285,286,302,311,312,40,202,349,344 【文献県内】34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
191	ナタネハタザオ <i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 船橋市,君津市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1952年以前 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,286,302,317,311,312,202,78,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
192	カラクサナズナ <i>Coronopus didymus</i> (L.) J.E.Smith	C	C

【原産】南米,欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総と南総の海岸に分布, 中程度 【形態・生態】冬緑・一年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1930年 【県内侵入】210:昭和50年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,349,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
193	クジラグサ <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Pran.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 北総に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑または冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏・秋 【国内侵入】210:1899年以前 【県内侵入】210:昭和50年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
194	キバナスズシロ <i>Eruca sativa</i> Miller	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 袖ヶ浦市, 極少 【形態・生態】夏緑または冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏または秋 【国内侵入】210:1987年以前 【県内侵入】210:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,286,302,317,319,312,40,202 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
195	オハツキガラシ <i>Erucastrum gallicum</i> O. E. Schulz	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総に散在, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1970年代以前 【県内侵入】210:1970年代以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,241,238,239,60,109,285,286,317,311,312,40,202,349,344 【文献県内】269,39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
196	エゾスズシロ <i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア, 北米 【国内分布】北海道(自生?), 本州, 四国 【県内分布】分布度a 成田市, 少ない 【形態・生態】冬緑または夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏・秋 【国内侵入】210: 不明 【県内侵入】210: 平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】238, 239, 272, 285, 286, 302, 317, 312, 40, 165 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	国内外来生物	影響度	緊急度
197	ワサビ <i>Eutrema japonica</i> (Miq.) Koidz.		D	C

【原産】日本 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 市原市, 少ない 【形態・生態】夏緑・草本 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】110: 日本原産 【県内侵入】110: 明治以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 222, 109, 272, 302, 332 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
198	ウロコナズナ <i>Lepidium campestre</i> R. Br.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 東京湾岸と北総台地に散在, 少ない 【形態・生態】冬緑または夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 夏・秋 【国内侵入】210: 1950年 【県内侵入】210: 昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 232, 238, 239, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 349, 344 【文献県内】39, 34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
199	コシミノナズナ <i>Lepidium perfoliatum</i> L.	D	C

【原産】欧州～西アジア 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 茂原市, 少ない 【形態・生態】冬緑または夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏・秋 【国内侵入】210: 1920年以前 【県内侵入】210: 1932年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 241, 238, 239, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 71, 78, 349, 344 【文献県内】39, 34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
200	ニセマメゲンバイナズナ <i>Lepidium pinnatifidum</i> Ledeb.	D	C

【原産】中欧 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 千葉市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】210: 1995年以前 【県内侵入】210: 1995年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
201	マメゲンバイナズナ <i>Lepidium virginicum</i> L.	C	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 極多 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏・秋 【国内侵入】210:1892年前後 【県内侵入】210:明治～昭和30年代 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,319,311,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,269,39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
202	ニワナズナ <i>Lobularia maritima</i> Desv.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】全国で栽培 【県内分布】分布度a 北総に散在,ワイルドフラワーの残存, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草,多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:明治以降 【県内侵入】161:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,302,319,312,40,331,202,165 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
203	ゴウダソウ <i>Lunaria annua</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】全国で栽培 【県内分布】分布度a 富里市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:1901年 【県内侵入】161:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,238,60,109,285,286,302,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
204	オランダガラシ <i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	A	A

要注意外来生物(情報不足)

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 極多 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,枝がちぎれて栄養繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】110:1870年頃 【県内侵入】110:昭和20年代以前 【影響】121,350 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】クレソンとして栽培 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,101,109,285,286,302,316,317,319,311,312,40,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
205	タマガラシ <i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. var. <i>thratica</i> (Valen.) Bornm.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 船橋市,松戸市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:昭和初期 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,241,238,239,286,302,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
206	シヨカツサイ <i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O.E.Schulz	C	C

【原産】中国 【国内分布】全国で栽培 【県内分布】分布度b 主として北総・南総に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:1940年代 【県内侵入】161:昭和以降 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】逸出しやすい,花ゲリラと称し、空き地にまかれることがあった. 別名:オオアラセイトウ,ムラサキハナナ,ハナダイコン,シキンサイ 【文献全般】94,232,241,286,302,317,312,40,190,71,165 【文献県内】214,269,39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
207	セイヨウノダイコン <i>Raphanus raphanistrum</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 船橋・北総に散在, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:水散:夏 【国内侵入】210:1929年以前 【県内侵入】210:1950年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
208	ミヤガラシ <i>Rapistrum rugosum</i> All. var. <i>venosum</i> DC.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1941年以前 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
209	ミミヌガラシ <i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 佐倉市,船橋市,酒々井町, 少ない 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1974年 【県内侵入】210:昭和40年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,239,109,286,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
210	キレハヌガラシ <i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 北総に散在, 少ない. 東葛地方では散見される 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1963年 【県内侵入】210:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
211	シロガラシ <i>Sinapis alba</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 船橋市,富里市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:明治中期 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,239,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
212	ノハラガラシ <i>Sinapis arvensis</i> L.	A	A

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度b 船橋市,富里市,我孫子市,銚子市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1928年 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】210(有毒) 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,60,109,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
213	ハタザオガラシ <i>Sisymbrium altissimum</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・草本 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1926年以前 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
214	ホソエガラシ <i>Sisymbrium irio</i> L.	D	C

【原産】欧州南部 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1955年 【県内侵入】220:昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】94,232,238,109,285,286,317,319,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
215	ハマカキネガラシ <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 野田市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1902年以前 【県内侵入】220:昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,232,222,238,286,302,319,202,349,344 【文献県内】317,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
216	ケカキネガラシ <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>officinale</i>	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草
【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1902年? 【県内侵入】220:昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】109,286,312 【文献県内】39

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
217	イヌカキネガラシ <i>Sisymbrium orientale</i> L.	C	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草
【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1912年 【県内侵入】220:昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】263,269,39,34

種子植物	アブラナ科	影響度	緊急度
218	ゲンバイナズナ <i>Thlaspi arvense</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総に分布, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草
【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散:夏 【国内侵入】210:江戸 【県内侵入】210:明治～昭和30年代 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,239,60,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	スズカケノキ科	影響度	緊急度
219	アメリカスズカケノキ <i>Platanus occidentalis</i> L.	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 鴨川市, 極少 【形態・生態】落葉高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋
【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,332 【文献県内】39

種子植物	スズカケノキ科	影響度	緊急度
220	スズカケノキ <i>Platanus orientalis</i> L.	D	C

【原産】中国 【国内分布】全国(栽培) 【県内分布】分布度b 各地に栽培, 極少 【形態・生態】落葉高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋
【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,332 【文献県内】39

種子植物	スズカケノキ科	影響度	緊急度
221	モミジバスズカケノキ <i>Platanus x acerifolia</i> Willd.	D	C

【原産】雑種由来の園芸種 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 極少 【形態・生態】落葉高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,332 【文献県内】39

種子植物	マンサク科	国内外来生物	影響度	緊急度
222	イスノキ <i>Distylium racemosum</i> Siebold et Zucc.		D	C

【原産】日本,台湾,中国 【国内分布】本州西部,四国,九州 【県内分布】分布度a 主として東京湾側の平地に散在, 極少 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】自生:日本原産 【県内侵入】161,132:明治以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】336,273,332 【文献県内】39

種子植物	ベンケイソウ科	国内外来生物	影響度	緊急度
223	オノマンネングサ <i>Sedum lineare</i> Thunb.		D	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州(栽培も含む) 【県内分布】分布度b 各地に散在, 中程度 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:江戸? 【県内侵入】161:江戸? 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241,222,109,286,317,312,165 【文献県内】39

種子植物	ベンケイソウ科	国内外来生物	影響度	緊急度
224	マルバマンネングサ <i>Sedum makinoi</i> Maxim.		D	C

【原産】日本 【国内分布】本州(西部),四国,九州(自生) 【県内分布】分布度a 主として北総東部に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】自生:日本原産 【県内侵入】161:江戸? 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,109,272,302,332,190,165 【文献県内】39,34

種子植物	ベンケイソウ科	影響度	緊急度
225	メキシコマンネングサ <i>Sedum mexicanum</i> Britton	C	C

【原産】中国東部?メキシコは経由地 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:1969年 【県内侵入】161:昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,109,272,285,286,317,312,40,202,71,165 【文献県内】214,39

種子植物	ベンケイソウ科	影響度	緊急度
226	ツルマンネングサ <i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	C	C

【原産】朝鮮～中国北部 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に分布, 中程度 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:風散:夏 【国内侵入】161:1941年以前 【県内侵入】161:昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,311,312,40,332,202,165,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	ベンケイソウ科	影響度	緊急度
227	ヨコハママンネングサ <i>Sedum</i> sp.	C	C

【原産】不明 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 少ない 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:風散:夏 【国内侵入】240:平成 【県内侵入】240:平成 【影響】121 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】109,317,312,202 【文献県内】岩槻秀明.2007.千葉県野田市でヨコハママンネングサ確認.千葉県植物誌資料23:204.

種子植物	ベンケイソウ科	影響度	緊急度
228	オカタイトゴメ <i>Sedum uniflorum</i> Hook. et Arnott subsp. <i>oryzifolium</i> (Makino) H.Ohba var. <i>pumilum</i> H.Ohba	C	C

【原産】中国? 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 各地に分布, 多い 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:風散:夏 【国内侵入】161:1980年代以降? 【県内侵入】161:平成以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,109,317,319,312,202 【文献県内】214,39

種子植物	ベンケイソウ科	国内外来生物	影響度	緊急度
229	メノマンネングサ <i>Sedum uniflorum</i> subsp. <i>japonicum</i> (Siebold) H. Ohba		D	C

【原産】本州,四国,九州(自生) 【国内分布】本州,四国,九州(自生) 【県内分布】分布度a 富里市,富津市, 少ない 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:風散:夏 【国内侵入】自生:日本原産 【県内侵入】161:昭和以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,222,272,190 【文献県内】39

種子植物	バラ科	影響度	緊急度
230	イワムシロ <i>Aphanes arvensis</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州,九州 【県内分布】分布度a 市原市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草また夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:着散:夏 【国内侵入】220:1960年 【県内侵入】220:2009年 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】侵入確認:2009.7.11 小土井智行(県内2例目) 【文献全般】238,286,302,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39,平田和弘.2000.イワムシロ__帰化植物の悲しいサダメ__.千葉県植物誌資料15:110-111.

種子植物	バラ科	国内外来生物	影響度	緊急度
231	ソメイヨシノ		C	C
<i>Cerasus x yedoensis</i> (Matsum.) A.V.Vassil. (syn. <i>Prunus x yedoensis</i> Matsum.)				

【原産】日本・交雑種 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 各地に栽培, 多い(逸出は極少) 【形態・生態】落葉高木 【繁殖】花粉: 虫媒・鳥媒, 種子: 食散: 夏 【国内侵入】交雑選抜:- 【県内侵入】161 大部分は植栽: 明治 【影響】141, 100 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 336, 232, 109, 300, 331, 332, 190 【文献県内】39, 34

種子植物	バラ科	影響度	緊急度
232	ビワ <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 各地に分布, 少ない 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 夏 【国内侵入】110: 江戸以前 【県内侵入】110: 江戸 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 232, 109, 273, 300, 317, 332, 165 【文献県内】39, 34

種子植物		バラ科			
233	カナメモチ			影響度	緊急度
				D	C
		Photinia glabra (Thunb. ex Murray) Maxim.			

【原産】中国, 本州西部, 四国(自生), 九州(自生) 【国内分布】本州西部, 四国(自生), 九州(自生) 【県内分布】分布度b 主として北総に散在, 少ない 【形態・生態】常緑・中高木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】自生: 日本原産 【県内侵入】161, 132: 江戸 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり, 公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止, 地域個体群の遺伝的多様性を保持した種苗の植栽, 方針策定 【備考】- 【文献全般】336, 232, 292, 300, 332, 165 【文献県内】39, 34

種子植物	バラ科	国RDB:CR	影響度	緊急度
234	オオカナメモチ		D	C
<i>Photinia serrulata</i> Lindl.				

【原産】中国, フィリピン, 台湾, 琉球 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 富津市, 市原市, 富里市, 極少 【形態・生態】常緑・中高木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】161, 132: 昭和以前 【県内侵入】161: 昭和以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 273, 300, 332, 71 【文献県内】39

	種子植物	バラ科		
235	コバナキジムシロ		影響度	緊急度
	<i>Potentilla amurensis</i> Maxim.		C	C

【原産】中国北部～朝鮮半島 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 主として利根川沿いに散在, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】220: 1930年以前 【県内侵入】220: 1960年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】81, 94, 238, 239, 60, 109, 285, 302, 311, 312, 40, 202, 349, 344 【文献県内】263, 39, 34

種子植物	バラ科	影響度	緊急度
236	ハイキジムシロ <i>Potentilla anglica</i> Laichard.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 八千代市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1997年 【県内侵入】220:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,109,286,317,311,312,40,202 【文献県内】39,大野景德.2000.八千代市に帰化したハイキジムシロ,ナガエコミカンソウ,アメリカカシグサ.千葉県植物誌資料15:108-109.

種子植物	バラ科	国内外来生物	影響度	緊急度
237	ミツモトソウ <i>Potentilla cryptotaeniae</i> Maxim. var. <i>insularis</i> Kitag.		D	C

【原産】日本 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 市原市, 少ない. 在来種の国内帰化? 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】自生:日本原産 【県内侵入】220:1989年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】94,109,272,302,165 【文献県内】39

種子植物	バラ科	影響度	緊急度
238	オキジムシロ <i>Potentilla paradoxa</i> Nutt.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 各地に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1950年以前 【県内侵入】220:1959年 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	バラ科	影響度	緊急度
239	オオヘビイチゴ <i>Potentilla recta</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 主として北総西部に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161,220:明治中期(栽培) 【県内侵入】220:1957年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,241,238,239,60,109,285,286,302,319,311,312,40,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	バラ科	影響度	緊急度
240	タチバナモドキ <i>Pyracantha angustifolia</i> Schneid.	B	B

【原産】中国西南部 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 少ない 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:冬 【国内侵入】161,132:1890年頃 【県内侵入】161,132:昭和初期(栽培) 【影響】121,280(果実が目だつ) 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,地域個体群の遺伝的多様性を保持した種苗の植栽,方針策定 【備考】- 【文献全般】94,336,241,60,109,286,317,319,312,40,331,202,165,349 【文献県内】263,39

種子植物	バラ科	影響度	緊急度
241	トキワサンザシ <i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	B	B

【原産】西アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 少ない 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:冬 【国内侵入】161,132:明治 【県内侵入】161,132:昭和初期(栽培) 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,地域個体群の遺伝的多様性を保持した種苗の植栽,方針策定 【備考】- 【文献全般】336,109,286,317,312,331,202 【文献県内】39

種子植物	バラ科	影響度	緊急度
242	カザンデマリ <i>Pyracantha crenulata</i> Roem.	B	B

【原産】ヒマラヤ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総西部に散在, 少ない 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:冬 【国内侵入】161,132:昭和初期 【県内侵入】161,132:平成以前 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,地域個体群の遺伝的多様性を保持した種苗の植栽,方針策定 【備考】- 【文献全般】336,109,286,317,331,202 【文献県内】214,39

種子植物	バラ科	国内外来生物	影響度	緊急度
243	シャリンバイ <i>Rhaphiolepis umbellata</i> (Thunb.) Makino		B	B

【原産】本州西部,四国,九州(自生) 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部と安房の海岸, 少ない 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:冬 【国内侵入】自生:日本原産 【県内侵入】161,132:昭和 【影響】141,121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,地域個体群の遺伝的多様性を保持した種苗の植栽,方針策定 【備考】- 【文献全般】336,232,222,109,273,300,332,71,165 【文献県内】39,34

種子植物	バラ科	国内外来生物	影響度	緊急度
244	シロヤマブキ <i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	国RDB,EN	D	C

【原産】中国,朝鮮半島,日本(中国地方・自生) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 主として北総に散在, 極少 【形態・生態】落葉低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161(自生もあり):江戸,日本原産 【県内侵入】161,132:昭和以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,地域個体群の遺伝的多様性を保持した種苗の植栽,方針策定 【備考】- 【文献全般】336,241 【文献県内】39

種子植物	バラ科	影響度	緊急度
245	オニクロイチゴ <i>Rubus argutus</i> Link	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 佐倉市, 少ない 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:食散:夏 【国内侵入】161:1999年以前 【県内侵入】161:1999年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】202 【文献県内】214,39

種子植物	バラ科	影響度	緊急度
246	セイヨウヤブイチゴ <i>Rubus fruticosus</i> L.	B	B

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 柏市,千葉市, 少ない 【形態・生態】夏緑・低木,川岸などで広範囲にひろがる 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:食散:夏 【国内侵入】161:1950年以前 【県内侵入】161:昭和末期以前 【影響】121,220(トゲあり) 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,241,222,239,60,109,285,286,317,319,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】263,39

種子植物	バラ科	影響度	緊急度
247	ユキヤナギ <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume	C	C

【原産】中国,本州,四国,九州(自生?) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総・南総に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161,132:日本原産? 【県内侵入】161,132:江戸? 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,地域個体群の遺伝的多様性を保持した種苗の植栽,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,94,336,109,190,165 【文献県内】214,39

種子植物	マメ科	要注意外来生物(緑化植物), 生態学会100	影響度	緊急度
248	イタチハギ <i>Amorpha fruticosa</i> L.		B	B

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】131,160:大正 【県内侵入】131:昭和30年代前半以降 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,94,336,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
249	アメリカホドイモ <i>Apios americana</i> Medic.	D	C

【原産】北米東南部 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 富里市,柏市,大多喜町(栽培), 少ない 【形態・生態】夏緑・つる性草本 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:明治中期 【県内侵入】161:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,238,239,101,286,302,317,312,40,202 【文献県内】263,39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
250	ゲンゲ <i>Astragalus sinicus</i> L.	C	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地で栽培,一部逸出, 中程度(栽培は極多) 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散:夏 【国内侵入】161:室町 【県内侵入】161:明治 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,222,109,285,286,302,317,312,326,40,78,165 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
251	コヤシタヌキマメ <i>Crotalaria juncea</i> L.	D	C

【原産】インド 【国内分布】九州, 関東 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少 【形態・生態】夏緑・一年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 秋 【国内侵入】110: 2006年以前 【県内侵入】110: 2006年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
252	オオミツバタヌキマメ <i>Crotalaria pallida</i> Ait. var. <i>obovata</i> (G. Don) Polhill	D	C

【原産】熱帯アジア〜ポリネシア 【国内分布】本州, 九州 【県内分布】分布度a 船橋, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 秋 【国内侵入】161: 江戸(栽培) 【県内侵入】161: 平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241, 286, 302, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 349 【文献県内】213, 39

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
253	アフリカタヌキマメ <i>Crotalaria zanzibrica</i> Benth.	D	C

【原産】東アフリカ 【国内分布】九州, 関東 【県内分布】分布度a 芝山町, 佐原市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 秋 【国内侵入】110: 1996年以前 【県内侵入】110: 1996年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
254	カワリバマキエハギ <i>Desmodium heterophyllum</i> (Willd.) DC.	D	C

【原産】アジア南部, オーストラリア, アフリカ 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市で一時帰化, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 着散: 秋 【国内侵入】250: 1970年以前 【県内侵入】250: 1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止, 県内土壌で育苗する, 輸送時の洗浄, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】71 【文献県内】39

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
255	アレチヌスビトハギ <i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.	C	B

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 着散: 秋 【国内侵入】240: 1940年 【県内侵入】240: 昭和40年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 311, 312, 40, 202, 78, 349, 344 【文献県内】214, 39

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
256	ハイマキエハギ <i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	D	C

【原産】南アジア,小笠原,琉球(自生) 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市で一時帰化, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:着散:秋 【国内侵入】250:日本原産 【県内侵入】250:1999年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】312,71 【文献県内】213,39

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
257	ニワフジ <i>Indigofera decora</i> Lindl.	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 各地に散在,各地で栽培, 極少 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,272,302,331,332,190 【文献県内】39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
258	キダチコマツナギ(仮称) <i>Indigofera pseudotinctoria</i> Matsum.	B	B

【原産】中国 【国内分布】本州,主として全国に分布 【県内分布】分布度b 南房総市, 少ない 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散:秋 【国内侵入】131:平成以前 【県内侵入】131:平成10年以降 【影響】141,121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,方針策定 【備考】学名に問題があり、現在の所コマツナギの学名と同じになってしまう.形態で中国産は区別できる 【文献全般】- 【文献県内】木村陽子.2007.キダチコマツナギ(大型コマツナギ)が流山市で記録.千葉県植物誌資料22:194-196.

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
259	セイヨウミヤコグサ <i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散:夏 【国内侵入】220:1946年以前 【県内侵入】220:昭和末期以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,165,349,344 【文献県内】269,39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
260	ネビキミヤコグサ <i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	D	C

【原産】欧州〜アフリカ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 千葉市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散:夏 【国内侵入】250:1974年 【県内侵入】250:1982年 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,239,60,109,285,286,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
261	ワタリミヤコグサ <i>Lotus tenuis</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	D	C
【原産】欧州～アフリカ 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 白井市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:自散:夏 【国内侵入】250:1970年頃 【県内侵入】250:1973年 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,241,239,60,109,285,286,317,319,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】39,34			

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
262	コメツブウマゴヤシ <i>Medicago lupulina</i> L.	C	C
【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 各地に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草また冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:重散:夏 【国内侵入】160:江戸 【県内侵入】160:1927年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,109,285,286,302,319,311,312,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34			

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
263	コウマゴヤシ <i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	C	C
【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として海岸部に散在, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:重散:夏 【国内侵入】160:1868年前後 【県内侵入】160:1923年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】269,39,34			

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
264	ウマゴヤシ <i>Medicago polymorpha</i> L.	C	C
【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:着散:夏 【国内侵入】160:江戸 【県内侵入】160:1923年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,202,71,78,165,349,344 【文献県内】39,34			

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
265	ムラサキウマゴヤシ <i>Medicago sativa</i> L.	C	C
【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 牧草として栽培, 少ない. 牧草として極多 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:重散:夏 【国内侵入】160:1870年前後 【県内侵入】160:1931年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】263,39,34			

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
266	コシナガワハギ <i>Melilotus indica</i> (L.) All.	C	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主に北総西部に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1939年以前 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,78,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
267	シロバナシナガワハギ <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>alba</i> (Medic.) H. Ohashi et Tateishi	C	C

【原産】中央アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主に北総西部に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】160:江戸末期 【県内侵入】160:昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,78,349,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
268	シナガワハギ <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H. Ohashi	C	C

【原産】アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総及び南総・安房の海岸部, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】160江戸時代,ユーラシアから:1856年以前 【県内侵入】160:昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,285,286,302,317,319,311,326,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	マメ科	要注意外来生物(緑化植物), 生態学会100	影響度	緊急度
269	ハリエンジュ <i>Robinia pseudoacacia</i> L.		A	B

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,地下の根から栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】110,161:1877年頃 【県内侵入】110,161:昭和初期栽培? 【影響】120,121,123 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり,販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,60,109,300,317,319,311,312,202,71,78,165,349 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
270	ミヤコグサモドキ <i>Rothia indica</i> (L.) Thuan	D	C

【原産】アジア南部,東南アジア,オーストラリア 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市に一時帰化, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散:秋 【国内侵入】250:1999年以前 【県内侵入】250:1999年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】39

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
271	タマザキクサフジ <i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 四街道市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散:夏 【国内侵入】210:1951年 【県内侵入】210:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】文献情報なし,標本CBM(四街道市 2006.6.10 BS-234409) 【文献全般】81,94,109,285,286,311,312,40,202,349 【文献県内】-

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
272	アメリカツノクサネム <i>Sesbania exaltata</i> (Raf.) Rydb.ex A.W.Hill	D	C

【原産】北米,中米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主に北総西部に分布, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1953年 【県内侵入】250:1988年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】263,39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
273	トガリバツメクサ <i>Trifolium angustifolium</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 市川市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】250:1953年 【県内侵入】250:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,232,238,239,60,285,286,302,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
274	シャグマハギ <i>Trifolium arvense</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 千葉市,富里市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1950年代 【県内侵入】220:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,232,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】39

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
275	クスダマツメクサ <i>Trifolium campestre</i> Schreb.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主に北総西部に分布, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1943年 【県内侵入】220:昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,232,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
276	コメツブツメクサ <i>Trifolium dubium</i> Sibth.	C	C

【原産】欧州～西アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 極多 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1935年 【県内侵入】220:昭和初期後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,94,232,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
277	ツメクサダマシ <i>Trifolium fragiferum</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 千葉市,佐倉市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1939年以前 【県内侵入】220:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,94,232,238,239,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】34,202

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
278	タチオランダゲンゲ <i>Trifolium hybridum</i> L.	D	C

【原産】欧州～西アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総,南総西部, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】160:明治 【県内侵入】160:昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,269,39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
279	ベニバナツメクサ <i>Trifolium incarnatum</i> L.	D	C

【原産】欧州～西アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主に北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】園芸植物として栽培されている(ストロベリー・トーチ) 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
280	ムラサキツメクサ <i>Trifolium pratense</i> L.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県の分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】160:1868年前後 【県内侵入】160:昭和初期以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34,木村陽子・岩槻秀明.2007.野田市で採集された無花弁・重萼型ムラサキツメクサと遺伝子変異.千葉県植物誌資料23:205.

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
281	シロツメクサ <i>Trifolium repens</i> L.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】160:江戸 【県内侵入】160:昭和初期以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
282	ヒナツメクサ <i>Trifolium resupinatum</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州,九州 【県内分布】分布度a 富津市,市原市,流山市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1952年 【県内侵入】210:1992年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】238,109,286,302,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39,木村陽子・引田園子・関口晋太郎.2007.流山市に出現したヒナツメクサとコメバミソハギ.千葉県植物誌資料22:191-194.

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
283	オオカラスノエンドウ <i>Vicia sativa</i> L. var. <i>sativa</i>	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 市川市,芝山町, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散:夏 【国内侵入】160:大正 【県内侵入】160:昭和初期 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,238,60,109,302,319,311,312,40,71,78,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
284	イブキノエンドウ <i>Vicia sepium</i> L.	D	C

【原産】ヨーロッパ 【国内分布】四国,近畿,中部,関東,北海道 【県内分布】分布度a 茂原市,君津市, 極少 【形態・生態】夏緑・一年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散:夏 【国内侵入】160:明治年間 【県内侵入】160:明治年間 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
285	ナヨクサフジ <i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総に散在, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1943年以前 【県内侵入】220:1996年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】94,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	マメ科	影響度	緊急度
286	ビロードクサフジ <i>Vicia villosa</i> Roth.	D	C

【原産】ヨーロッパ, 西アジア, 北アフリカ 【国内分布】関東 【県内分布】分布度a 鴨川市, 白浜町, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 夏 【国内侵入】160: 明治年間 【県内侵入】160: 明治年間 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	カタバミ科	影響度	緊急度
287	イモカタバミ <i>Oxalis articulata</i> Savigny	C	C

【原産】南米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 塊茎で栄養繁殖, 種子: 自散: 夏~秋 【国内侵入】161: 1967年以前 【県内侵入】161: 1965年以前 【影響】121, 310 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】逸出をよくみかける 【文献全般】232, 241, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	カタバミ科	影響度	緊急度
288	ハナカタバミ <i>Oxalis bowiei</i> Lindl.	D	C

【原産】アフリカ南部 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 鱗茎で栄養繁殖, 種子: 自散: 夏 【国内侵入】161: 江戸末期 【県内侵入】161: 昭和20年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 232, 241, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 319, 311, 312, 40, 331, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 39

種子植物	カタバミ科	影響度	緊急度
289	ベニカタバミ <i>Oxalis brasiliensis</i> Lodd.	C	C

【原産】南米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 鱗茎で栄養繁殖, 種子: 自散: 夏~秋 【国内侵入】161: 1954年 【県内侵入】161: 1989年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】238, 239, 109, 285, 286, 317, 311, 312, 40, 331, 332, 202, 349, 344 【文献県内】263, 39, 34

種子植物	カタバミ科	影響度	緊急度
290	ムラサキカタバミ <i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig	B	B

要注意外来生物(情報不足)

【原産】南米 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 鱗茎で栄養繁殖, 種子: 自散: 夏 【国内侵入】161: 江戸末期 【県内侵入】161: 昭和初期以前 【影響】121, 310 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	カタバミ科	影響度	緊急度
291	オッタチカタバミ <i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主に北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 夏〜秋 【国内侵入】220: 1965年以前 【県内侵入】220: 1991年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】94, 232, 241, 239, 60, 109, 285, 286, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 349, 344 【文献県内】214, 39

種子植物	カタバミ科	影響度	緊急度
292	オオキバナカタバミ <i>Oxalis pes-caprae</i> L.	C	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 鴨川市, 千葉市, 少ない 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 鱗茎で栄養繁殖, 種子: 自散: 夏 【国内侵入】161: 1967年以前 【県内侵入】161: 1991年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241, 222, 239, 109, 285, 286, 302, 317, 312, 40, 332, 202, 71 【文献県内】39

種子植物	カタバミ科	影響度	緊急度
293	フヨウカタバミ <i>Oxalis variabilis</i> Jacq.	C	C

【原産】アフリカ南部 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 鴨川市, 千葉市, 少ない 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 鱗茎で栄養繁殖, 種子: 自散: 夏 【国内侵入】161: 1890年 【県内侵入】161: 1991年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】239, 285, 286, 302, 319, 311, 312, 40, 331, 332, 202, 349, 344 【文献県内】39

種子植物	フウロソウ科	影響度	緊急度
294	ツノミオランダフウロ <i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 市川市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 夏 【国内侵入】250: 1954年 【県内侵入】250: 1954年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】232, 238, 109, 286, 302, 319, 311, 312, 40, 202, 349, 344 【文献県内】39, 34

種子植物	フウロソウ科	影響度	緊急度
295	オランダフウロ <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Herit.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 夏 【国内侵入】250: 江戸 【県内侵入】250: 1967年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 78, 165, 349, 344 【文献県内】267, 39, 34

種子植物	フウロソウ科	影響度	緊急度
296	ジャコウオランダフウロ <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Herit.	D	C

【原産】ユーラシア(広域), アフリカ 【国内分布】本州, 四国 【県内分布】分布度a 市川市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 夏 【国内侵入】250: 1957年 【県内侵入】250: 1957年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81, 232, 238, 239, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 78, 349, 344 【文献県内】39

種子植物	フウロソウ科	影響度	緊急度
297	アメリカフウロ <i>Geranium carolinianum</i> L.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 夏〜秋 【国内侵入】210: 1932年 【県内侵入】210: 1981年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 39, 34

種子植物	フウロソウ科	影響度	緊急度
298	オトメフウロ <i>Geranium dissectum</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 南房総市, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 夏 【国内侵入】210: 1950年以前 【県内侵入】210: 2005年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 109, 286, 319, 311, 312, 40, 202, 349 【文献県内】寺村敬子. 2006. 印旛村岩戸でオトメフウロを確認. 千葉県植物誌資料21: 167-169.

種子植物	フウロソウ科	影響度	緊急度
299	チゴフウロ <i>Geranium pusillum</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州, 四国 【県内分布】分布度a 富津市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 夏 【国内侵入】210: 1932年 【県内侵入】210: 1969年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 232, 238, 239, 109, 286, 302, 319, 311, 312, 40, 202, 78, 349, 344 【文献県内】142, 39

種子植物	フウロソウ科	影響度	緊急度
300	ヒメフウロ <i>Geranium robertianum</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア, 北米, 南米 【国内分布】本州, 四国 【県内分布】分布度a 主として北総に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 自散: 夏〜秋 【国内侵入】161: 日本原産 【県内侵入】161: 1997年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 109, 317, 312 【文献県内】39

種子植物	アマ科	影響度	緊急度
301	ヒメアマ <i>Linum bienne</i> Miller.	D	C

【原産】中央アジア 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 八千代市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】220:1991年以前 【県内侵入】220:1991年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】39

種子植物	アマ科	影響度	緊急度
302	キバナノマツバニンジン <i>Linum medium</i> (Planch.) Britton	B	B

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】220:1943年以前 【県内侵入】220:1907年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,317,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	アマ科	影響度	緊急度
303	シュクコンアマ <i>Linum perenne</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 我孫子市,印西市(旧印旛村),市原市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:1977年以前(1933年栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】286,302,40,332,202,165 【文献県内】267,39,34

種子植物	アマ科	影響度	緊急度
304	アマ <i>Linum usitatissimum</i> L.	D	C

【原産】中央アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 船橋市,千葉市, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】110:江戸(元禄年間) 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,60,109,286,302,317,312,40,331,332,202,349 【文献県内】39,34

種子植物	トウダイグサ科	影響度	緊急度
305	オオバベニガシワ <i>Alchornea davidii</i> Franch.	D	C

【原産】中国南部 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 東京湾側都市部に散在, 極少 【形態・生態】落葉低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:昭和30年代以前 【県内侵入】161:1985年以前植栽? 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,241,286,312,332 【文献県内】39

種子植物	トウダイグサ科	影響度	緊急度
306	コニシキシソウ <i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	C	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 極多 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】210:1887年頃 【県内侵入】210:昭和初期以前 【影響】121,310 【緊急】- 【対策】適切な除草の徹底 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39

種子植物	トウダイグサ科	影響度	緊急度
307	コバノニシキシソウ <i>Chamaesyce makinoi</i> (Hayata) H. Hara	D	C

【原産】中国,台湾,フィリピン 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 鴨川市, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】210:1951年以前 【県内侵入】210:1951年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,286,312,40,202 【文献県内】39

種子植物	トウダイグサ科	影響度	緊急度
308	オオニシキシソウ <i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】210:1903年 【県内侵入】210:昭和10年代以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	トウダイグサ科	影響度	緊急度
309	ハイニシキシソウ <i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 館山市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】210:1954年以前 【県内侵入】210:1959年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,165,344 【文献県内】39

種子植物	トウダイグサ科	影響度	緊急度
310	アレチニシキシソウ <i>Chamaesyce</i> sp. aff. <i>prostrata</i> (Aiton) Small	C	B

【原産】熱帯アメリカ 【国内分布】関東以南? 【県内分布】分布度a 船橋市坪井町,八千代市高津,保品, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】220:- 【県内侵入】-:2009年 【影響】121 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】木村陽子.2009.船橋市に出現したアレチニシキシソウ.千葉県植物誌資料25:246-247.

種子植物	トウダイグサ科		影響度	緊急度
311	ショウジョウソウモドキ	CITES:II	C	B
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.				

【原産】北米-アルゼンチン 【国内分布】沖縄 【県内分布】分布度a 館山市,船橋市,大量繁殖の情報無し, 少ない? 【形態・生態】大型草本.トウダイグサに似るが、葉形は多型 【繁殖】花粉:中媒,種子:自散 【国内侵入】250:第二次世界大戦後 【県内侵入】250:1999年以前 【影響】沖縄では強害草化.ただし、冬寒い千葉で定着出来るかは不明 【緊急】- 【対策】抜き取り 【備考】標本CBM(BS316546,BS316570) 【文献全般】285 【文献県内】-

種子植物	トウダイグサ科		影響度	緊急度
312	チャボタイゲキ	CITES:II	C	C
<i>Euphorbia peplus</i> L.				

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 東葛には散見する, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1940年代 【県内侵入】210:2006年栽培? 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】238,109,285,286,302,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】寺村敬子.2004.佐倉市に帰化したチャボタイゲキ.千葉県植物誌資料20:156.,木村陽子.2004.流山市でもチャボタイゲキ出現.千葉県植物誌資料20:156.

種子植物	トウダイグサ科		影響度	緊急度
313	オガサワラコミカンソウ		D	C
<i>Phyllanthus debilis</i> Klein ex Willd.				

【原産】インド? 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市で一時帰化, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏~秋 【国内侵入】250:1999年以前 【県内侵入】250:1999年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】302,311,312,40,202,71,165 【文献県内】39

種子植物	トウダイグサ科		影響度	緊急度
314	ナガエコミカンソウ		C	C
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.				

【原産】インド洋マスカレーヌ諸島 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主に北総西部に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1992年 【県内侵入】250:1992年以前 【影響】300 【緊急】- 【対策】適切な除草,可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】別名ブラジルコミカンソウ 【文献全般】94,109,285,286,317,319,311,312,40,202 【文献県内】214,39,大野景德.2000.八千代市に帰化したハイキジムシロ、ナガエコミカンソウ、アメリカキカシグサ.千葉県植物誌資料15:108-109.

種子植物	トウダイグサ科		影響度	緊急度
315	トウゴマ		D	C
<i>Ricinus communis</i> L.				

【原産】アフリカ北東部 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総西部に散在, 極少 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:昭和初期以前栽培? 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,241,239,109,285,286,302,319,311,312,40,202,71,78,165,349 【文献県内】39

種子植物	トウダイグサ科	影響度	緊急度
316	ナンキンハゼ <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb. (syn. <i>Triadica sebifera</i> (L.) Small)	B	B

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 北総西部に分布, 極少 【形態・生態】夏緑・中高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:昭和初期以前栽培? 【影響】120,121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,60,273,286,300,312,332,202,165,349 【文献県内】214,39

種子植物	トウダイグサ科	影響度	緊急度
317	アブラギリ <i>Vernicia cordata</i> (Thunb.) Airy Shaw (syn. <i>Aleurites cordata</i> (Thunb.) R.Br. ex Stand.)	B	B

【原産】中国南部 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度c 主に南総と安房に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:昭和初期以前栽培? 【影響】150,121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241,286,300,319,311,332,202,71,78,165,349 【文献県内】214,263,39

種子植物	トウダイグサ科	影響度	緊急度
318	オオアブラギリ <i>Vernicia fordii</i> (Thunb.) Airy Shaw	D	C

【原産】中国南部 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 野田市, 極少 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:昭和初期 【県内侵入】110:昭和20年代栽培? 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】アブラギリとされている場合があるかもしれない 【文献全般】332,202,71 【文献県内】39

種子植物	ミカン科	影響度	緊急度
319	ユズ <i>Citrus junos</i> Siebold ex Tanaka	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 極少 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋~冬 【国内侵入】110:江戸以前 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,332,165 【文献県内】39

種子植物	ミカン科	影響度	緊急度
320	ナツダイダイ <i>Citrus natsudaidai</i> Hayata	D	C

【原産】山口県(海岸漂着) 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 南房総の丘陵に散在, 極少 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:冬 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:昭和(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,332 【文献県内】39

種子植物	ミカン科	影響度	緊急度
321	ウンシュウミカン <i>Citrus unshu</i> Marcovitch	D	C

【原産】鹿児島(中国から?) 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 富津市, 極少 【形態・生態】常緑・低木
 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 冬 【国内侵入】110: 江戸 【県内侵入】110: 昭和 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 300, 332 【文献県内】39

種子植物	ミカン科	影響度	緊急度
322	イヌゴシュユ <i>Euodia daniellii</i> (Benn.) Hesml.	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市, 極多 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋
 【国内侵入】161: 平成以前 【県内侵入】161: 2001年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336 【文献県内】39

種子植物	ミカン科	影響度	緊急度
323	ゴシュユ <i>Euodia ruticarpa</i> (A.Juss.) Benth.	D	C

【原産】中国, ヒマラヤ 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 北総に散在, 極少 【形態・生態】落葉低木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋
 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 232, 109, 273, 300, 317, 311, 312, 202, 78, 165 【文献県内】263, 39

種子植物	ミカン科	影響度	緊急度
324	ナガキンカン <i>Fortunella margarita</i> Swingle	D	C

【原産】中国? 栽培由来 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 冬
 【国内侵入】110: 江戸 【県内侵入】110: 昭和以前, 栽培 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 273, 300, 332 【文献県内】39

種子植物	ミカン科	影響度	緊急度
325	オオバノキハダ <i>Phellodendron amurense</i> Rupr. var. <i>japonicum</i> (Maxim.) Ohwi	D	C

【原産】本州(関東・中部) 【国内分布】関東・中部 【県内分布】分布度a 船橋市, 在来種の国内帰化? 極少 【形態・生態】落葉低木
 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】110: 日本原産 【県内侵入】110: 2000年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 273, 300 【文献県内】39

種子植物	ミカン科	影響度	緊急度
326	カラタチ <i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Rafin.	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県に散在, 極少 【形態・生態】落葉低木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 冬 【国内侵入】161: 奈良 【県内侵入】161: 江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 273, 300, 332 【文献県内】39

種子植物	ニガキ科	影響度	緊急度
327	ニワウルシ <i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle	C	B

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度b 北総に散在, 極少 【形態・生態】落葉高木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】161: 明治 【県内侵入】161: 昭和以前 【影響】280 【緊急】良く逸出する 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 109, 286, 302, 317, 312, 332, 190, 202, 71, 78, 165 【文献県内】214, 263, 39

種子植物	センダン科	影響度	緊急度
328	チャンチン <i>Cedrela sinensis</i> A.Juss. (syn. <i>Toona sinensis</i> (A.Juss.) Roem.)	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 千葉市, 極少 【形態・生態】落葉高木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 1920年代以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 232, 311, 312, 190, 202, 71, 78, 165 【文献県内】39

種子植物	センダン科	国内外来生物	影響度	緊急度
329	センダン <i>Melia azedarach</i> L. var. <i>subtripinnata</i> Miq.		C	C

【原産】ヒマラヤ, 日本 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 市川, 船橋でよく逸出, 有毒, 少ない 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 春～秋 【国内侵入】161: 日本原産? 【県内侵入】161: 1930年代以前 【影響】280, 121, 210 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 232, 109, 302, 317, 312, 71, 165 【文献県内】214, 263, 39

種子植物	ヒメハギ科	影響度	緊急度
330	ハリヒメハギ <i>Polygala ambigua</i> Nutt.	C	C

【原産】北米 【国内分布】千葉県, 神奈川県 【県内分布】分布度b 主として北総中央に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】220: 1931年以前 【県内侵入】220: 1931年以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】238, 109, 286, 311, 312, 40, 202, 78, 349 【文献県内】214, 39, 34

種子植物	ヒメハギ科	影響度	緊急度
331	クルマバヒメハギ <i>Polygala verticillata</i> L.	C	C

【原産】北米 【国内分布】千葉県 【県内分布】分布度b 主として北総中央に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】220:1976年 【県内侵入】220:1976年以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】286,311,312,40 【文献県内】39

種子植物	ウルシ科	影響度	緊急度
332	リュウキュウハゼ <i>Rhus succedanea</i> L.	C	B

【原産】中国,ヒマラヤ 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 少ない 【形態・生態】落葉高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:冬 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:1930年代以前 【影響】121 【緊急】良く逸出する 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,336,232,109,302,317,312,71,165 【文献県内】214,39

種子植物	ウルシ科	国内外来生物	影響度	緊急度
333	ウルシ <i>Rhus verniciflua</i> Stokes		D	C

【原産】中国,日本? 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県の丘陵に分布, 少ない 【形態・生態】落葉低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:冬 【国内侵入】110:奈良 【県内侵入】110:1920年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,232,241,300,317,312,78,165 【文献県内】214,263,39

種子植物	カエデ科	影響度	緊急度
334	トウカエデ <i>Acer buergerianum</i> Miq.	D	C

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総の都市部に分布, 極少 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:1950年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,109,302,317,312,202,165,349 【文献県内】214,39

種子植物	ムクロジ科	影響度	緊急度
335	フウセンカズラ <i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	D	C

【原産】全世界の熱帯 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 北総に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:1920年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,60,109,285,302,317,311,312,326,331,202,71,165,349 【文献県内】263,39

種子植物	ムクロジ科	影響度	緊急度
336	モクゲンジ <i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	D	C

【原産】中国,朝鮮半島 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 南総に散在, 極少 【形態・生態】落葉高木
 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:江戸以前 【県内侵入】161:1990年代以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,109,312,71,165 【文献県内】39

種子植物	ムクロジ科	影響度	緊急度
337	ムクロジ <i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	D	C

【原産】中国,東南アジア,インド 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県に分布, 極少 【形態・生態】夏緑・高木
 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散,食散:秋 【国内侵入】110:奈良 【県内侵入】110:1920年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,332 【文献県内】39

種子植物	ツリフネソウ科	影響度	緊急度
338	アカボシツリフネ <i>Impatiens capensis</i> Meerb.	A	A

【原産】北米 【国内分布】千葉県 【県内分布】分布度a 野田市, 多い. 利根運河などで大群落 【形態・生態】夏緑・1年草
 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散:秋 【国内侵入】161:1992年以前(千葉) 【県内侵入】161:1992年以前 【影響】121繁殖力強く、大型になるのでは、他の湿生植物を駆逐? 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】286,312,40 【文献県内】39

種子植物	ニシキギ科	国内外来生物?	影響度	緊急度
339	マサキ <i>Euonymus japonicus</i> Thunb. var. <i>japonicus</i>		D	C

【原産】北海道,本州,四国,九州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】常緑・低木
 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:冬 【国内侵入】161:日本原産 【県内侵入】161:明治以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,332 【文献県内】39

種子植物	ツゲ科	国内外来生物	影響度	緊急度
340	フッキソウ <i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.		D	C

【原産】北海道,本州,四国,九州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 八街市, 極少 【形態・生態】常緑・多年草
 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:食散:秋〜冬 【国内侵入】161:日本原産 【県内侵入】161:平成以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】逸出しているのは栽培型,分類学的に問題あり 【文献全般】94,109,272,302,332,190,165 【文献県内】39

種子植物	シナノキ科	影響度	緊急度
341	ツナソ <i>Corchorus capsularis</i> L.	D	C

【原産】インド,中国南部 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 南房総市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草
【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:明治以前 【県内侵入】110:1940年代以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】
管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312,40,165 【文献県内】39

種子植物	シナノキ科	影響度	緊急度
342	タイワンツナソ <i>Corchorus olitorius</i> L.	D	C

【原産】インド 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 市川市,松戸市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草
【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:明治以前 【県内侵入】110:1980年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管
理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】野菜名モロヘイヤ 【文献全般】
232,241,285,302,319,311,312,326,40,202,165,349 【文献県内】39

種子植物	アオイ科	要注意外来生物(情報不足), 生態学会100	影響度	緊急度
343	イチビ <i>Abutilon theophrasti</i> Medik.		B	B

【原産】インド 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 極多 【形態・生態】夏緑・草本 【繁殖】
花粉:虫媒,種子:重散:夏〜秋 【国内侵入】250:江戸以前 【県内侵入】250:1930年代以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能な
かぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備
考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,190,202,71,78,165,349 【文献県内】
263,39,34

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
344	ニシキアオイ <i>Anoda hastata</i> Cav.	D	C

【原産】メキシコ,南米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 佐倉市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花
粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:昭和以前 【県内侵入】161:1998年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問
題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】
241,109,285,286,302,319,312,40,331,190,202,349 【文献県内】大野景德・竹内美亀.1999.ニシキアオイを八千代市上高野に採
る.千葉県植物誌資料14:100.

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
345	アオイツナソ <i>Hibiscus cannabinus</i> L.	D	C

【原産】アフリカ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 船橋市,栽培植物, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草
【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:平成以前(栽培) 【県内侵入】110:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理
区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】別名ケナフ 【文献全般】312,202 【文献県内】39

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
346	モミジアオイ <i>Hibiscus coccineus</i> Walt.	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:1870年代 【県内侵入】161:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】286,302,319,312,40,331,190,202,165 【文献県内】263,39

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
347	フヨウ <i>Hibiscus mutabilis</i> L.	D	C

【原産】中国,四国,九州に自生 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県に散在, 少ない 【形態・生態】落葉低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:日本原産 【県内侵入】161:明治以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,232,109,317,319,312,331,202,165 【文献県内】263,39

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
348	ムクゲ <i>Hibiscus syriacus</i> L.	D	C

【原産】中国,インド,朝鮮半島 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県に散在, 極少 【形態・生態】落葉低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:安土桃山 【県内侵入】161:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,222,60,109,273,286,302,317,319,311,312,40,331,332,202,71,78,165,349 【文献県内】263,39

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
349	ギンセンカ <i>Hibiscus trionum</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161,250:鑑賞用として江戸時代に 【県内侵入】161,250:昭和30年代以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
350	ゼニバアオイ <i>Malva neglecta</i> Walr.	C	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1958年以前 【県内侵入】250:1980年代 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,286,317,319,311,312,40,190,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
351	ウサギアオイ <i>Malva parviflora</i> L.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】250: 1948年 【県内侵入】250: 1970年代以降 【影響】121, 310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり 在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 349, 344 【文献県内】39, 34

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
352	ハイアオイ <i>Malva rotundifolia</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】250: 昭和以前 【県内侵入】250: 1980年代以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり 在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81, 94, 222, 238, 239, 60, 285, 302, 317, 319, 311, 312, 332, 202, 165, 349, 344 【文献県内】39

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
353	ゼニアオイ <i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>mauritania</i> (L.) Boiss.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 1930年代以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 331, 332, 190, 202, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
354	フユアオイ <i>Malva verticillata</i> L.	D	C

【原産】東アジア 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】110, 250: 平安 【県内侵入】110, 250: 1930年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり, 可能なかぎり 在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】238, 60, 109, 285, 286, 302, 319, 311, 312, 40, 332, 190, 202, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
355	キクノハアオイ <i>Modiola caroliniana</i> G. Don	D	C

【原産】北米～熱帯米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 勝浦市, 南房総市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 着散: 秋 【国内侵入】250: 1913年以前 【県内侵入】250: 1996年以前 【影響】280, 121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり 在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】238, 109, 285, 286, 302, 317, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 78, 349, 344 【文献県内】331, 野口昭造. 1996. 勝浦市行川アイランドに帰化したキクノハアオイ. 千葉県植物誌資料8: 52-53.

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
356	ヤノネボンテンカ <i>Pavonia hastata</i> Cav.	D	C

【原産】南米 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培), 本州(神奈川県, 千葉県)逸出 【県内分布】分布度a 江戸川河原にも, 柏市, 松戸市, 千葉市, 極少 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 昭和以前(栽培) 【県内侵入】161: 1990年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 232, 109, 286, 317, 312, 40, 202, 71 【文献県内】39

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
357	ホソバキンゴジカ <i>Sida acuta</i> Burn. f.	D	C

【原産】熱帯アジア～亜熱帯 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 柏市, 八街市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】250: 戦後 【県内侵入】250: 昭和以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】241, 238, 285, 286, 302, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 78, 349, 344 【文献県内】39

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
358	キンゴジカ <i>Sida rhombifolia</i> L.	D	C

【原産】熱帯(全世界) 【国内分布】小笠原, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 柏市, 佐倉市, 山武市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 着散: 秋 【国内侵入】250: 日本原産 【県内侵入】250: 1980年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】232, 241, 238, 239, 109, 285, 302, 317, 311, 312, 326, 190, 202, 71, 78, 165 【文献県内】39, 34

種子植物	アオイ科	影響度	緊急度
359	アメリカキンゴジカ <i>Sida spinosa</i> L.	C	C

【原産】北米～熱帯米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 着散: 夏 【国内侵入】250: 1950年以前 【県内侵入】250: 1950年以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94, 232, 241, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 71, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	アオギリ科	影響度	緊急度
360	アオギリ <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 109, 273, 300, 332, 165 【文献県内】39, 34

種子植物	スミレ科	影響度	緊急度
361	ヒゴスミレ <i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W.Becker form. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) F.Maek. et T.Hashim.	D	C
【原産】本州, 四国, 九州 【国内分布】本州, 四国, 九州, 千葉県は逸出 【県内分布】分布度a 柏市, 市原市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫+自媒, 種子: 自散+食散: 夏～秋 【国内侵入】161: 日本原産 【県内侵入】161: 戦後 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】82, 109, 332, 165 【文献県内】39, 34			

種子植物	スミレ科	影響度	緊急度
362	ニオイスミレ <i>Viola odorata</i> L.	D	C
【原産】欧州南部～西アジア 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総に散在, 少ない 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫+自媒, 地下茎で栄養繁殖, 種子: 自散+食散: 夏～秋 【国内侵入】161: 1900年頃 【県内侵入】161: 1930年代以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 81, 232, 109, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 319, 311, 311, 312, 40, 331, 331, 202, 165, 165, 349, 349, 344 【文献県内】39			

種子植物	スミレ科	影響度	緊急度
363	アメリカスミレサイシン <i>Viola sororia</i> Willd.	C	C
【原産】北米 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度b 北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫+自媒, 地下茎で栄養繁殖, 種子: 自散+食散: 夏～秋 【国内侵入】161: 1989年以前 【県内侵入】161: 1990年代以前 【影響】121, 280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 60, 109, 317, 312, 40, 39, 202, 349 【文献県内】39			

種子植物	スミレ科	影響度	緊急度
364	サンシキスミレ <i>Viola tricolor</i> L.	D	C
【原産】欧州 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度b 北総・南総に散在, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫+自媒, 種子: 自散+食散: 夏 【国内侵入】161: 1860年頃 【県内侵入】161: 1920年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 60, 109, 109, 286, 317, 319, 319, 312, 40, 331, 331, 202, 165, 349 【文献県内】39			

種子植物	スミレ科	影響度	緊急度
365	フイリゲンジスミレ <i>Viola variegata</i> Fisch. var. <i>variegata</i>	D	C
【原産】朝鮮半島 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 我孫子市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫+自媒, 種子: 自散+食散: 夏～秋 【国内侵入】161: 昭和以前 【県内侵入】161: 平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 109, 312, 202 【文献県内】39			

種子植物	トケイソウ科	影響度	緊急度
366	クサトケイソウ <i>Passiflora foetida</i> L. var. <i>hispida</i> (DC.) Killip.	D	C

【原産】南米 【国内分布】本州(小笠原),九州 【県内分布】分布度a 船橋市に一時帰化, 極少 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:1966年 【県内侵入】250:1991年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】285,311,312,326,202,71,349 【文献県内】39

種子植物	シュウカイドウ科	影響度	緊急度
367	シュウカイドウ <i>Begonia grandis</i> Dryand. (syn. <i>B. evansiana</i> Andrews)	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 各地に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,珠芽で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:江戸以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,109,285,286,302,317,312,40,202,165,349 【文献県内】214,39,34

種子植物	ウリ科	特定外来生物, 生態学会100	影響度	緊急度
368	アレチウリ <i>Sicyos angulatus</i> L.		A	A

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 全県に分布, 極多 【形態・生態】夏緑・つる1年草本 【繁殖】花粉:虫媒,種子:水散,着散:秋 【国内侵入】250:1952年 【県内侵入】250:昭和30年代以前 【影響】121,350,150,280 【緊急】- 【対策】外来生物法の遵守 【備考】- 【文献全般】81,94,232,222,238,239,60,109,285,286,302,319,311,312,202,165,349,344 【文献県内】263,39

種子植物	ミソハギ科	影響度	緊急度
369	ナンゴクヒメミソハギ <i>Ammannia auriculata</i> Willd.	B	B

【原産】北米,アジア,アフリカの熱帯 【国内分布】本州,九州 【県内分布】分布度a 南房総市,館山市, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1968年 【県内侵入】250:1937年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】232,109,285,286,317,319,311,312,40,202,71,349 【文献県内】39

種子植物	ミソハギ科	影響度	緊急度
370	シマミソハギ <i>Ammannia baccifera</i> L. (syn. <i>Ammannia discolor</i> Nakai)	C	C

【原産】熱帯アジア 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市,市原市,富里市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散,水散:秋 【国内侵入】250:戦後 【県内侵入】250:1991年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】別名ナガトミソハギ 【文献全般】222,285,302,319 【文献県内】214,39

種子植物	ミソハギ科	影響度	緊急度
371	ホソバヒメミソハギ <i>Ammannia coccinea</i> Rottb. subsp. <i>purpurea</i> Koehne	B	B

【原産】アメリカ大陸 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散, 水散: 秋 【国内侵入】250: 1952年 【県内侵入】250: 1980年代以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94, 232, 241, 238, 239, 60, 109, 285, 302, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 349, 344 【文献県内】214, 39

種子植物	ミソハギ科	影響度	緊急度
372	サルスベリ <i>Lagerstroemia indica</i> L.	D	C

【原産】インド, 中国南部, 東南アジア 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度b 北総・南総西部に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・亜高木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 273, 300, 331, 332 【文献県内】39

種子植物	ミソハギ科	影響度	緊急度
373	コメバミソハギ <i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州, 四国 【県内分布】分布度a 流山市, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】250: 1960年 【県内侵入】250: 2006年 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】232, 241, 222, 239, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 349, 344 【文献県内】木村陽子・引田園子・関口晋太郎. 2007. 流山市に出現したヒナツメクサとコメバミソハギ. 千葉県植物誌資料22: 191-194., 木村陽子. 2007. コメバミソハギの初出文献. 千葉県植物誌資料23: 199.

種子植物	ミソハギ科	影響度	緊急度
374	アメリカキカシグサ <i>Rotala ramosior</i> (L.) Koehne	C	B

【原産】熱帯米 【国内分布】神奈川県, 千葉県 【県内分布】分布度b 北総西部, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】250: 1997年 【県内侵入】250: 1999年 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109, 286, 317, 319, 312, 40, 202 【文献県内】255, 331, 大野景德. 2000. 八千代市に帰化したハイギジムシロ, ナガエコミカンソウ, アメリカキカシグサ. 千葉県植物誌資料15: 108-109, 311

種子植物	ザクロ科	影響度	緊急度
375	ザクロ <i>Punica granatum</i> L.	D	C

【原産】小アジア 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総・南総の市街地に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・亜高木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】161: 平安 【県内侵入】161: 江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 273, 300, 302, 332, 79 【文献県内】39

種子植物	アカバナ科	影響度	緊急度
376	ヒレタゴボウ <i>Ludwigia decurrens</i> Walt.	B	B

【原産】熱帯米 【国内分布】本州, 四国 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 極多 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 水散: 秋 【国内侵入】250: 1955年 【県内侵入】250: 1980年代以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】232, 241, 238, 239, 60, 109, 272, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 330, 349, 344 【文献県内】214, 39

種子植物	アカバナ科	影響度	緊急度
377	アメリカミズユキノシタ <i>Ludwigia repens</i> J.R.Forst.	B	A

【原産】北米? 熱帯アジア? 【国内分布】京都府~千葉県 【県内分布】分布度a 八千代市, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草 (水槽内) 【繁殖】花粉: 虫媒, 匍匐枝で栄養繁殖, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】163: 1970年頃 【県内侵入】163: 2007年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】標本CBM(BS-254500) 【文献全般】101, 109, 286, 319, 311, 312, 40, 202, 349 【文献県内】倉俣武男. 2007. アメリカミズユキノシタ千葉県に出現. 千葉県植物誌資料23: 202.

種子植物	アカバナ科	影響度	緊急度
378	メマツヨイグサ <i>Oenothera biennis</i> L.	B	C

【原産】北米 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 1920年代 【県内侵入】161: 1950年代以前 【影響】280, 121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 222, 238, 239, 60, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 268, 39, 34

種子植物	アカバナ科	影響度	緊急度
379	オオマツヨイグサ <i>Oenothera erythrosepala</i> Borbs	C	C

【原産】北米 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 1870年頃 【県内侵入】161: 1930年代以前 【影響】280, 121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】263, 39, 34

種子植物	アカバナ科	影響度	緊急度
380	コマツヨイグサ <i>Oenothera laciniata</i> Hill	B	C

【原産】北米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】240: 1914年以前 【県内侵入】240: 1950年代以前 【影響】280, 121 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81, 94, 241, 222, 238, 239, 60, 109, 272, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 39, 34, 367

種子植物	アカバナ科	影響度	緊急度
381	ユウゲシヨウ <i>Oenothera rosea</i> Ait.	C	C

【原産】アメリカ大陸 【国内分布】本州, 四国 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 明治(栽培) 【県内侵入】161: 1990年代以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 232, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	アカバナ科	影響度	緊急度
382	ヒルザキツキミソウ <i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏～秋 【国内侵入】161: 1957年以前(栽培) 【県内侵入】161: 1950年代以前 【影響】280, 121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 165, 349, 344 【文献県内】214, 39

種子植物	アカバナ科	影響度	緊急度
383	マツヨイグサ <i>Oenothera striata</i> Ledeb. ex. Link	C	C

【原産】南米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に散在, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 1920年代以前 【影響】280, 121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 311, 312, 40, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	アカバナ科	影響度	緊急度
384	ツキミソウ <i>Oenothera tetraptera</i> Cav.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 市原市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】161: 江戸末期(栽培) 【県内侵入】161: 平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】238, 239, 109, 286, 302, 319, 311, 312, 40, 331, 202, 78, 165, 349, 344 【文献県内】-

種子植物	ヒシ科	影響度	緊急度
385	トウビシ <i>Trapa bispinosa</i> Roxb.	D	C

【原産】インド～中国? 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 八千代市, 少ない 【形態・生態】夏緑・浮葉1年水草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 水散: 秋 【国内侵入】110: 昭和以前 【県内侵入】110: 1994年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】101 【文献県内】39

種子植物	アリノトウグサ科		影響度	緊急度
386	オオフサモ	特定外来生物, 生態学会100	A	A
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Veldc.				
【原産】ブラジル 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 全県に散在, 多い 【形態・生態】夏緑・水草 【繁殖】花粉: 風媒, 枝がちぎれて栄養繁殖, 種子: 水散: 秋 【国内侵入】163: 大正 【県内侵入】163: 1960年代以前 【影響】121, 350 【緊急】- 【対策】外来生物法の遵守 【備考】- 【文献全般】 81, 94, 232, 241, 222, 239, 60, 101, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 71, 78, 349, 344 【文献県内】263, 39, 34				

種子植物	ウコギ科		影響度	緊急度
387	ヒメウコギ		C	C
<i>Eleutherococcus sieboldianus</i> (Makino) Nakai				
【原産】中国 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 夏〜秋 【国内侵入】110: 江戸以前 【県内侵入】110: 江戸 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 336, 222, 109, 273, 300, 332, 165 【文献県内】39, 34				

種子植物	ウコギ科		影響度	緊急度
388	カナリーキツタ		D	C
<i>Hedera canariensis</i> Willd.				
【原産】カナリー諸島 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州(室内栽培) 【県内分布】分布度a 極少 【形態・生態】常緑・藤本 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】161: 昭和(栽培導入) 【県内侵入】161: 昭和(栽培導入) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】332 【文献県内】-				

種子植物	ウコギ科		影響度	緊急度
389	セイヨウキツタ		D	C
<i>Hedera helix</i> L.				
【原産】欧州, 北アフリカ 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 東京湾岸市街地に散在, 極少 【形態・生態】常緑・藤本 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】161: 明治 【県内侵入】161: 1980年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 300, 312, 332 【文献県内】39				

種子植物	ウコギ科		影響度	緊急度
390	カミヤツデ		D	C
<i>Tetrapanax papyrifer</i> K.Koch				
【原産】中国, 台湾 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 南総・安房に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 1940年代以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 109, 300, 317, 311, 202, 71, 357 【文献県内】39				

種子植物	セリ科	影響度	緊急度
391	ドクゼリモドキ <i>Ammi majus</i> L.	D	C

【原産】欧州南部 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1953年以前 【県内侵入】250:1970年代以前 【影響】220(皮膚炎) 【緊急】- 【対策】可能なかぎり
在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】241,238,239,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39,34,367,368

種子植物	セリ科	影響度	緊急度
392	ノハラジャク <i>Anthriscus vulgaris</i> Pers. (syn. <i>A. caucalis</i> M.Bieb.)	C	C

【原産】欧州,西アジア,北アフリカ 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度a 八千代市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】250:1969年 【県内侵入】250:1998年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり
在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94,232,241,239,60,109,285,286,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	セリ科	影響度	緊急度
393	オランダミツバ <i>Apium graveolens</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 鴨川市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:1930年代以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241,109,286,302,316,319,312,40,202,165,349 【文献県内】39

種子植物	セリ科	影響度	緊急度
394	マツバゼリ <i>Ciclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et E.H.Wilson (syn. <i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) F.Muell. ex Benth.)	C	C

【原産】エジプト,熱帯米? 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 市川市,千葉市,市原市,鴨川市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1893年 【県内侵入】210:1950年代以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,349,344 【文献県内】39

種子植物	セリ科	影響度	緊急度
395	ドクニンジン <i>Conium maculatum</i> L.	A	A

要注意外来生物(情報不足)

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:1959年 【県内侵入】161:1950年代以前(栽培) 【影響】210(有毒) 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,285,286,302,319,311,312,40,202 【文献県内】39

種子植物	セリ科	影響度	緊急度
396	コエンドロ <i>Coriandrum sativum</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 富津市,柏市,市川市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:1950年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,165 【文献県内】99,263,39,34

種子植物	セリ科	影響度	緊急度
397	ノラニンジン <i>Daucus carota</i> L.	C	C

【原産】欧州,アフガニスタン 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:着散:夏 【国内侵入】250:1929年以前 【県内侵入】250:1930年代以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	セリ科	影響度	緊急度
398	ウイキョウ <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	D	C

【原産】地中海沿岸,西アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 北総西部に分布, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:1920年代以前(剤倍) 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,272,285,286,302,299,317,319,311,312,40,202,79,165,349 【文献県内】39

種子植物	セリ科	影響度	緊急度
399	ウチワゼニクサ <i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb. var. <i>triradiata</i> (A.Rich.) Fernald	B	B

【原産】北米西部 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 佐倉市(印旛沼), 多い 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:水散:夏 【国内侵入】163:1960年代 【県内侵入】163:1990年代以前 【影響】121,350 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,286,319,312,40,202,349 【文献県内】214,39

種子植物	セリ科	影響度	緊急度
400	オランダゼリ <i>Petroselinum hortense</i> Hoffm. (syn. <i>P. crispum</i> (Mill.) A.W.Hill)	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 市原市, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:1930年代以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】別名パセリ 【文献全般】109,316,317,319,312,40,202,349 【文献県内】39

種子植物	ツツジ科	国内外来生物	影響度	緊急度
401	オオムラサキ <i>Rhododendron pulchrum</i> Sweet	国RDB:NT, 県RDB:B	C	C

【原産】日本(交雑種) 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県に栽培, 多い 【形態・生態】連緑・低木
 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:風散:夏 【国内侵入】161:江戸(交雑) 【県内侵入】161:明治 【影響】141,100 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,331,332 【文献県内】39

種子植物	サクラソウ科	影響度	緊急度
402	アカバナリリハコベ <i>Anagallis arvensis</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 富津市, 佐倉市, 市川市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草
 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:風散:夏 【国内侵入】250,161:江戸(栽培) 【県内侵入】250,161:1995年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり, 可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,222,109,285,286,302,317,319,312,40,202,344 【文献県内】214,39

種子植物	カキノキ科	影響度	緊急度
403	カキノキ <i>Diospyros kaki</i> Thunb.	C	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:食散:秋 【国内侵入】110:弥生 【県内侵入】110:弥生～室町 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,273,299,312,332 【文献県内】39,34

種子植物	カキノキ科	影響度	緊急度
404	マメガキ <i>Diospyros lotus</i> L.	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主として南総丘陵地に分布, 極少 【形態・生態】夏緑・高木
 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:食散:秋 【国内侵入】110:弥生 【県内侵入】110:弥生～室町 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,332,190,165 【文献県内】39

種子植物	モクセイ科	影響度	緊急度
405	チョウセンレンギョウ <i>Forsythia koreana</i> Nakai	D	C

【原産】朝鮮半島 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 市街地に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・低木
 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:風散:夏 【国内侵入】161:明治(導入) 【県内侵入】161:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,332 【文献県内】39

種子植物	モクセイ科	影響度	緊急度
406 トネリコ		D	C
<i>Fraxinus japonica</i> Blume			

【原産】本州 【国内分布】本州(自生) 【県内分布】分布度b 北総・南総に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:日本原産 【県内侵入】161:1930年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,336,109,273,300,332 【文献県内】39

種子植物	モクセイ科	要注意外来生物(緑化植物)	影響度	緊急度
407 トウネズミモチ			B	B
<i>Ligustrum lucidum</i> Aiton				

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度c 主として北総・南総の市街地に分布, 少ない 【形態・生態】常緑・中高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋～冬 【国内侵入】132:明治初期 【県内侵入】132:1970年代以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94,336,232,60,317,312,202,349 【文献県内】214,39

種子植物	モクセイ科	影響度	緊急度
408 キンモクセイ		D	C
<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino			

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総～南総の市街地に散在, 極少 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋～冬 【国内侵入】161:江戸(栽培) 【県内侵入】161:1930年代以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,110,300,332,165 【文献県内】39

種子植物	モクセイ科	影響度	緊急度
409 ギンモクセイ		D	C
<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. <i>fragrans</i>			

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総に散在, 極少 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋～冬 【国内侵入】161:江戸(栽培) 【県内侵入】161:1930年代以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】花は白く鋸歯がある 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	モクセイ科	影響度	緊急度
410 ヒイラギモクセイ		D	C
<i>Osmanthus x fortunei</i> Carr.			

【原産】中国(雑種起源?) 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総・南総に散在, 極少 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋～冬 【国内侵入】161:昭和以前(栽培) 【県内侵入】161:1930年代以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,332,165 【文献県内】39

種子植物	リンドウ科	影響度	緊急度
411	ベニバナセンブリ <i>Centaurium erythraea</i> Raf.	D	C

【原産】欧州? 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 山武市,八街市, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】250:1918年以前 【県内侵入】250:1990年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】232,241,222,109,286,302,317,311,312,40,332,202,349 【文献県内】214,39

種子植物	リンドウ科	影響度	緊急度
412	ハナハマセンブリ <i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. et Link) Fritsch	C	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州 【県内分布】分布度c 北総西部, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】250:1977年 【県内侵入】250:1980年代以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】60,109,285,286,312,40,202,349 【文献県内】214,39

種子植物	キョウチクトウ科	影響度	緊急度
413	キョウチクトウ <i>Nerium oleander</i> L. var. <i>indicum</i> (Mill.) O.Deg et Greenwell	D	C

【原産】インド,ペルシャ 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県市街地に散在, 極少 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:江戸(栽培) 【県内侵入】161:明治 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241,109,273,286,300,317,319,311,312,331,332,202,78,165 【文献県内】39

種子植物	キョウチクトウ科	影響度	緊急度
414	ツルニチニチソウ <i>Vinca major</i> L.	B	B

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 極多 【形態・生態】連緑・藤本 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】161:明治(導入) 【県内侵入】161:1930年代以前 【影響】121,120,150 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,60,109,285,286,302,317,319,312,40,331,202,165,349 【文献県内】214,39

種子植物	ガガイモ科	影響度	緊急度
415	ヤナギトウワタ <i>Asclepias tuberosa</i> L.	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 市原市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏〜秋 【国内侵入】161:昭和以前 【県内侵入】161:平成以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】39

種子植物	アカネ科		影響度	緊急度
416	オオフトバムグラ	要注意外来生物(情報不足)	B	B
	<i>Diodia teres</i> Walter			

【原産】北米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 北総・南総の低地, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】220: 1927年 【県内侵入】220: 1950年代以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】94, 232, 241, 238, 239, 60, 109, 285, 302, 317, 311, 312, 40, 202, 78, 165, 349, 344 【文献県内】39, 34

種子植物	アカネ科		影響度	緊急度
417	メリケンムグラ		D	C
	<i>Diodia virginiana</i> L.			

【原産】北米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 野田市, 香取市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】220: 1953年以前 【県内侵入】220: 1997年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】232, 241, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 311, 312, 40, 202, 349, 344 【文献県内】39

種子植物	アカネ科		影響度	緊急度
418	シラホシムグラ		A	A
	<i>Galium aparine</i> L.			

【原産】欧州 【国内分布】本州, 四国 【県内分布】分布度a 江戸川流域に多産し、河原の在来植物を駆逐する., 極多 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 着散: 夏 【国内侵入】210(穀物): 1995年香川県 【県内侵入】210(穀物): 2007年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】植村修二・水田光雄・藤平明. 2004. 日本に帰化したシラホシムグラ(新称). 帰化植物写真ニュース4: 全農教 【文献県内】木村陽子・小土井智行. 2008. シラホシムグラ(アカネ科)が千葉県江戸川流域に多産. 千葉県植物誌資料24: 230-232.

種子植物	アカネ科		影響度	緊急度
419	ミナトムグラ		D	C
	<i>Galium tricornutum</i> Dandy (syn. <i>Galium tricornu</i> Stokes)			

【原産】地中海沿岸, 西アジア 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 富津市, 少ない 【形態・生態】夏緑・草本 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散, 着散: 夏 【国内侵入】250: 1951年 【県内侵入】250: 1992年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】285, 286, 302, 319, 312, 40, 202 【文献県内】39

種子植物	アカネ科		影響度	緊急度
420	クチナシ		D	C
	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis			

【原産】本州, 四国, 九州(自生), 中国, ベトナム 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 極少 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】自生: 日本原産 【県内侵入】161: 江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336, 273, 300, 332 【文献県内】39

種子植物	アカネ科	影響度	緊急度
421	タマザキフタバムグラ <i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam.	C	C

【原産】東南アジア～インド 【国内分布】千葉県 【県内分布】分布度a 船橋市に一時帰化, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】250:1992年以前 【県内侵入】250:1992年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,317,319,311,312,40,202,71 【文献県内】39

種子植物	アカネ科	影響度	緊急度
422	ハシカグサモドキ <i>Richardia scabra</i> L.	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 銚子市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】240:1956年以前 【県内侵入】240:1956年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】241,238,285,286,302,319,311,312,40,202,71,344 【文献県内】39,34

種子植物	アカネ科	国RDB:EN	影響度	緊急度
423	ハクチョウゲ <i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.		D	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総・南総西部に散在, 極少 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,232,273,302,165 【文献県内】39

種子植物	アカネ科	影響度	緊急度
424	ハナヤエムグラ <i>Sherardia arvensis</i> L.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度b 主として北総・南総西部に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】220:1957年 【県内侵入】220:1980年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】214,269,39,34

種子植物	アカネ科	影響度	緊急度
425	アメリカハリフタバ <i>Spermacoce glabra</i> Michx.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州(千葉県),九州 【県内分布】分布度a 南房総市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】240:1952年以前 【県内侵入】240:1952年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】238,109,286,302,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
426	ツレザキヒルガオ <i>Calystegia fraternifolia</i> (Mackenzie et Busch) Burmon.	D	C

【原産】北米 【国内分布】千葉県 【県内分布】分布度a 市川市, 極少 【形態・生態】夏緑・つる植物 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1968年以前 【県内侵入】250:1968年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】312,202 【文献県内】286,34,小松崎一雄.1976.ツレザキヒルガオを千葉県市川市で採る.植物採集ニュース(49):18.

種子植物	ヒルガオ科	要注意外来生物(情報不足)	影響度	緊急度
427	セイヨウヒルガオ <i>Convolvulus arvensis</i> L.		D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総西部に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・つる多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】240:1945年以前 【県内侵入】240:1957年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,165,349,344 【文献県内】263,39,34

種子植物	ヒルガオ科	要注意外来生物(情報不足)	影響度	緊急度
428	アメリカネナシカズラ <i>Cuscuta campestris</i> Yunccker		B	B

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総と南総海岸部に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】250:1970年以前 【県内侵入】250:1955年以前 【影響】310,120(寄生) 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,94,241,239,60,109,285,286,317,311,312,40,202,71,165,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
429	カロリナアオイゴケ <i>Dichondra repens</i> Forst. var. <i>carolinensis</i> Chois.	C	C

【原産】北米南部 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度b 北総と南総の市街地に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】130:1955年頃 【県内侵入】130:1991年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,公共事業などにおける方針策定 【備考】グランドカバーで使われているものは、アオイゴケそのものの可能性がある 【文献全般】109,286,302,317,319,312,40,202,349 【文献県内】214,39

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
430	サツマイモ <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir.	D	C

【原産】中米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 全県で栽培, 極少(逸出) 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,球根で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】110:江戸(栽培) 【県内侵入】110:江戸(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】302 【文献県内】39

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
431	マルババルコウ <i>Ipomoea coccinea</i> L. (syn. <i>Quamoclit coccinea</i> (L.) Moench)	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:1951年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
432	アメリカアサガオ <i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq.	C	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸末期 【県内侵入】161:1987年以前 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,319,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
433	マルバアメリカアサガオ <i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq. var. <i>integriscula</i> A. Gray	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:1971年以前 【県内侵入】161:1985年以前 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,317,319,311,312,326,40,202,71,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	ヒルガオ科	国内外来生物	影響度	緊急度
434	ノアサガオ <i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merrill		C	C

【原産】本州,四国,九州,台湾 【国内分布】本州,四国,九州(自生) 【県内分布】分布度a 南房総市, 少ない 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】自生:日本原産 【県内侵入】300:2003年以前 【影響】イリオモテアサガオ. 不用意に投棄すると発根して広がる可能性もあるということで要注意. 280,121 【緊急】- 【対策】温室効果ガスの排出抑制,生育状況モニタリング 【備考】- 【文献全般】272,302,326 【文献県内】39

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
435	マメアサガオ <i>Ipomoea launosa</i> L.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1955年以前 【県内侵入】250:1975年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,319,311,312,40,202,71,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
436	アサガオ <i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth (syn. <i>Pharbitis nil</i> (L.) Choisy)	D	C

【原産】ヒマラヤ,インド,中国南部 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 主として北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:平安(栽培) 【県内侵入】161:江戸(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,238,239,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,165,349 【文献県内】39

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
437	マルバアサガオ <i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:1934年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
438	イモネノホシアサガオ <i>Ipomoea trichocarpa</i> Ell.	D	C

【原産】北アメリカ南部 【国内分布】香川県観音寺市で確認 【県内分布】分布度a 館山市,1ヵ所のみ.極小.その後増殖の情報なし 【形態・生態】花は小さく,アサガオに似る.ヤマノイモ状の塊茎からつるを数m伸ばす・夏緑 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散 【国内侵入】250:1975年以前 【県内侵入】-:2008年以前 【影響】偶発か? 320(有毒) 【緊急】- 【対策】抜き取り 【備考】標本CBM(BS279318,BS292159) 【文献全般】285 【文献県内】-

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
439	ホシアサガオ <i>Ipomoea triloba</i> L.	C	C

【原産】南米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 柏市,市川市, 少ない 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:戦後 【県内侵入】250:1952年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
440	モミジバルコウソウ <i>Ipomoea x multifida</i> (Ref.) Shinnery (syn. <i>Ipomoea coccinea</i> L. x <i>quamoclit</i> L., <i>Quamoclit multifida</i> Raf.)	D	C

【原産】ルコウソウとマルバルコウソウの雑種 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 富里市, 少ない 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸(栽培) 【県内侵入】161:1991年以前(逸出) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,241,238,239,109,285,286,302,312,40,202,71 【文献県内】39

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
441	オキナアサガオ <i>Jacquemontia tamnifolia</i> Griseb.	D	C
【原産】熱帯米 【国内分布】本州,九州 【県内分布】分布度a 柏市, 極少 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1950年頃 【県内侵入】250:1980年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94,232,241,238,239,109,285,286,302,317,311,312,326,40,202,71,349,344 【文献県内】39			

種子植物	ヒルガオ科	影響度	緊急度
442	ツタノハヒルガオ <i>Merremia hederacea</i> (Burm.f.) Hallier f.	D	C
【原産】熱帯アジア 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市に一時帰化, 極少 【形態・生態】夏緑・つる1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1945年 【県内侵入】250:1992年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】241,238,109,302,317,319,311,312,326,40,332,202,71,349,344 【文献県内】39			

種子植物	ムラサキ科	影響度	緊急度
443	アラゲムラサキ <i>Amsinckia barbata</i> Greene	D	C
【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 芝山町, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1948年以前 【県内侵入】220:1996年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,109,286,311,312,202,182,349,344 【文献県内】39			

種子植物	ムラサキ科	影響度	緊急度
444	トゲムラサキ <i>Asperugo procumbens</i> L.	D	C
【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 千葉市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1951年以前 【県内侵入】220:2002年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,241,238,285,286,302,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39			

種子植物	ムラサキ科	影響度	緊急度
445	シャゼンムラサキ <i>Echium Plantagineum</i> L.	D	C
【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 千葉市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】250:1963年以前 【県内侵入】250:2006年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】241,285,286,302,319,311,312,40,202 【文献県内】-			

種子植物	ムラサキ科	影響度	緊急度
446	シベナガムラサキ <i>Echium vulgare</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:重散:夏 【国内侵入】250:1958年以前 【県内侵入】250:1958年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,241,238,286,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	ムラサキ科	影響度	緊急度
447	アレチムラサキ <i>Heliotropium crassavicum</i> L.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 袖ヶ浦市, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】220:1971年 【県内侵入】220:1971年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】239,109,286,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】267,269,39,34

種子植物	ムラサキ科	影響度	緊急度
448	ノムラサキ <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	D	C

【原産】アジア～地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散,着散:夏 【国内侵入】220:1929年 【県内侵入】220:1975年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	ムラサキ科	影響度	緊急度
449	イヌムラサキ <i>Lithospermum arvense</i> L.	D	C

【原産】寒帯～温帯(広域) 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 八千代市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1950年以前 【県内侵入】220:1932年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】自生のもものと帰化のものがある 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,272,285,286,317,319,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	ムラサキ科	影響度	緊急度
450	ノハラムラサキ <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill.	D	C

【原産】欧州,ユーラシア 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 鴨川市,佐倉市,いすみ市,芝山町, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1927年以前 【県内侵入】220:1927年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	ムラサキ科	影響度	緊急度
451	ハマワスレナグサ <i>Myosotis discolor</i> Pers.	D	C

【原産】欧州～西アジア 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a いすみ市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1934年 【県内侵入】220:1995年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】241,238,239,60,109,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】331,木村陽子・大場達之.1996.ハマワスレナグサの帰化.千葉県植物誌資料9:64.

種子植物	ムラサキ科	影響度	緊急度
452	ワスレナグサ <i>Myosotis scorpioides</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 富里市,市原市,館山市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:明治(栽培) 【県内侵入】161:1992年以前(逸出) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,241,109,285,286,302,317,312,40,331,190,202,165 【文献県内】263,39

種子植物	ムラサキ科	影響度	緊急度
453	キバナムラサキ <i>Nonnea lutea</i> (Desr.) DC.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市(東邦大学), 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:昭和 【県内侵入】161:1985年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241,302,312,40,202 【文献県内】39

種子植物	ムラサキ科	影響度	緊急度
454	ヒレハリソウ <i>Symphytum officinale</i> L.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】110:明治 【県内侵入】110:1952年以前(栽培) 【影響】280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,239,60,285,286,302,317,319,311,312,40,332,202,165,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	クマツヅラ科	影響度	緊急度
455	ポタンクサギ <i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 北総西部に分布, 極少 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:昭和以前 【県内侵入】161:1998年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】332 【文献県内】39

種子植物	クマツヅラ科	影響度	緊急度
456	ヤナギハナガサ <i>Verbena bonariensis</i> L.	C	C

【原産】南米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県の低地に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:1984年以前 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】サンジャクバーベナの名で栽培 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,319,311,312,326,40,331,202,71,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	クマツヅラ科	影響度	緊急度
457	アレチハナガサ <i>Verbena brasiliensis</i> Vell.	C	C

【原産】南米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として東京湾岸に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】240:1957年頃 【県内侵入】240:1988年以前 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,317,319,311,312,326,40,202,71,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	クマツヅラ科	影響度	緊急度
458	ダキバアレチハナガサ <i>Verbena incompta</i> Michael	C	C

【原産】南米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 主として北総に散在, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】240:1933年 【県内侵入】240:1986年以前 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】109,286,317,312,40,202 【文献県内】39

種子植物	クマツヅラ科	影響度	緊急度
459	ヒメクマツヅラ <i>Verbena litoralis</i> Kunth	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 佐倉市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】250:1955年以前 【県内侵入】250:2002年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり incoming 品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】241,286,312,326,40,202,71 【文献県内】寺村敬子.2003.本埜村で「ヒメクマツヅラ」を確認.千葉県植物誌資料19:145.

種子植物	クマツヅラ科	影響度	緊急度
460	シュクコンバーベナ <i>Verbena rigida</i> Spreng.	D	C

【原産】ブラジル,アルゼンチン 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 香取市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:明治(栽培) 【県内侵入】161:1972年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,239,302,317,312,40,331,332,202,71 【文献県内】39,小松崎一雄.1972.シュクコンバーベナが千葉県佐原で見つかった.植物採集ニュース(64):52.

種子植物	クマツヅラ科	影響度	緊急度
461	ヒメビジョザクラ <i>Verbena tenera</i> Spreng.	D	C

【原産】南米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:重散:夏〜秋 【国内侵入】161:戦後(栽培) 【県内侵入】161:1978年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,109,302,317,319,312,40,331,202,71 【文献県内】39

種子植物	アワゴケ科	影響度	緊急度
462	イケノミズハコベ <i>Callitricha stagnalis</i> Scop.	D	C

【原産】ヨーロッパ 【国内分布】中部,関東 【県内分布】分布度a 佐倉市, 極少 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】163:1990年 【県内侵入】163:1990年 【影響】121 【緊急】- 【対策】適切な除草 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
463	セイヨウジュウニヒトエ <i>Ajuga reptans</i> L.	C	C

【原産】欧州北部 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 主として北総・南総に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:風散:夏 【国内侵入】161:1970年頃 【県内侵入】161:平成以前 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,109,285,286,317,312,40,202,71,349 【文献県内】214,39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
464	チシマオドリコソウ <i>Daleopsis bifida</i> Boenn.	D	C

【原産】ユーラシア 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 富津市, 少ない 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1948年以前 【県内侵入】220:1971年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】241,238,239,109,285,286,302,317,312,40,331,190,202 【文献県内】142,269,39,34

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
465	キバナオドリコソウ <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	D	C

【原産】ヨーロッパ,西アジア 【国内分布】近畿,関東 【県内分布】分布度a 山武町, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】161:2002年以前 【県内侵入】161:2002年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
466	ヒメオドリコソウ <i>Lamium purpureum</i> L.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 極多 【形態・生態】夏緑・草本 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】220:1898年 【県内侵入】220:1951年以前 【影響】121,310 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
467	ヨウシュハッカ <i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	D	C

【原産】北半球広域 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 北総西部に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】110:1975年 【県内侵入】110:1992年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,238,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】269,39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
468	ナガバハッカ <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 佐倉市,富里市, 極少 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】110:1937年以前 【県内侵入】110:1992年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,238,60,109,285,286,302,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
469	メグサハッカ <i>Mentha pulegium</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州,九州 【県内分布】分布度a 主として北総に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】110:1936年以前 【県内侵入】110:1991年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
470	マルバハッカ <i>Mentha rotundifolia</i> (L.) Huds.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 県内各地に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】110:戦後以前 【県内侵入】110:2007年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,238,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
471	オランダハッカ <i>Mentha spicata</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 主として北総に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑
 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】110:1820年ごろ(栽培) 【県内侵入】110:1935年以前 【影響】-
 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】
 81,238,109,285,286,302,317,319,311,312,40,332,202,71,349 【文献県内】39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
472	アメリカハッカ <i>Mentha x gracilis</i> Sole	D	C

【原産】欧州,北米 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度a 勝浦市,八千代市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花
 粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】161:1968年以前 【県内侵入】161:1958年以前 【影響】- 【緊急】- 【対
 策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全
 般】81,238,60,109,286,302,317,311,312,40,202,349,344 【文献県内】267,39,34

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
473	コショウハッカ <i>Mentha x piperita</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 野田市,富里市, 極少 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花
 粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:風散:夏 【国内侵入】161:1933年以前 【県内侵入】161:1977年以前 【影響】- 【緊急】- 【対
 策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全
 般】81,94,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
474	ハリゲヤグルマハッカ <i>Monarda dispersa</i> Small	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 市原市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:
 秋 【国内侵入】161:1991年以前 【県内侵入】161:1991年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規
 制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312,40 【文献県内】城川四郎.2007.
 千葉県植物誌496pp.,シソ科のヤグルマハッカはハリゲヤグルマハッカ(新称)であった.千葉県植物誌資料23:206.

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
475	ヤグルマハッカ <i>Monarda fistulosa</i> L.	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 富里市, 極少 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花粉:
 虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:昭和30年代以前(栽培) 【県内侵入】161:1995年 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外
 来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】
 319,312,40,332,71,349 【文献県内】39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
476	イヌハッカ <i>Nepeta cataria</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】本州(一部自生) 【県内分布】分布度a 袖ヶ浦市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:1912年以前 【県内侵入】161:1961年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,238,239,60,285,286,302,319,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
477	シソ <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Thunb.) W.Deane	C	C

【原産】ヒマラヤ,中国南部 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度c 全県に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:弥生 【県内侵入】110:弥生～室町 【影響】280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,109,302,316,317,312,40,165 【文献県内】214,39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
478	エゴマ <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>frutescens</i>	D	C

【原産】インド,中国南部 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】110:縄文 【県内侵入】110:弥生～室町 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,109,302,317,312,40,71,165 【文献県内】214,39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
479	カクトラノオ <i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総に分布, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】161:大正年間 【県内侵入】161:昭和 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,109,286,302,317,312,40,331,202,71,165 【文献県内】263,39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
480	セイヨウウツボグサ <i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	D	C

【原産】ユーラシア(広域),北アフリカ 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 佐倉市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】161:1998年以前 【県内侵入】161:2004年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,286,312,40,202 【文献県内】255,北公園調査グループ(植田美千代・辻さつき・松丸清).2004.佐倉市ユウカリが丘北公園でセイヨウウツボグサ発見.千葉県植物誌資料20:159., 寺村敬子.2004.セイヨウウツボグサの観察.千葉県植物誌資料20:159.

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
481	アワモリハッカ <i>Pycnanthemum flexuosum</i> (Walt.) B.S.P.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1959年頃 【県内侵入】250:1997年以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】286,302,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
482	イヌヒメコズチ <i>Salvia reflexa</i> Hornem.	D	C

【原産】北・中米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 千葉市, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】250:1955年 【県内侵入】250:2003年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,241,239,285,286,302,312,40,202 【文献県内】39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
483	ミナトタムラソウ <i>Salvia verveana</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 野田市,流山市, 極少. 利根運河土手 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1961年 【県内侵入】250:1991年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】標本CBM(BS-165014) 【文献全般】239,109,286,302,319,311,312,40,349,344 【文献県内】39

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
484	ヤブチョロギ <i>Stachys arvensis</i> L.	D	C

【原産】欧州,西アジア,北アフリカ 【国内分布】本州,九州 【県内分布】分布度a 富津市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】250:戦後 【県内侵入】250:2000年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】232,238,60,285,286,302,319,311,312,326,40,202,71,349,344 【文献県内】331,川名興.2000.ヤブチョロギが千葉県に帰化.千葉県植物誌資料18:138.

種子植物	シソ科	影響度	緊急度
485	オトメイヌゴマ <i>Stachys palustris</i> L.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 市川市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】250:1987年以前 【県内侵入】250:2006年以前 【影響】121 【緊急】増殖力あり 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】行徳に生育しているものを、仮にギョウトクイヌゴマと呼ぶこともある 【文献全般】81,286,40,202 【文献県内】大場達之.2006.市川市行徳,鳥獣保護区のギョウトクイヌゴマ(仮称).千葉県植物誌資料21:186-188.

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
486	キチョウジ <i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl.	D	C

【原産】南アメリカ 【国内分布】関東 【県内分布】分布度a 市川市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:2009年以前 【県内侵入】161:2009年以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
487	ツノミチョウセンアサガオ <i>Datura ferox</i> L.	B	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 富津市, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1977年 【県内侵入】250:2001年 【影響】210有毒 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,285,286,319,311,312,40,202,349 【文献県内】331,川名興・天野誠・大場達之.2000.ツノミチョウセンアサガオとオオセンナリの帰化.千葉県植物誌資料18:129.

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
488	シロバナチョウセンアサガオ <i>Datura stramonium</i> L.	B	C

【原産】熱帯米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:明治初期 【県内侵入】161:昭和30年代後半以降 【影響】210有毒 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】263,39,34

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
489	ヨウシュチョウセンアサガオ <i>Datura stramonium</i> L. form. <i>tatura</i> (L.) Dabert.	B	C

【原産】熱帯米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総と南総に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:1930年代以前 【影響】210有毒 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,241,238,239,109,285,286,302,312,40,78 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
490	ケチョウセンアサガオ <i>Datura wrightii</i> Regel	B	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 主として北総に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸末期 【県内侵入】161:昭和30年代後半以降 【影響】210有毒 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
491	オオセンナリ <i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	C	C

【原産】南米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161,250:江戸 【県内侵入】161,250:1930年代以前 【影響】210有毒だが臭いよけに植栽 【緊急】- 【対策】販売時の規制など,管理区域外へ遺棄防止,栽培ガイドラインづくり,可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法検討 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】263,39,34,319,321,143,124

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
492	ホオズキ <i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino	D	C

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度c 主として北総に分布, 極少 【形態・生態】夏緑・草本 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:平安 【県内侵入】161:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,222,109,286,302,317,312,40,39,71,165 【文献県内】214,263,39,241,321,143,131

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
493	ヒロハフウリンホオズキ <i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>	B	B

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:1928年以前 【県内侵入】250:1983年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,286,312,40,202 【文献県内】331,131,311

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
494	ホソバフウリンホオズキ <i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) Waterfall (syn. <i>P. lanceifolia</i> Nees)	B	B

【原産】北米西南部 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 南房総市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:1999年以前 【県内侵入】250:2000年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,317,312,40,202 【文献県内】331,木村陽子・川名興.2000.ホソバフウリンホオズキが千葉県に帰化.千葉県植物誌資料18:139.,311

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
495	アイフウリンホオズキ <i>Physalis angulata</i> L. var. <i>pendula</i> (Rydb.) Waterfall (syn. <i>P. pendula</i> Rydb.)	B	B

【原産】北米東南部 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 佐倉市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:1991年以前 【県内侵入】250:1991年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,317,312,40,202 【文献県内】331,131

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
496	ピロードホオズキ <i>Physalis heterophylla</i> Nees	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州(千葉県) 【県内分布】分布度a 富里市,成田市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:1933年 【県内侵入】250:1935年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり
在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,109,285,319,311,312,40,202,349 【文献県内】331,131

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
497	ウスゲホオズキ <i>Physalis longifolia</i> Nutt. var. <i>subglabrata</i> (Mackenz. et Bush) Cronq.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度a 市川市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:1968年以前 【県内侵入】250:1968年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり
在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,286,312,40,202 【文献県内】331,131

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
498	ブドウホオズキ <i>Physalis peruviana</i> L.	D	C

【原産】南米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 柏市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】110:明治初期 【県内侵入】110:1956年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】239,60,109,272,285,286,302,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】331,131

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
499	ショクヨウホオズキ <i>Physalis pubescens</i> L. var. <i>grisea</i> Waterfall (syn. <i>P. pruinosa</i> non. L.)	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 芝山町, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】110:昭和30年代以前 【県内侵入】110:1995年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】別名ケセンナリ 【文献全般】60,109,285,286,302,316,319,40,349,344 【文献県内】263,39,34131

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
500	センナリホオズキ <i>Physalis pubescens</i> L. var. <i>pubescens</i>	C	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:1856年以前 【県内侵入】250:1930年代以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり
在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,78,165,349,344 【文献県内】255,331,131

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
501	ハコベホオズキ <i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill. (syn. <i>S. rhomboidea</i> (Gill. et Hook.) Miers.)	C	C

【原産】南米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 北総と南総の西部に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:明治中期? 【県内侵入】250:1976年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94,241,238,239,109,285,286,302,317,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39,大野影徳.1976.ハコベホオズキ習志野市谷津町に繁殖する.植物採集ニュース(88)48-49.

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
502	テリミノイヌホオズキ(垂れ実型) <i>Solanum americanum</i> Miller	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:1951年以前 【県内侵入】250:1960年以前 【影響】121,310,200 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109 【文献県内】39

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
503	カンザシイヌホオズキ <i>Solanum americanum</i> Miller var.	C	C

【原産】南米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総と南総の西部に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:1965年頃 【県内侵入】250:1983年以前 【影響】121,310,200 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94,238,109,311,349 【文献県内】39

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
504	シロミノカンザシイヌホオズキ <i>Solanum americanum</i> Miller var.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 柏市, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:1996年以前 【県内侵入】250:1996年以前 【影響】121,310,200 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】カンザシイヌホオズキの品種 【文献全般】- 【文献県内】斉藤吉永.1996.シロミノカンザシイヌホオズキ柏に現る.千葉県植物誌資料6:35.

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
505	キンギンナスビ <i>Solanum capsicoides</i> All. (syn. <i>S. ciliatum</i> Lam.)	D	C

【原産】熱帯南米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 鴨川市(仁右衛門島), 多い 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:明治初期 【県内侵入】161:1957年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】82,238,239,285,286,302,319,311,326,40,202,78,165,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	ナス科		影響度	緊急度
506	ワルナスビ	要注意外来生物(情報不足)	B	B
	<i>Solanum carolinense</i> L.			

【原産】北米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】250: 1907年以前 【県内侵入】250: 明治 【影響】121, 310, 200, 220 【緊急】- 【対策】異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81, 94, 222, 238, 239, 60, 109, 272, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	ナス科		影響度	緊急度
507	オオイヌホオズキ		C	C
	<i>Solanum nigrescens</i> Mart. et Gal.			

【原産】南米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】250: 1910年以前 【県内侵入】250: 1930年以前 【影響】121, 310, 200 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81, 109, 286, 317, 312, 40, 202 【文献県内】214, 39

種子植物	ナス科		影響度	緊急度
508	ヒメケイヌホオズキ		D	C
	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds			

【原産】南米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 柏市, 富津市, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】250: 1950年代 【県内侵入】250: 1958年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109, 286, 317, 312, 40, 202 【文献県内】39

種子植物	ナス科		影響度	緊急度
509	タマサンゴ		C	C
	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.			

【原産】ブラジル 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 船橋市市川市暖地で増える, 極少 【形態・生態】連緑・小低木 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】161: 明治中期 【県内侵入】161: 1929年以前(栽培) 【影響】280, 200 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 232, 241, 239, 60, 109, 285, 286, 317, 311, 312, 40, 331, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】39

種子植物	ナス科		影響度	緊急度
510	アメリカイヌホオズキ		C	C
	<i>Solanum ptycanthum</i> Dunal ex DC.			

【原産】北米～熱帯米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】250: 昭和30年代以前 【県内侵入】250: 1977年以前 【影響】121, 310, 200 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81, 239, 60, 109, 285, 319, 311, 349, 344 【文献県内】39

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
511	トマトダマシ <i>Solanum rostratum</i> Dunal	D	B

【原産】北アメリカ 【国内分布】中部,関東 【県内分布】分布度a 君津市, 極少 【形態・生態】夏緑・一年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:鳥散:秋 【国内侵入】210:1955年 【県内侵入】210:1955年 【影響】310 【緊急】- 【対策】適切な除草 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
512	ケイヌホオズキ <i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn.	D	C

【原産】南米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 柏市,富津市,館山市, 極少 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:1950年 【県内侵入】250:1992年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94,232,241,238,239,60,109,286,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】263,269,39,34

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
513	ハリナスビ <i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	C	C

【原産】南米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 主として南総西部に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:江戸末期 【県内侵入】161:1973年以前 【影響】トゲ有り,121,310,220 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39,34,368

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
514	トゲハリナスビ <i>Solanum undatum</i> Lam. (syn. <i>S. coagulans</i> auct. non. Forsc.)	C	C

【原産】中国南部,東南アジア,インド 【国内分布】千葉県 【県内分布】分布度a 船橋市に一時帰化, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】250:1999年以前 【県内侵入】250:1999年以前 【影響】トゲ有り,121,310,220 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】39

種子植物	ナス科	影響度	緊急度
515	アカミノイヌホオズキ <i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>miniaturum</i> (Bernh. ex Willd.) Edmonds (syn. <i>S. luteum</i> Mill. subsp. <i>alatum</i> (Moench) Dostal)	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 山武市, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】240:1931年以前 【県内侵入】240:1931年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】39

種子植物	フジウツギ科	影響度	緊急度
516	フサフジウツギ <i>Buddleja davidii</i> Franch.	C	C

【原産】中国西部 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】161: 1952年以前 【県内侵入】161: 1950年代以前(栽培) 【影響】121, 280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 336, 239, 60, 273, 300, 317, 311, 312, 331, 332, 202, 165, 349, 344 【文献県内】39

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
517	ヒサウチソウ <i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 千葉市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 夏 【国内侵入】250: 1993年以前 【県内侵入】250: 1998年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】241, 286, 312, 40, 202 【文献県内】大野啓一. 2007. 千葉市にヒサウチソウが帰化. 千葉県植物誌資料23: 198-199.

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
518	ヒナウンラン <i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	D	C

【原産】欧州 【国内分布】千葉県 【県内分布】分布度a 千葉市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 夏 【国内侵入】220: 1993年 【県内侵入】220: 1993年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】286, 319, 311, 312, 40, 202, 349 【文献県内】39

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
519	ツタバウンラン <i>Cymbalaria muralis</i> Gaertn. Mey. et Scherb.	C	C

【原産】地中海沿岸～欧州 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 匍匐枝で栄養繁殖, 種子: 風散: 夏～秋 【国内侵入】161: 大正初年 【県内侵入】161: 1986年以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 232, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 311, 312, 40, 202, 71, 349, 344 【文献県内】214, 39

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
520	イワカラクサ <i>Erinus alpinus</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州, 北海道(栽培) 【県内分布】分布度a 芝山町, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 匍匐枝で栄養繁殖, 種子: 風散: 夏 【国内侵入】161: 1995年以前 【県内侵入】161: 1995年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】39

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
521	ヒメツルウンラン <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】千葉県 【県内分布】分布度a 成田市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】220:1992年 【県内侵入】220:1992年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】286,312,40,202 【文献県内】39

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
522	マツバウンラン <i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】250:1941年 【県内侵入】250:1988年以前 【影響】310,280 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,202,165,344 【文献県内】214,39

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
523	ムラサキウンラン <i>Linaria incarnata</i> (Vent.) Sprengel	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 全県に散在, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:1870年頃 【県内侵入】161:1988年以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,286,302,317,319,312,40,331,332,202 【文献県内】214,39

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
524	ホソバウンラン <i>Linaria vulgaris</i> Miller	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 茂原市,佐倉市,千葉市,富津市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161,220:大正 【県内侵入】161,220:1990年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,60,109,285,286,319,311,312,40,202 【文献県内】214,39

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
525	ヒメアメリカゼナ <i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 柏市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1933年 【県内侵入】250:1997年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】232,60,109,285,286,317,319,311,312,40,202,349 【文献県内】39

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
526	タケトアゼナ <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>dubia</i>	B	B

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1936年? 【県内侵入】250:1986年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,109,285,286,317,319,311,312,40,202,349 【文献県内】39

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
527	アメリカアゼナ <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>major</i> Pennell	B	B

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】250:1934年以前 【県内侵入】250:1934年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法検討,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,165,349,344 【文献県内】214,39,34,148,15

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
528	セイヨウヒキヨモギ <i>Parentucella viscosa</i> Caruel	C	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 北総・南総の都市部に散在, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】220:1973年 【県内侵入】220:1992年以前 【影響】121 【緊急】有れば群生し, 増える 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】241,239,60,109,285,286,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
529	キリ <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb. ex Murray) Steud.	D	C

【原産】中国南部 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 極少 【形態・生態】落葉高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】110:奈良 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,109,273,300,317,332,165 【文献県内】214,39

種子植物	ゴマノハグサ科	国RDB:VU	影響度	緊急度
530	トウテイラン <i>Pseudolysimachion ornatum</i> (Monjusz.) Holb.		D	C

【原産】本州(自生) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 鋸南町, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:日本原産 【県内侵入】161:1962年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】272,302,332 【文献県内】39

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
531	シロバナモウズイカ <i>Verbascum blattaria</i> L. f. <i>erubescens</i> Brugger	D	C

【原産】ヨーロッパ, アジア, 北アフリカ 【国内分布】近畿, 中部, 関東, 東北, 北海道 【県内分布】分布度a 野田市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】210: 明治年間 【県内侵入】210: 明治年間 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
532	モウズイカ <i>Verbascum blattaria</i> L.	D	C

【原産】欧州～北アフリカ 【国内分布】北海道, 本州 【県内分布】分布度a 富津市, 船橋市, 袖ヶ浦市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 夏 【国内侵入】220: 1879年(栽培) 【県内侵入】220: 1985年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】81, 232, 222, 238, 239, 60, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 78, 349, 344 【文献県内】39, 34

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
533	ビロードモウズイカ <i>Verbascum thapsus</i> L.	C	B

【原産】欧州, ユーラシア 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 北総・南総の西部に分布, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】161, 220: 明治初年(導入) 【県内侵入】161, 220: 1988年以前 【影響】310, 280 【緊急】- 【対策】管理区域外への遺棄防止 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 222, 238, 239, 60, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
534	ホザキモウズイカ <i>Verbascum virgatum</i> Stokes	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 市川市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】220: 1956年以前 【県内侵入】220: 1986年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】241, 238, 239, 109, 285, 286, 302, 317, 40, 202 【文献県内】39, 34

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
535	オオカワヂシャ <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	特定外来生物 A	A

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 北総・南総西部に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 水散: 夏 【国内侵入】163: 1867年 【県内侵入】163: 1989年以前 【影響】350, 100, 121 【緊急】- 【対策】外来生物法の遵守 【備考】- 【文献全般】94, 60, 109, 285, 286, 302, 319, 311, 312, 40, 202, 165, 349 【文献県内】214, 39

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
536	タチイヌノフグリ <i>Veronica arvensis</i> L.	C	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 極多 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1870年頃 【県内侵入】210:1928年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
537	コゴメイヌノフグリ <i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	C	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 柏市の利根運河土手, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:1961年(栽培) 【県内侵入】161:2007年以前 【影響】121 【緊急】種子の発芽率たかく増殖しやすい 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】柏市の利根運河土手に出現,また千葉市都市緑化植物園へ移入されており、そこから逸出の可能性あり 【文献全般】81,286,319,311,312,40,202 【文献県内】木村陽子.2008.柏市利根運河のコゴメイヌノフグリ.千葉県植物誌資料24:220-221.

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
538	フラサバソウ <i>Veronica hederifolia</i> L.	C	B

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:明治 【県内侵入】210:1966年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34,小松崎一雄.1962.10年前に千葉県松戸市で採集されたフラサバソウ.植物採集ニュース(4):14.

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
539	オオイヌノフグリ <i>Veronica persica</i> Poiret	C	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 極多 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1870年頃 【県内侵入】210:1927年以前 【影響】310,121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	ゴマノハグサ科	影響度	緊急度
540	コテングクワガタ <i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>	C	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 野田市,芝地由来で増えている,北方系, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】220:1947年 【県内侵入】220:2004年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,241,109,285,286,302,317,319,312,40,202,349 【文献県内】引田園子.2006.コテングクワガタ…現状と経過…千葉県植物誌資料21:184.

種子植物	ゴマノハグサ科	国内外来生物	影響度	緊急度
541	ホナガカワヂシャ <i>Veronica x myriantha</i> Tos. Tanaka		B	B

【原産】日本(雑種)オオカワヂシャ×カワヂシャ(在来) 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 野田市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】163:1999年以前 【県内侵入】163:1999年以前 【影響】在来種との雑種で、遺伝子かく乱,141,121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】カワヂシャ(在来品)とオオカワヂシャ(帰化品)との雑種 【文献全般】- 【文献県内】木村陽子.2004.ホナガカワヂシャ千葉県に出現.千葉県植物誌資料20:160.

種子植物	ノウゼンカズラ科	影響度	緊急度
542	ノウゼンカズラ <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb. ex Murray) Loisel.	D	C

【原産】中国南部 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総・南総に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・藤本 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:平安 【県内侵入】161:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,312,40,332,165 【文献県内】39

種子植物	ノウゼンカズラ科	影響度	緊急度
543	アメリカキササゲ <i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総に散在, 極少 【形態・生態】落葉高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散+風散:秋 【国内侵入】161:明治末期 【県内侵入】161:1928年以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,109,300,332,202,165,349 【文献県内】39

種子植物	ノウゼンカズラ科	影響度	緊急度
544	キササゲ <i>Catalpa ovata</i> G.Don	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総・南総に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:自散+風散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:1929年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,60,109,273,300,311,312,332,202,78,165,349 【文献県内】39

種子植物	ハマウツボ科	要注意外来生物(情報不足)	影響度	緊急度
545	ヤセウツボ <i>Orobanche minor</i> Sm.		B	B

【原産】欧州～北アフリカ 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】無葉緑・草本 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】250:1937年以前 【県内侵入】250:1937年以前 【影響】310,280 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,94,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】214,269,39,34

種子植物	タヌキモ科	影響度	緊急度
546	オオバナイトタヌキモ <i>Utricularia gibba</i> L.	C	B

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 千葉市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,枝がちぎれて栄養繁殖,種子:水散:秋 【国内侵入】161,210:1952年以前 【県内侵入】210ホームセンターなどで売っているホテイアオイなどに株子がついてくる. :1970年以前 【影響】310,200,冬でも越冬して、強い植物.野外に逸出すると他の植物にからみつき除去が困難 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312,40,202 【文献県内】39

種子植物	オオバコ科	影響度	緊急度
547	ヘラオオバコ <i>Plantago lanceolata</i> L.	C	C

【原産】欧州,ユーラシア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重+着散:夏 【国内侵入】250:江戸末期 【県内侵入】250:1927年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	オオバコ科	影響度	緊急度
548	セイヨウオオバコ <i>Plantago major</i> L. var. <i>major</i>	D	C

【原産】欧州,西アジア,北アフリカ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重+着散:夏〜秋 【国内侵入】250:1957年以前 【県内侵入】250:1991年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	オオバコ科	影響度	緊急度
549	ハイオオバコ <i>Plantago squarrosa</i> Murray	D	C

【原産】欧州南部 【国内分布】神奈川県,千葉県 【県内分布】分布度a 習志野市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重+着散:夏 【国内侵入】250:1961年以前 【県内侵入】250:1961年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,286,317,312,40,202 【文献県内】39

種子植物	オオバコ科	影響度	緊急度
550	ツボミオオバコ <i>Plantago virginica</i> L.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重+着散:夏 【国内侵入】250:1913年 【県内侵入】250:1952年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,326,40,202,71,78,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	スイカズラ科	影響度	緊急度
551	ハナツクバネウツギ <i>Abelia x grandiflora</i> Rehd.	D	C

【原産】欧州(交配種) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 北総と南総に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:1929年以前 【県内侵入】161:1929年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,332 【文献県内】39

種子植物	スイカズラ科	影響度	緊急度
552	キンギンボク <i>Lonicera morrowii</i> A.Gray	D	C

【原産】北海道,本州,四国(自生) 【国内分布】北海道,本州,四国(自生) 【県内分布】分布度a 市原市, 極少 【形態・生態】落葉低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:日本原産 【県内侵入】161:1990年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,336,273,300,190,165 【文献県内】39

種子植物	スイカズラ科	国内外来生物	影響度	緊急度
553	サンゴジュ <i>Viburnum odoratissimum</i> Ker.Gaul. var. <i>awabuki</i> (K.Koch) Zabel		D	C

【原産】本州南部,四国,九州,東南アジア 【国内分布】本州,四国,九州(自生,栽培) 【県内分布】分布度b 全県に分布, 極少 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:日本原産 【県内侵入】161:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,300,332 【文献県内】39

種子植物	オミナエシ科	影響度	緊急度
554	ノヂシャ <i>Valerianella locusta</i> (L.) Latter	C	C

【原産】欧州 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総に分布, 多い 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】210:明治初年 【県内侵入】210:1971年以前 【影響】310,121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,241,222,239,109,285,286,302,317,312,40,190,202,71,78,165 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	マツムシソウ科	影響度	緊急度
555	オニナベナ <i>Dipsacus fullonum</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 印西市(旧印旛村), 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:着散:秋 【国内侵入】210:江戸 【県内侵入】210:2003年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】300,332 【文献県内】39

種子植物	キキョウ科	影響度	緊急度
556	ハタザオギキョウ <i>Campanula rapunculoides</i> L.	D	C

【原産】コーカサス,小アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 富里市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:1890年頃 【県内侵入】161:1992年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】302,312,40,331,202,349 【文献県内】39

種子植物	キキョウ科	影響度	緊急度
557	ロベリアソウ <i>Lobelia inflata</i> L.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 成田市,富里市,千葉市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】210:明治(栽培) 【県内侵入】210:1965年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,238,239,286,302,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	キキョウ科	影響度	緊急度
558	ヒナキキョウソウ <i>Triodanis biflora</i> (Ruiz et Pav.) Greene	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 千葉市,芝山町, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】210:1931年 【県内侵入】210:1990年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241,238,60,109,285,286,302,317,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	キキョウ科	影響度	緊急度
559	キキョウソウ <i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総と南総に分布, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】210:1911年以前 【県内侵入】210:1975年以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,311,312,326,40,202,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
560	キバナノコギリソウ <i>Achillea filipendulina</i> Lam.	D	C

【原産】西アジア 【国内分布】北海道,本州(東北)でときに逸出 【県内分布】分布度a 市原市菊間, 極少～少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,230,239,285,286,319,311,312,39,331,202,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
561	セイヨウノコギリソウ <i>Achillea millefolium</i> L.	C	C
【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 北総～東葛に多い, 極少～少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】110,161:1887年 【県内侵入】110,161:1951年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり,販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,241,230,238,239,60,109,285,286,278,302,317,319,311,326,39,34,331,190,71,74,78,165,349,344 【文献県内】263,268,270,39,34			

種子植物	キク科	影響度	緊急度
562	アカバナセイヨウノコギリソウ <i>Achillea millefolium</i> L. var. <i>pumiceus</i> Sugawara	D	C
【原産】欧州 【国内分布】千葉県 【県内分布】分布度a 市原市,館山市, 極少. 逸出帰化 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】110,161:昭和以前(栽培) 【県内侵入】110,161:1992年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり,販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312,40 【文献県内】-			

種子植物	キク科	影響度	緊急度
563	ノコギリソウモドキ <i>Achillea stricta</i> (W.D.J.Koch) Schleich. ex Gremli	D	C
【原産】欧州 【国内分布】千葉県,神奈川県 【県内分布】分布度a 富里市, 極少. 栽培の逸出 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】161:1988年以前 【県内侵入】161:1993年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】317,312,40,39,202 【文献県内】39			

種子植物	キク科	影響度	緊急度
564	ヌマツルギク <i>Acmella oppositifolia</i> (Lam.) R.K.Jensen (syn. <i>Spilanthes oppositifolia</i> (Lam.) D.Arcy ; <i>Spilanthes americana</i> (L.) Hieron.)	B	B
【原産】北米 【国内分布】本州(関東以西),九州 【県内分布】分布度a 富里市葉山, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,不定芽,種子:重散:夏～秋(不定芽は春～秋) 【国内侵入】163:1961年頃 【県内侵入】163:1997年以前 【影響】121 繁殖力が強い 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】239,60,109,285,286,311,312,40,39,202,349,344 【文献県内】39			

種子植物	キク科	影響度	緊急度
565	マルバフジバカマ <i>Ageratina altissima</i> (L.) R.M.King et H.Rob.	D	C
【原産】北米 【国内分布】北海道,関東(関東周辺) 【県内分布】分布度a 佐倉市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,不定芽,種子:風散:秋 【国内侵入】161:1916年 【県内侵入】161:2006年以前 【影響】地下茎でさかんに繁殖する 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,238,239,109,285,286,275,317,319,311,312,40,190,202,74,78,349,344 【文献県内】寺村敬子.2007.マルバフジバカマの確認.千葉県植物誌資料22:195.			

種子植物	キク科	影響度	緊急度
566	カッコウアザミ <i>Ageratum conyzoides</i> L.	D	C

【原産】熱帯米,メキシコ 【国内分布】本州(関東周辺),四国,九州 【県内分布】分布度a 富里市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:着散,重散:夏～秋 【国内侵入】161:1870年頃 【県内侵入】161:1930年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】214,230,238,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,165,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	キク科	要注意外来生物(情報不足)	影響度	緊急度
567	ブタクサ <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.		B	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に普通, 中程度～多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1880年 【県内侵入】250:1930年代以前 【影響】121繁殖力が強い,240花粉症の原因 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,214,222,238,239,60,102,109,285,275,278,302,317,319,311,312,40,39,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
568	ブタクサモドキ <i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	D	C

【原産】北アメリカ 【国内分布】関東 【県内分布】分布度a 船橋市,館山市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:1966年 【県内侵入】161:1966年 【影響】121 【緊急】- 【対策】適切な除草 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	キク科	要注意外来生物(適否検討), 生態学会100	影響度	緊急度
569	オオブタクサ <i>Ambrosia trifida</i> L.		A	A

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 全県に分布,河原・造成地に極めて多い, 極多 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1953年以前 【県内侵入】250:1957年以前 【影響】121繁殖力が強い,240花粉症の原因になる,120 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,241,214,222,238,239,60,109,285,275,278,317,319,311,40,39,34,202,71,79,165,357,349,252,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
570	アレチカミツレ <i>Anthemis arvensis</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸,コーカサス,イラン 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 県北部に稀, 極少～少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】250:明治初年 【県内侵入】250:1977年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,109,285,286,278,302,317,312,40,39,190,202,357 【文献県内】267

種子植物	キク科		影響度	緊急度
571	カミツレモドキ	要注意外来生物(情報不足)	D	C
<i>Anthemis cotula</i> L.				

【原産】欧州,北アフリカ,西アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 極少～少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】210:1931年 【県内侵入】210:1977年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,275,278,302,319,311,326,39,34,190,202,71,78,357,349,344 【文献県内】263,39,34

種子植物	キク科		影響度	緊急度
572	ゴボウ		D	C
<i>Arctium lappa</i> L.				

【原産】ユーラシア 【国内分布】秋田県,神奈川県,千葉県 【県内分布】分布度a 全県に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・2年～多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】110:弥生～奈良 【県内侵入】110:弥生～室町 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】286,312,40 【文献県内】39

種子植物	キク科		影響度	緊急度
573	ワタゲツルハナグルマ		C	C
<i>Arctotheca prostrata</i> (Salisb.) Britten				

【原産】南アフリカ 【国内分布】東京都,神奈川県,佐渡島 【県内分布】分布度a 千葉市幕張, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝による栄養繁殖,種子:重散:春～秋 【国内侵入】161,130:1995年(逸出) 【県内侵入】161,130:1995年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける方針策定 【備考】- 【文献全般】109,317,312,40,39 【文献県内】39

種子植物	キク科		影響度	緊急度
574	イワヨモギ	国RDB:VU	B	B
<i>Artemisia gmelinii</i> Weber ex Stechm.				

【原産】北海道～青森(国内帰化) 【国内分布】本州,四国,九州(国内帰化) 【県内分布】分布度b 県南部を中心に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草・亜高木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎による栄養繁殖,種子:風散:秋 【国内侵入】131,220:日本原産 【県内侵入】131,220:1995年以前 【影響】121法面緑化に使われ、自然度の高いところにも侵入,240花粉症の原因 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,方針策定 【備考】- 【文献全般】240,302,317,39,190 【文献県内】39

種子植物	キク科		影響度	緊急度
575	ハイイロヨモギ	要注意外来生物(緑化植物)	B	B
<i>Artemisia sieversiana</i> Willd.				

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】長野県,京都府,埼玉県,千葉県,さらに分布の可能性 【県内分布】分布度a 柏市東上町, 極少 【形態・生態】夏緑・1～2年草 【繁殖】花粉:風媒,地下茎による栄養繁殖,種子:風散:秋 【国内侵入】131,300:1952年 【県内侵入】131:1997年以前 【影響】121法面緑化に使われ、自然度の高いところにも侵入,240花粉症の原因 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,方針策定 【備考】まだ千葉県には少なくとも予防的に 【文献全般】239,109,285,302,319,311,40,190,349,252,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
576	キダチコンギク <i>Aster pilosus</i> Willd.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州(関東以西), 四国, 九州 【県内分布】分布度a 県北部に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草
 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:風散:夏～秋 【国内侵入】161:1950～53年頃 【県内侵入】161:1991年以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 241, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 278, 276, 317, 319, 311, 312, 40, 39, 349, 344 【文献県内】39

種子植物	キク科	国内外来生物	影響度	緊急度
577	ミヤマヨメナ <i>Aster savatieri</i> Makino		D	C

【原産】日本 【国内分布】本州, 四国, 九州の山地に自生 【県内分布】分布度a 全県に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草
 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:重散:夏 【国内侵入】もともと自生:もともと日本原産 【県内侵入】161:1991年以前(逸出) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】ミヤコワスレの名で栽培されるものが時に逸出 【文献全般】39 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
578	オオホウキギク <i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>ligulatus</i> Shinnars (syn. <i>Aster exilis</i> Elliot)	B	C

【原産】北米? 【国内分布】本州(関東以西), 四国, 九州でとびとびに分布 【県内分布】分布度b 東京湾岸の工業地帯に多い, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:風散:夏～秋 【国内侵入】250:1956年 【県内侵入】250:1968年以前
 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94, 241, 214, 238, 60, 109, 286, 279, 278, 302, 317, 319, 311, 312, 39, 34, 202, 349, 344 【文献県内】214, 269, 39, 34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
579	ホウキギク <i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>obtusifolius</i> Fernald	B	C

【原産】北米 【国内分布】本州(小笠原), 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年～多年草
 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:風散, 水散:秋 【国内侵入】250:1910年頃 【県内侵入】250:1930年代以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81, 94, 241, 214, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 275, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 39, 34, 190, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 269, 39, 34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
580	ヒロハホウキギク <i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>subulatus</i>	B	C

【原産】北米 【国内分布】本州(関東以西), 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に普通, 極多～多い 【形態・生態】夏緑・1～多年草
 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:風散, 水散:秋 【国内侵入】250:1967年以前 【県内侵入】250:1983年以前 【影響】121繁殖力が高い 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94, 241, 214, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 317, 319, 311, 312, 40, 39, 190, 202, 349, 344 【文献県内】214, 269, 39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
581	キンバイタウコギ <i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	D	C

【原産】中央米 【国内分布】本州(関東以西), 四国, 九州 【県内分布】分布度a 全県にあるが少ない, 極少～少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 着散: 秋～冬 【国内侵入】161: 1957年 【県内侵入】161: 1984年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232, 241, 238, 239, 109, 285, 286, 278, 317, 319, 311, 312, 40, 39, 34, 202, 349, 344 【文献県内】39, 34, 斉藤吉永. 1972. 千葉県下に産するキンバイタウコギ. 植物採集ニュース(35): 1-2.

種子植物	キク科	影響度	緊急度
582	コバノセンダングサ <i>Bidens bipinnata</i> L.	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 着散: 秋～冬 【国内侵入】240: 1925年以前 【県内侵入】240: 1951年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】94, 241, 214, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 39, 202, 71, 165, 349, 344 【文献県内】214, 39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
583	センダングサ <i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff ex Sherff	C	C

【原産】暖帯～熱帯に広く分布 【国内分布】関東以西, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 着散: 秋～冬 【国内侵入】240: 史前帰化説も 【県内侵入】240: 1929年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】238, 239, 109, 285, 278, 302, 317, 312, 39, 78 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
584	アメリカセンダングサ <i>Bidens frondosa</i> L.	B	B

【原産】北米 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に普通, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 着散+水散: 秋～冬 【国内侵入】240: 1920年 【県内侵入】240: 1930年代以前 【影響】121, 310 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 214, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 278, 302, 317, 319, 311, 40, 39, 34, 190, 202, 71, 74, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 269, 39, 34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
585	コセンダングサ <i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	B	B

【原産】熱帯米 【国内分布】本州, 四国, 九州に帰化 【県内分布】分布度c 全県に普通, 極多～多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 着散: 秋～冬 【国内侵入】240: 1908年以前 【県内侵入】240: 1975年以前 【影響】121, 310, 水田地帯や河原でも非常に多く, 他の在来種と競合の恐れ 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】94, 241, 214, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 278, 302, 319, 311, 312, 40, 39, 34, 190, 202, 71, 78, 165, 357, 349, 344 【文献県内】214, 263, 269, 39, 34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
586	シロバナセンダングサ <i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i> form.	B	B

【原産】熱帯米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県にあり,コセンダングサと混生,最近増加傾向?,中程度〜多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:着散:秋〜冬 【国内侵入】240:江戸末期 【県内侵入】240:1960年代以前 【影響】121繁殖力が強い 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】241,214,239,109,285,286,278,302,317,312,40,39,34,190,202,78,165 【文献県内】214,263,269,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
587	タホウタウコギ <i>Bidens polylepis</i> Blake	D	C

【原産】北米 【国内分布】新潟県,静岡県,千葉県など 【県内分布】分布度a 柏市, 少ない 【形態・生態】夏緑・1〜越年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:着散?:秋〜冬 【国内侵入】161:1970年代以前 【県内侵入】161:1989年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】239,286,276,319,311,312,40,39,202,349 【文献県内】斉藤吉永.1970.タホウタウコギの新知見.千葉植物誌38(2):59-60.

種子植物	キク科	影響度	緊急度
588	セイヨウトゲアザミ <i>Breia arvensis</i> (L.) Less.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 東葛南部に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,不定芽,地下茎による栄養繁殖,種子:風散:夏〜秋 【国内侵入】250:1965年頃 【県内侵入】250,131(?):1984年以前 【影響】220刺がある,310 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,方針策定,可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,241,109,285,286,278,317,319,311,312,40,39,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
589	エゾノキツネアザミ <i>Breia setosa</i> (M.Bieb.) Kitamura	C	C

【原産】中国〜シベリア,ロシア 【国内分布】北海道,本州(青森県)自生? 【県内分布】分布度a 千葉市ほか, 極少〜少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏〜秋 【国内侵入】250:日本原産 【県内侵入】250:1965年以前 【影響】220刺がある,310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】278,302,317,312,39,190,165 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
590	ヒメキンセンカ <i>Calendula arvensis</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 下総町ほか, 少ない. 園芸流通と繁殖の強さから増加傾向 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:春〜秋,暖かいところは冬も 【国内侵入】161:江戸末期 【県内侵入】161,131,132:2001年以前 【影響】280こぼれ種による繁殖力が強い 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,地域個体群の遺伝的多様性を保持した種苗の植栽,方針策定 【備考】- 【文献全般】232,109,302,317,312,40,39,332,202,165 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
591	キンセンカ <i>Calendula officinalis</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】稀に逸出 【県内分布】分布度a 稀に逸出している程度, 極少～少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:着散:冬～春 【国内侵入】161,131,132:江戸(栽培) 【県内侵入】161,131,132:昭和初期(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,地域個体群の遺伝的多様性を保持した種苗の植栽,方針策定 【備考】- 【文献全般】39 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
592	ヒメヒレアザミ <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】兵庫県,三重県,千葉県 【県内分布】分布度a 東葛南部, 極少 【形態・生態】冬夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:春～夏 【国内侵入】250:1963年 【県内侵入】250:2003年以前 【影響】220トゲ有り,繁殖する 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】241,239,286,275,276,302,319,311,39,202,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
593	ベニバナ <i>Carthamus tinctorius</i> L. var. <i>spinosus</i> Kitamura	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 県南部, 極少 【形態・生態】夏緑・1～2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】110,131:平安(栽培) 【県内侵入】110,131:1991年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,方針策定 【備考】- 【文献全般】238,239,109,285,286,278,302,317,312,40,39,190,202,165 【文献県内】263,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
594	ムラサキイガヤグルマギク <i>Centaurea caricitraps</i> L.	C	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】神奈川県,三重県,岡山県など 【県内分布】分布度a 市川市, 極少 【形態・生態】夏緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散,風散:夏～秋 【国内侵入】250:昭和初期 【県内侵入】250:1955年以前 【影響】220(トゲ),繁殖する 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】241,238,239,109,285,286,302,319,311,312,40,39,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
595	ヤグルマギク <i>Centaurea cyanus</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸東部 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 全県に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:春～夏 【国内侵入】161,130,(110):江戸末期 【県内侵入】161,130,(110):1931年(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける方針策定 【備考】- 【文献全般】

81,241,60,109,285,286,302,317,319,312,40,39,190,202,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
596	クロアザミ <i>Centaurea nigra</i> Willd.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州(千葉県) 【県内分布】分布度a 印旛,放牧地の害草 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】100:1933年以前 【県内侵入】100:1933年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,239,278,302,319,311,40,39,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
597	イガヤグルマギク <i>Centaurea solstitialis</i> L.	C	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 船橋, 少ない 【形態・生態】夏緑・1～2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】250:1915年 【県内侵入】250:1972年以前 【影響】240,220(トゲ) 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,109,286,275,302,317,319,311,312,326,40,39,34,202,78,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
598	ヒレハリギク <i>Centaureum melitensis</i> L.	C	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少(一時帰化?) 【形態・生態】夏冬緑1～2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】250:1915年 【県内侵入】250:1968年以前 【影響】220トゲ有り 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】241,238,239,109,286,319,311,312,40,39,34,202,78,349,344 【文献県内】39,34,吉川代之助.1970.千葉県生物誌18:51.

種子植物	キク科	国内外来生物	影響度	緊急度
599	キクタニギク <i>Chrysanthemum boreale</i> (Makino) Makino	国RDB:NT, 県RDB:C	B	B

【原産】東アジア(日本に自生あり) 【国内分布】関東 【県内分布】分布度a 野田市,印旛村,市原市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で繁殖,種子:風散:秋 【国内侵入】220:1990年代 【県内侵入】220:1990年代 【影響】141 【緊急】- 【対策】適切な除草 【備考】在来系統を除草しないこと 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	キク科	影響度	緊急度
600	シュンギク <i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	D	C

【原産】南ヨーロッパ～地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 全県に散在, 極少(畑・人家近く) 【形態・生態】冬夏緑・1～2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:春～夏 【国内侵入】110:江戸中期(栽培) 【県内侵入】110:明治(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312,40,39 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
601	キク <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.	B	C

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県に散在, 極少(人里近くで時に逸出) 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋～冬 【国内侵入】161,132:奈良 【県内侵入】161,132:奈良～室町 【影響】141,142 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,地域個体群の遺伝的多様性を保持した種苗の植栽,方針策定 【備考】複数種の交雑による園芸品 【文献全般】272,302,331,332,165 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
602	ハナインソギク <i>Chrysanthemum x marginatum</i> (Miq.) Matsum.	B	B

【原産】本州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 銚子・安房の海岸地帯に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎による栄養繁殖,種子:重散:秋～冬 【国内侵入】161,交雑種:江戸以前 【県内侵入】161,交雑種:江戸以前 【影響】141繁殖力強い,園芸で販売されている,インソギクなどの遺伝子汚染が心配 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】別名サトインソギク. インソギク×キク. ハナインソギクは舌状花が白,サトインソギクは黄色 【文献全般】302 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
603	キクニガナ <i>Cichorium intybus</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,九州 【県内分布】分布度a 全県にまばらに分布, 少ない(チコリの名で栽培,ときに逸出) 【形態・生態】連緑・2～多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:春～夏 【国内侵入】110,161:明治?(栽培) 【県内侵入】110,161:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり,販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,60,109,285,286,278,302,316,317,319,311,312,40,190,202,165,349,344 【文献県内】39,34,367

種子植物	キク科	国内外来生物	影響度	緊急度
604	フジアザミ <i>Cirsium purpuratum</i> (Maxim.) Matsum.		D	C

【原産】日本 【国内分布】宮城県～愛知県,岐阜県,福井県 【県内分布】分布度a 松戸,千葉県では逸出,一時帰化で現在はない? 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】自生:日本原産 【県内侵入】240:1970年代以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,272,302,190,165 【文献県内】39

種子植物	キク科	国内外来生物(情報不足)	影響度	緊急度
605	アメリカオニアザミ <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.		B	A

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,(北日本に多い) 【県内分布】分布度b 県北部を中心に分布, 中程度～多い 【形態・生態】冬緑・2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】250:1960年以前 【県内侵入】250:1993年以前 【影響】220,121,とげあり,繁殖力強い(岩槻メモ:Aでもいいくらい) 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,94,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】214,39,34,斉藤吉永.1996.アメリカオニアザミ 佐倉市に侵入. 千葉生物誌45(2):27-28.

種子植物	キク科	影響度	緊急度
606	アレチノギク <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	C	C

【原産】南米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州,琉球,小笠原 【県内分布】分布度c 全県に分布, 中程度(都市的環境) 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:通年 【国内侵入】240:1890年前後 【県内侵入】240:1958年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	キク科	要注意外来生物(情報不足)	影響度	緊急度
607	ヒメムカシヨモギ <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist		B	B

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州,琉球 【県内分布】分布度c 全県に普通, 極多. 空き地などに 【形態・生態】連緑・1~2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏~秋 【国内侵入】240:1870年頃 【県内侵入】240:1929年以前 【影響】121,240,繁殖力が強い 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,275,302,317,319,311,326,40,190,202,71,78,165,357,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	キク科	要注意外来生物(情報不足), 生態学会100	影響度	緊急度
608	オオアレチノギク <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker		B	C

【原産】南米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州,琉球 【県内分布】分布度c 全県に普通, 多い~極多. ヒメムカシヨモギと共に大群生する 【形態・生態】冬緑・1~2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏~秋 【国内侵入】240:1920年前後 【県内侵入】240:1935年以前 【影響】310,121,繁殖力が強く大群生する 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,232,222,238,239,60,285,278,276,302,319,311,190,78,165,357,349,344 【文献県内】214,263,269,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
609	キンケイギク <i>Coreopsis basalis</i> (A.Dietr.) S.F.Blake	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州(まれで、たまに一時帰化) 【県内分布】分布度a 全県にまばらに分布, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏~秋 【国内侵入】161,(131):明治 【県内侵入】161,(131):2003年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,方針策定 【備考】- 【文献全般】232,238,239,60,109,286,278,302,317,311,312,40,190,202,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	特定外来生物, 生態学会100	影響度	緊急度
610	オオキンケイギク <i>Coreopsis lanceolata</i> L.		A	A

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 全県に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏~秋 【国内侵入】161,131:明治 【県内侵入】161,131:1984年以前 【影響】280,121,かなり繁殖している 【緊急】- 【対策】外来生物法の遵守 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,275,317,319,311,312,326,40,331,190,202,71,165,349,344 【文献県内】263,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
611	ハルシャギク <i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	C	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 中程度,利根川河川敷で時々群落あり
 【形態・生態】冬緑・1～2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161,131:明治 【県内侵入】161,131:1927年以前(栽培)
 【影響】121,280,河川敷にあることも多く、河川敷固有種との競合が心配 【緊急】- 【対策】販売時の規制など,管理区域外へ遺棄防止,栽培ガイドラインづくり,可能なかぎり在来品種を使う 【備考】- 【文献全般】
 81,94,232,241,238,60,109,285,286,302,317,311,312,40,331,190,202,71,165,349,344 【文献県内】214,263,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
612	コスモス <i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	D	C

【原産】メキシコ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(時々逸出するが定着せず) 【県内分布】分布度b 北総～東葛南部の記録が多い, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:冬 【国内侵入】161,131,132:江戸 【県内侵入】161,131,132:(栽培)
 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の規制など,管理区域外へ遺棄防止,栽培ガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,60,109,285,286,279,278,302,317,319,311,312,331,190,202,71,165,349,344 【文献県内】263,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
613	キバナコスモス <i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	D	C

【原産】中央米～南米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(時々逸出するが定着せず) 【県内分布】分布度b 北総で記録が多い, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:大正初期 【県内侵入】161:1943年(栽培)
 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,238,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,190,202,71,165,349,344 【文献県内】263,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
614	マメカミツレ <i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f.	C	C

【原産】豪州 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 東葛南部,東京湾沿い, 多い～極多(市街地) 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:都市部では通年 【国内侵入】220:1939年 【県内侵入】220:1958年以前 【影響】310繁殖力が強い 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】94,232,241,238,239,60,109,285,286,275,278,302,317,311,312,40,202,78,357,349,252,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
615	ベニバナボロギク <i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	B	C

【原産】アフリカ 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に普通, 中程度～多い(伐採地や崩壊地等) 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】240:1950年 【県内侵入】240:1984年以前 【影響】121山林にも侵入し時に群生 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,275,278,302,317,319,311,312,40,190,202,71,165,357,349,344 【文献県内】214,39,34, 浅野貞夫.1972.ベニバナボロギクが千葉県の実境で育つ.植物採集ニュース(60):19.

種子植物	キク科	影響度	緊急度
616	セイヨウニガナ <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州(千葉県,神奈川県,長野県) 【県内分布】分布度a 千葉市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】250:1977年 【県内侵入】250:1991年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,286,278,319,311,312,40,202,349 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
617	ヤネタビラコ <i>Crepis tectorum</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度b 県北部に散在, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】250:1974年 【県内侵入】250:1974年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】81,232,239,60,109,285,286,317,319,311,312,40,190,202,349,344 【文献県内】斉藤吉永.1974.新帰化植物ヤネタビラコとヒメハルガヤ.植物採集ニュース(73):19-21.

種子植物	キク科	影響度	緊急度
618	アメリカタカサブロウ <i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	B	B

【原産】熱帯アメリカ(?) 【国内分布】関東以西に広く分布,北日本の状況は不明 【県内分布】分布度c 全県に普通, 中程度〜多い. 水田わきや畑などに 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散,水散:夏〜秋 【国内侵入】250:1989年以前 【県内侵入】250:1989年以前 【影響】310在来のタカサブロウとはわりと共存するが,他の希少な水田雑草と競合のおそれ 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】232,109,285,286,317,312,40,202 【文献県内】214,145,39,大場達之.1998.アメリカタカサブロウ.千葉県植物誌資料11:73-75.

種子植物	キク科	影響度	緊急度
619	オオハキダメギク <i>Eleutheranthera ruderalis</i> (Sw.) Sch.-Bip.	D	C

【原産】熱帯アメリカ 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋,市川, 極小. 一時帰化? 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1999年 【県内侵入】250:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
620	ナンカイウスベニニガナ <i>Emilia fosbergii</i> Nicolson	D	C

【原産】アフリカ 【国内分布】硫黄列島,千葉県 【県内分布】分布度a 習志野, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草(千葉では夏緑1年草) 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】250:昭和 【県内侵入】250:2000年頃 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】286,312,40 【文献県内】林信子.2006.ナンカイウスベニニガナ発見記.千葉県植物誌資料21:174.,大場達之・大野啓一・木村陽子.2006.ナンカイウスベニニガナ同定記.千葉県植物誌資料21:174-177.

種子植物	キク科	影響度	緊急度
621	ダンドボロギク <i>Erechtites hieracifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	B	C

【原産】北米,熱帯米 【国内分布】本州,四国,九州,琉球 【県内分布】分布度c 全県に普通, 多い. 山林や林縁などに 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】240:1933年 【県内侵入】240:1942年以前 【影響】121山林・林縁にも侵入,繁殖力強い 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,275,278,302,317,319,311,326,40,190,202,71,78,165,357,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
622	ヒメジョオン <i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	B	C

【原産】欧州,北米? 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県にごく普通, 道ばた・畑などに多い 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】240:江戸末期 【県内侵入】240:1929年以前 【影響】240,240,繁殖力が高い 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
623	ペラペラヨメナ <i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	C	C

【原産】中央米 【国内分布】本州(関東以西)～琉球にとびとびに分布 【県内分布】分布度b 館山など, 少ない. 石垣のようなところ 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:1949年 【県内侵入】161:1985年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】239,109,285,286,275,302,317,319,311,312,40,202,71,79,165,357,349,344,138 【文献県内】214,39,齊藤吉永.1986.ペラペラヨメナ房州館山に現れる.千葉生物誌36(1):45.

種子植物	キク科	影響度	緊急度
624	ハルジオン <i>Erigeron philadelphicus</i> L.	B	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に普通, 多い 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,不定芽,無配生殖,種子:風散:春・秋～冬 【国内侵入】161:1920年頃 【県内侵入】161:1952年以前 【影響】121,240 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,275,278,302,317,319,311,312,40,190,202,78,165,357,349,344 【文献県内】214,263,269,39,浅野貞夫.1966.ハルジオン房州に渡来する.植物採集ニュース(27):26.

種子植物	キク科	影響度	緊急度
625	ケナシヒメムカシヨモギ <i>Erigeron pusillus</i> Nutt.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州,琉球 【県内分布】分布度b 北総～九十九里に散在, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】240:1926年以前 【県内侵入】240:1962年以前 【影響】121,240,繁殖力が高い 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,241,222,238,239,60,109,285,286,275,278,302,317,311,312,40,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
626	テンニンギク <i>Gaillardia pulchella</i> Foug.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州(近畿以西), 四国, 九州 【県内分布】分布度a 成東, 極少. 栽培? 現在はない? 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 夏～秋 【国内侵入】161: 明治中頃(栽培) 【県内侵入】161: 1927年以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 232, 109, 285, 286, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 165, 349 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
627	コゴメギク <i>Galinsoa parviflora</i> Cav.	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州, 四国に点在 【県内分布】分布度a 東葛(関宿, 木間ヶ瀬地区でかなり繁殖), 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 夏～秋 【国内侵入】240: 昭和初期 【県内侵入】240: 1971年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】232, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 319, 311, 312, 40, 190, 202, 78, 349, 344 【文献県内】263, 39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
628	ハキダメギク <i>Galinsoa quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	C	C

【原産】北米, 熱帯米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に普通, 多い. 畑・路傍など 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】240: 1932年 【県内侵入】240: 1971年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 222, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 278, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 190, 202, 71, 78, 165, 349, 344, 139 【文献県内】214, 269, 39, 34

種子植物	キク科	国内外来生物	影響度	緊急度
629	アイセイタカハハコグサ <i>Gnaphalium affine</i> D.Don × <i>G. luteoalbum</i> L.		B	C

【原産】日本 【国内分布】本州(神奈川県, 千葉県) 【県内分布】分布度b 北総で記録が多い, 少ない. ハハコグサとセイタカハハコグサが混生するところによく見られる 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: ほぼ通年 【国内侵入】240: 2003年以前 【県内侵入】240: 2003年以前 【影響】141 ハハコグサとの交雑による遺伝子汚染 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】ハハコグサ×セイタカハハコグサ 【文献全般】312, 40 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
630	タチチコグサ <i>Gnaphalium calviceps</i> Fernald	C	C

【原産】北アメリカ 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: ほぼ通年 【国内侵入】240: 1918年 【県内侵入】240: 1991年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 222, 60, 109, 293, 285, 286, 276, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 349, 252, 344 【文献県内】214, 39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
631	セイタカハハコグサ <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	B	C

【原産】欧州 【国内分布】本州(関東,兵庫県など) 【県内分布】分布度c 全県に散在, 中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:ほぼ通年 【国内侵入】240:戦後 【県内侵入】240:1982年以前 【影響】141ハハコグサとの交雑 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,232,60,109,285,286,317,319,311,312,40,202,71,349 【文献県内】214,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
632	チチコグサモドキ <i>Gnaphalium pensylvanicum</i> Willd.	B	C

【原産】北アメリカ 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に普通, 中程度 【形態・生態】冬夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:ほぼ通年 【国内侵入】240:大正 【県内侵入】240:1957年以前 【影響】310繁殖力が強い 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,293,285,286,278,302,317,319,311,326,190,202,71,78,165,349,344,150 【文献県内】214,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
633	ウスベニチチコグサ <i>Gnaphalium purpureum</i> L.	C	C

【原産】アメリカ大陸 【国内分布】本州(関東以西),四国,九州,とくに九州は多い 【県内分布】分布度c 全県に分布, 少ない 【形態・生態】通緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】250:1968年 【県内侵入】250:1958年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94,232,241,214,239,60,109,285,286,276,302,317,319,311,312,326,40,39,34,202,78,349 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
634	ウラジロチチコグサ <i>Gnaphalium spicatum</i> Lam.	B	C

【原産】北アメリカ 【国内分布】本州(関東以西),四国,九州 【県内分布】分布度c 全県にさわめて普通, 多い 【形態・生態】通緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:ほぼ通年 【国内侵入】250:1965年頃 【県内侵入】250:1958年以前 【影響】310繁殖力が強い 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】94,232,241,214,60,109,145,285,286,317,319,311,312,40,39,202,349 【文献県内】214,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
635	キバナタカサブロウ <i>Guizotia abyssinica</i> (L.f.) Cass.	D	C

【原産】熱帯アフリカ 【国内分布】本州(千葉県,静岡県,山口県) 【県内分布】分布度a 柏市, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:1960年 【県内侵入】110:1971年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241,238,239,109,286,278,319,311,312,40,39,34,202,71,79,349,344 【文献県内】263,39,34

種子植物	キク科		影響度	緊急度
636	ミズヒマワリ	特定外来生物	A	A
<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> DC.				

【原産】南アメリカ 【国内分布】本州(関東,東海,近畿) 【県内分布】分布度a 市川,佐原,栗山川など, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,ちぎれた茎からも栄養繁殖,種子:重散,水散:秋 【国内侵入】163:戦後(栽培) 【県内侵入】163:2001年以前 【影響】350,111,121,150,水辺で大繁殖のおそれ 【緊急】- 【対策】外来生物法の遵守 【備考】- 【文献全般】286,40,39,182,297 【文献県内】39,浅田正彦・林薫・林浩二.2009.千葉県の県管轄河川における特定外来生物緊急調査.千葉県生物多様性センター研究報告1:41-47.

種子植物	キク科		影響度	緊急度
637	サンシチソウ		D	C
<i>Gynura japonica</i> (L.f.) Juel				

【原産】中国 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 成東など, 極少. 一時帰化? 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】100:江戸末期 【県内侵入】100:1929年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241,238,109,285,286,278,276,302,319,311,312,40,39,202,71,78,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科		影響度	緊急度
638	ダンゴギク		D	C
<i>Helenium autumnale</i> L.				

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 北総に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏〜秋 【国内侵入】161:大正 【県内侵入】161:1967年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,285,286,317,312,40,39,202,165 【文献県内】39

種子植物	キク科		影響度	緊急度
639	ヒマワリ		D	C
<i>Helianthus annuus</i> L.				

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110,161,131:江戸(栽培) 【県内侵入】110,161,131:明治(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり,販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,232,214,109,302,317,319,312,40,39,331,190,202,165 【文献県内】214

種子植物	キク科		影響度	緊急度
640	シロタエヒマワリ		D	C
<i>Helianthus argophyllus</i> Torr. et A.Gray				

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 富里市,茂原市,芝山, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:明治(栽培) 【県内侵入】161:1995年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,109,285,286,302,317,319,312,40,39,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
641	ヒメヒマワリ <i>Helianthus cucumerifolius</i> Torr. et A.Gray	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 大多喜町など全県で稀に見られる, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:1910年前後 【県内侵入】161:1934年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,60,109,285,286,302,317,311,312,40,39,34,331,202,71,165,349,344 【文献県内】39,34,吉川代之助.1973.千葉県船橋の帰化植物4種.植物採集ニュース(68):85.

種子植物	キク科	影響度	緊急度
642	キクイモ <i>Helianthus tuberosus</i> L.	B	B

【原産】アメリカ大陸 【国内分布】北海道,本州,四国,九州,琉球 【県内分布】分布度c 全県に普通, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,根茎,塊茎で繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】110,161:江戸末期 【県内侵入】110,161:1981年以前 【影響】121繁殖力がきわめて強い 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり,販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,214,222,238,239,60,109,285,286,278,316,317,319,311,40,39,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
643	コウリントンポポ <i>Hieracium aurantiacum</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 佐倉, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:風散:夏~秋 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:1997年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,238,239,60,109,285,278,276,302,319,311,312,40,39,190,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
644	ヒメブタナ <i>Hypochaeris glabra</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州(関東以西),四国 【県内分布】分布度a 東葛~北総にまばら, 極少 【形態・生態】通緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:春~夏 【国内侵入】250:1966年 【県内侵入】250:1980年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】241,239,60,109,275,278,319,311,312,326,40,39,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
645	ブタナ <i>Hypochaeris radicata</i> L.	B	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県, 中程度 【形態・生態】通緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏~秋 【国内侵入】250:1933年 【県内侵入】250,161,(131?):1972年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の規制など,管理区域外へ遺棄防止,栽培ガイドラインづくり,可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法検討 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,214,222,238,239,60,109,285,275,278,302,319,311,326,39,34,202,71,79,165,357,349,344 【文献県内】214,269,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
646	オオグルマ <i>Inula helenium</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア西部 【国内分布】本州(千葉県) 【県内分布】分布度a 富里市, 極少. 一時的な逸出 【形態・生態】夏緑～連緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】110(ハーブとして):2003年以前 【県内侵入】110(ハーブとして):2003年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】39 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
647	フナバシソウ <i>Iva xanthifolia</i> Nutt.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国に稀 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少. 一時帰化か? 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】200:1960年 【県内侵入】200:1960年 【影響】240花粉症の原因 【緊急】- 【対策】輸送時の検査・洗浄,工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】- 【文献全般】238,286,302,312,40,39,34,202 【文献県内】39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
648	マルバトゲチシャ <i>Lactuca serriola</i> L. var. <i>integrata</i> Gren. et Godr.	D	C

【原産】ヨーロッパ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 野田市, 少ない. トゲチシャと混生したり異所的に生えることも 【形態・生態】冬緑・1～2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】210:1949年? 【県内侵入】210:1998年 【影響】220トゲ有り 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,241,109,285,286,312,40,39,190 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
649	トゲチシャ <i>Lactuca serriola</i> L. var. <i>serriola</i> (syn. <i>L. scariola</i> L.)	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 東葛を中心に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・1～2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】210:1939年以前 【県内侵入】210:1986年以前 【影響】220トゲ有り 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,255,285,286,278,302,317,319,311,40,39,34,190,202,71,165,349,252,344 【文献県内】267,269,39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
650	ナタネタビラコ <i>Lapsana communis</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州(神奈川県,長野県,岐阜県,静岡県,三重県) 【県内分布】分布度a 船橋,佐倉,木更津など, 少ない 【形態・生態】夏緑～冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】210:1959年 【県内侵入】210:2000年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,241,238,109,285,286,275,302,317,319,311,312,40,39,190,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
651	ノースポールギク <i>Leucanthemum paludosum</i> (Poir.) Bonnet et Barratte (syn. <i>Chrysanthemum paludosum</i> Poir.)	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 県北部に散在, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 春 【国内侵入】161: 昭和(導入) 【県内侵入】161: 1991年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232, 109, 317, 39, 202 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
652	フランスギク <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道, 本州 【県内分布】分布度b 県北部に多い, 中程度. 栽培がときに逸出, 利根川河川敷でも見かける 【形態・生態】夏緑・草本 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】161: 江戸末期 【県内侵入】161: 1929年以前 【影響】121 利根川河川敷にあるものが気になる 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 214, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 39, 190, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
653	イヌカミツレ <i>Matricaria inodora</i> L.	C	C

【原産】ユーラシア(広域)南部 【国内分布】北海道, 本州, 九州 【県内分布】分布度b 県北部に散在, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 春～夏 【国内侵入】210: 明治 【県内侵入】210: 1951年以前 【影響】121, 280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 232, 241, 214, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 278, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 39, 202, 349, 344 【文献県内】214, 263

種子植物	キク科	影響度	緊急度
654	コシカギク <i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Porter (syn. <i>M. discoidea</i> DC. ; <i>M. suaveolens</i> (Pursh) Buchenau non L.)	D	C

【原産】ユーラシア北部 【国内分布】北海道, 本州, 四国 【県内分布】分布度a 千葉市など, 少ない. 一時帰化? 【形態・生態】夏冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 春～夏 【国内侵入】220: 戦後と推定 【県内侵入】220: 1980年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】81, 232, 241, 238, 239, 109, 286, 278, 302, 317, 312, 40, 39, 190, 202, 78, 165 【文献県内】斉藤吉永. 1980. オロチャギクを千葉県柏市で採集. 植物採集ニュース(95): 5.

種子植物	キク科	影響度	緊急度
655	カミツレ <i>Matricaria recutita</i> L. (syn. <i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rausch.)	C	C

【原産】欧州～西アジア 【国内分布】本州(中, 北部など) 【県内分布】分布度b 県北部を中心に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 春～夏 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 1935年以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 214, 238, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 312, 40, 39, 202, 78, 165, 349 【文献県内】214, 263, 39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
656	コバレンギク <i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Woot. et Standl.	D	C

【原産】北アメリカ～メキシコ 【国内分布】本州(千葉県),九州(宮崎県) 【県内分布】分布度a 千葉市. 栽培が時に逸出 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:着散:夏～秋 【国内侵入】161:昭和以前(栽培) 【県内侵入】161:1991年 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312,40,39 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
657	アラゲハンゴンソウ <i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>sericea</i> (T.V.Moore) Fernald	C	B

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】161,131,132:1936年以前 【県内侵入】161,131,132:1936年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の規制など,管理区域外へ遺棄防止,栽培ガイドラインづくり,可能なかぎり在来品種を使う,地域個体群遺伝的多様性を保持した種苗の植栽,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,232,241,214,238,239,60,109,285,286,275,278,302,319,311,326,39,34,331,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	キク科	特定外来生物	影響度	緊急度
658	オオハンゴンソウ <i>Rudbeckia laciniata</i> L.		A	A

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 北総に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎による栄養繁殖,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:1931年以前 【影響】121湿地や河原に侵入し、在来希少種と競合 【緊急】- 【対策】外来生物法の遵守 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,239,60,109,285,286,275,278,302,317,319,311,312,40,39,331,190,202,71,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
659	ハナガサギク <i>Rudbeckia laciniata</i> L. var. <i>hortensis</i> L.H.Bailey	D	C

【原産】北アメリカ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 北総に散在, 少ない. 人家周辺に逸出 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎による栄養繁殖,種子:重散,不稔:夏～秋 【国内侵入】161:昭和以前 【県内侵入】161:1971年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,109,285,302,317,312,40,39,190,202,71 【文献県内】263,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
660	ミツバオオハンゴンソウ <i>Rudbeckia triloba</i> L.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 館山市,東葛(柏市), 極少 【形態・生態】夏緑・1年～越年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】161:昭和初期 【県内侵入】161:1989年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,238,239,109,285,286,278,302,317,311,312,40,39,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科		影響度	緊急度
661	ナルトサワギク	特定外来生物	A	A
<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.				

【原産】マダガスカル 【国内分布】本州(中部以西), 四国, 九州 【県内分布】分布度a 館山市, 少ない 【形態・生態】1～多年草
 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 周年 【国内侵入】161, 220: 1976年 【県内侵入】161, 220: 2007年以前 【影響】320(家畜に毒性あり), 121, 123アレロパシー作用 【緊急】- 【対策】外来生物法の遵守, 公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】109, 285, 286, 311, 312, 40, 202, 349, 252, 135 【文献県内】-

種子植物	キク科		影響度	緊急度
662	ツタギク		D	C
<i>Senecio mikanioides</i> Otto				

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州(千葉県, 神奈川県) 【県内分布】分布度a 館山市, 海岸の林縁に少ない 【形態・生態】つる多年草
 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】161: 2003年以前 【県内侵入】161: 2003年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】39 【文献県内】39

種子植物	キク科		影響度	緊急度
663	ネバリノボロギク		D	C
<i>Senecio viscosus</i> L.				

【原産】欧州 【国内分布】九州(散発的に見られるが稀), 本州(千葉県) 【県内分布】分布度a 千葉市, 極少(一時帰化?) 【形態・生態】夏緑・1年草
 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: ほぼ通年 【国内侵入】220: 1994年 【県内侵入】220: 1994年 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】286, 275, 319, 311, 312, 40, 39, 202, 349 【文献県内】39

種子植物	キク科		影響度	緊急度
664	ノボロギク		B	C
<i>Senecio vulgaris</i> L.				

【原産】欧州 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 中程度～多い 【形態・生態】冬緑・1年草
 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 風散: ほぼ通年 【国内侵入】210: 1870年前後 【県内侵入】210: 1939年以前 【影響】121, 310, 繁殖力が強い 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 214, 222, 239, 60, 109, 285, 286, 302, 317, 319, 311, 326, 40, 39, 34, 190, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 269, 34

種子植物	キク科		影響度	緊急度
665	ツクシメナモミ		D	C
<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.				

【原産】熱帯に広く分布 【国内分布】本州(関東以西), 四国, 九州 【県内分布】分布度a 鋸南町, 館山市など, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草
 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 着散: 秋 【国内侵入】240: 日本原産? 【県内侵入】240: 1950年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】109, 39, 165 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
666	オオアザミ <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	C	C

【原産】地中海沿岸南西部 【国内分布】本州(栽培品がときに逸出) 【県内分布】分布度a 東葛に散在, 極少(栽培逸出) 【形態・生態】冬緑・1〜2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:1856年以前 【県内侵入】161:1977年以前 【影響】220トゲ有り 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,241,222,239,109,285,286,278,276,302,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】267,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
667	ヤーコン <i>Smallanthus sonchifolia</i> (Poeppig et Endl.) H.Robinson	D	C

【原産】ペルー,ボリビア 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 佐倉市, 極少(まれに逸出) 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,根茎,種子:風散:秋 【国内侵入】110:昭和以前(導入) 【県内侵入】110:1998年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】39

種子植物	キク科	要注意外来生物(適否検討), 生態学会100	影響度	緊急度
668	セイタカアワダチソウ <i>Solidago altissima</i> L.		A	B

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県にごく普通, 河川敷・草地などに極多 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎による栄養繁殖,種子:風散:秋〜冬 【国内侵入】161:1908年頃 【県内侵入】161:1955年以前 【影響】121,123,120,繁殖力は極めて強い,アレロパシー作用,秋冬季の蜜源にも 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,279,278,302,317,311,312,326,40,190,202,71,165,357,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	キク科	要注意外来生物(情報不足), 生態学会100	影響度	緊急度
669	オオアワダチソウ <i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill		C	B

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 県北部に散在, 少し湿ったところに中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎による栄養繁殖,種子:風散:秋 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:1933年以前 【影響】121,なし 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,311,312,40,190,202,78,165,349,344 【文献県内】263,39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
670	メリケントキンソウ <i>Soliva sessilis</i> Ruiz et Pav.	A	A

【原産】南米 【国内分布】本州(関東以西),四国,九州 【県内分布】分布度a 江戸川河川敷,木更津市, 多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:着散,重散:夏〜秋 【国内侵入】220:1930年 【県内侵入】220,240:2006年以前 【影響】220,310,瘦果により人体を傷付け,発芽率がよく,ひろがるため,早急な撤去が必要 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】241,238,239,60,109,286,302,317,311,312,40,202,349,344 【文献県内】木村陽子.2008.千葉県メリケントキンソウ(キク科).千葉県植物誌資料24:229-230.

種子植物	キク科	影響度	緊急度
671	オニノゲシ <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	B	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県にごく普通, 道ばた・畑などに中程度 【形態・生態】夏緑・冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:ほぼ通年 【国内侵入】240:明治 【県内侵入】240:1932年以前 【影響】121,220,刺あり,繁殖力が強い,310,ハルノゲシと競合の恐れ 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,275,278,302,317,319,311,326,40,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
672	ヤナギバヒメジョオン <i>Stenactis pseudoannuus</i> (Makino) comb. nov. (syn. <i>Erigeron pseudoannuus</i> Makino)	B	C

【原産】北米? 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, ヒメジョオンとヘラヒメジョオンが混生しているところに中程度 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】240(雑種と推定):大正 【県内侵入】240(雑種と推定):1932年以前 【影響】121,310 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,60,109,285,286,278,302,317,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】263,39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
673	ヘラバヒメジョオン <i>Stenactis strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) DC. (syn. <i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.)	C	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, ススキ草原や土手などに少ない 【形態・生態】冬緑・1～2年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】240:1961年以前 【県内侵入】240:1931年以前 【影響】121,山地のススキ草原等、自然度の高いところにも入る 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,232,222,238,239,60,109,285,286,275,278,317,319,311,312,40,190,202,71,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
674	シオザキソウ <i>Tagetes minuta</i> L.	D	C

【原産】南米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 県西部に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】240,130?:1955年以前 【県内侵入】240,130?:1975年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,公共事業などにおける方針策定,付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】ただし定着しない 【文献全般】232,241,238,239,60,109,285,286,278,302,319,311,312,40,202,349,252,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
675	コウオウソウ <i>Tagetes patula</i> L.	D	C

【原産】メキシコ 【国内分布】関東(千葉県),四国(香川県),九州(宮崎県) 【県内分布】分布度a 北総に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】161:1933年以前 【県内侵入】161:2003年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】302,312,165 【文献県内】39

種子植物	キク科	影響度	緊急度
676	ナツシロギク <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip. (syn. <i>Chrysanthemum parthenium</i> (L.) Bernh.)	D	C

【原産】欧州,西アジア 【国内分布】北海道,本州(新潟県,千葉県など) 【県内分布】分布度a 県北部に散在,園芸種がときに逸出,極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:1996年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,109,286,302,319,312,40,202,71,349 【文献県内】39

種子植物	キク科	生態学会100	影響度	緊急度
677	ヨモギギク <i>Tanacetum vulgare</i> L.		D	C

【原産】欧州,シベリア 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 全県に稀,少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎による栄養繁殖,種子:重散:夏~秋 【国内侵入】161,131:北海道原産 【県内侵入】161,131:1954年以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,238,109,285,286,302,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	キク科	国内外来生物	影響度	緊急度
678	シロバナタンポポ <i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	要注意外来生物(情報不足), 生態学会100	C	C

【原産】日本 【国内分布】本州(関東以西),四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に点在,西日本中心?,千葉県は国内外来? 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:春~夏 【国内侵入】西日本はもともとの自生:日本原産 【県内侵入】161(?):1951年以前 【影響】121分布拡大すれば在来タンポポとの競合の可能性 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,272,302,165 【文献県内】39

種子植物	キク科	要注意外来生物(情報不足), 生態学会100	影響度	緊急度
679	アカミタンポポ <i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.		B	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在,都市環境に中程度~多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:ほぼ通年 【国内侵入】210:1918年 【県内侵入】210:1975年以前 【影響】141在来タンポポとの交雑 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,109,285,286,278,302,317,312,40,190,202,71 【文献県内】214,39,34

種子植物	キク科	要注意外来生物(情報不足), 生態学会100	影響度	緊急度
680	アイノコアカミタンポポ <i>Taraxacum laevigatum</i> DC. x <i>T. platycarpum</i> Dahlst.		B	C

【原産】アカミタンポポとカントウタンポポとの雑種 【国内分布】本州(千葉県,神奈川県) 【県内分布】分布度a 県中部に散在,少ない~中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:ほぼ通年 【国内侵入】240,雑種と推定:平成以前 【県内侵入】240,雑種と推定:1997年以前 【影響】141在来タンポポとの交雑・競合 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】317,312 【文献県内】39

種子植物	キク科		影響度	緊急度
681	セイヨウタンポポ	要注意外来生物(情報不足), 生態学会100	B	C
<i>Taraxacum officinale</i> Weber				

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県にごく普通, 多い〜極多だが最近では交雑が進んで純な個体は少ない 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒+無融合,種子:風散:ほぼ通年 【国内侵入】110,130,200:1904年以前 【県内侵入】110,130,200:1952年以前 【影響】141,240,121,在来タンポポとの交雑・競合 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり,公共事業などにおける方針策定,輸送時の検査・洗浄,工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,239,109,285,286,278,302,317,312,326,40,190,202,71,78,165 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	キク科		影響度	緊急度
682	アイノコセイヨウタンポポ	要注意外来生物(情報不足), 生態学会100	B	C
<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg. x <i>T. platycarpum</i> Dahlst.				

【原産】セイヨウタンポポとカントウタンポポの雑種 【国内分布】本州 【県内分布】分布度c 全県できわめて普通, 多い〜極多 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:虫媒+無融合,種子:風散:ほぼ通年 【国内侵入】240,雑種と推定:昭和以前 【県内侵入】240,雑種と推定:1997年以前 【影響】141在来タンポポとの交雑・競合 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】214,39

種子植物	キク科		影響度	緊急度
683	キバナムギナデシコ		D	C
<i>Tragopogon pratense</i> L.				

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:1877年ころ 【県内侵入】161:1978年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,239,286,275,278,302,312,40,190,202,78,165 【文献県内】39,土屋守.1978.船橋市でキバナムギナデシコを採る.植物採集ニュース(96):14.

種子植物	キク科		影響度	緊急度
684	イガオナモミ		B	B
<i>Xanthium italicum</i> Moretti				

【原産】熱帯アメリカ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 荒れ地・沿岸地に多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:着散:秋〜冬 【国内侵入】240:1958年以前 【県内侵入】240:1975年以前 【影響】220,果実に刺あり,121,在来のおナモミとの競合・交雑の可能性 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,278,302,317,319,311,312,40,202,71,165,349,252,344 【文献県内】214,269,39,34

種子植物	キク科		影響度	緊急度
685	オオオナモミ	要注意外来生物(情報不足), 生態学会100	B	B
<i>Xanthium occidentale</i> Bertol.				

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に普通, 河原・路傍・鉄道周辺に多い 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:着散:秋〜冬 【国内侵入】240:1929年以前 【県内侵入】240:1936年以前 【影響】220,果実に刺,花粉症の原因,121,在来のおナモミとの競合・交雑の恐れ 【緊急】- 【対策】輸送時の検査・洗浄,工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,190,202,71,78,349,344 【文献県内】214,269,39,34

種子植物	キク科	影響度	緊急度
686	トゲオナモミ <i>Xanthium spinosum</i> L.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 東葛で記録あり, 極少(一時帰化で定着せず) 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:着散:秋～冬 【国内侵入】240:1934年以前 【県内侵入】240:1968年以前 【影響】220刺あり,花粉症の原因になる可能性 【緊急】- 【対策】付着種子を安易に野外に遺棄しないようにさせる 【備考】定着はせず 【文献全般】81,232,241,238,239,109,285,286,302,317,312,40,202,78 【文献県内】39,34

種子植物	オモダカ科	影響度	緊急度
687	ヒロハシャゼンオモダカ <i>Echinodorus grandiflorus</i> (Cham. et Schlechtendal) Micheli subsp. <i>aureus</i> (Fassett) Hynes et Nielsen	B	B

【原産】中米～南米 【国内分布】千葉県 【県内分布】分布度a 佐倉市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:水散:秋 【国内侵入】163:昭和(栽培) 【県内侵入】163:2002年以前 【影響】121,350 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】214,39

種子植物	オモダカ科	影響度	緊急度
688	ナガバオモダカ <i>Sagittaria graminea</i> Michx.	要注意外来生物(情報不足) B	B

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 千葉市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:水散:秋 【国内侵入】163:1975年頃 【県内侵入】163:1991年以前 【影響】121,350 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,285,286,319,311,312,40,202,349 【文献県内】39,大場達之.1996.ナガバオモダカが松戸市に生えた.千葉県植物誌資料8:54.,大場達之.1996.ナガバオモダカ追記.千葉県植物誌資料9:64.

種子植物	トチカガミ科	影響度	緊急度
689	オオカナダモ <i>Egeria densa</i> Planch.	要注意外来生物(適否検討) A	A

【原産】南米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総西部に分布, 極多 【形態・生態】夏緑・沈水多年草 【繁殖】花粉:虫媒,枝がちぎれて栄養繁殖,種子:水散:秋 【国内侵入】163:大正 【県内侵入】163:1975年以前 【影響】121,350 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】日本では種子繁殖しない 【文献全般】94,232,222,238,60,101,109,285,286,302,317,319,311,312,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34,大滝末男.1973.千葉県印旛沼北部にもオオカナダモが生育する.植物採集ニュース(68):85.

種子植物	トチカガミ科	影響度	緊急度
690	コカナダモ <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	要注意外来生物(適否検討), 生態学会100 A	A

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 主として北総に分布, 極多 【形態・生態】夏緑・沈水多年草 【繁殖】花粉:虫媒,枝がちぎれて栄養繁殖,種子:水散:秋 【国内侵入】163:1961年以前 【県内侵入】163:1976年以前 【影響】121,350 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】日本では種子繁殖しない 【文献全般】94,232,241,239,60,101,109,285,286,301,302,317,319,311,312,40,202,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	トチカガミ科	影響度	緊急度
691	アマゾントチカガミ <i>Limnium laevigatum</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine	B	A

【原産】熱帯アメリカ(アルゼンチン,メキシコ,西インド諸島,パラグアイ,ブラジル) 【国内分布】本州(大阪府,千葉県),九州 【県内分布】分布度a 印西市(旧印旛村山田),野田市瀬戸, 中程度 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝による栄養繁殖,種子:水散:初夏 【国内侵入】163:1973年以前(導入) 【県内侵入】163:2009年以前 【影響】100 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】標本CBM(野田市三ヶ尾 2009.12.21 BS-277881),佐倉市畔戸では除去した(2008年) 【文献全般】301,312,326,202 【文献県内】235

種子植物	カンナ科	影響度	緊急度
692	ハナカンナ <i>Canna generalis</i> Bailey	D	C

【原産】インド 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 芝山町, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:1910年頃 【県内侵入】161:1995年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】交雑に由来する園芸種 【文献全般】301,312,40,331,332,202,165 【文献県内】312,39

種子植物	カンナ科	影響度	緊急度
693	ダンドク <i>Canna indica</i> L.	D	C

【原産】インド,マラッカ,マレー諸島 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 安房に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:1850年頃 【県内侵入】161:1992年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,286,301,311,312,326,40,331,331,202,71,165,349 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
694	ラッキョウ <i>Allium chinense</i> G. Don	D	C

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 全県に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,109,301,317,40,332,202,165 【文献県内】214,39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
695	アサツキ <i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel	D	C

【原産】極東ロシア,東ロシア 【国内分布】北海道,本州(北部)(自生) 【県内分布】分布度a 市原市,鋸南町, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:日本原産 【県内侵入】110:1991年以前(逸出) 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】272,332 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
696	ニラ <i>Allium tuberosum</i> Rottl.	D	C

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県に分布, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:平安 【県内侵入】110:江戸以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,109,301,316,317,312,40,332,165 【文献県内】214,39

種子植物	ユリ科	CITES:II	影響度	緊急度
697	キダチアロエ <i>Aloe arborescens</i> Mill.		D	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州,四国,九州(屋外栽培) 【県内分布】分布度a 主として南総・安房に分布, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】110:江戸 【県内侵入】110:昭和 【影響】280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】332 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
698	タチテンモンドウ <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. var. <i>pygmaeus</i> Makino	D	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 富津市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:明治以前 【県内侵入】161:1956年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】331,332,165 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
699	オランダキジカクシ <i>Asparagus officinalis</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国(栽培) 【県内分布】分布度a 主として北総に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:1781年(江戸) 【県内侵入】161:明治(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,316,317,319,312,202,165 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
700	ネズミボウキ <i>Asparagus virgatus</i> Baker	D	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度a 主として安房に散在, 中程度 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:昭和 【県内侵入】161:1997年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312,40 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
701	ハラン <i>Aspidistra elatior</i> Blume	C	C

【原産】中国南部 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県に分布, 中程度 【形態・生態】常緑・多年草
 【繁殖】花粉: 虫媒, 地下茎による栄養繁殖, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】161: 江戸以前 【県内侵入】161: 江戸 【影響】121, 280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232, 222, 109, 272, 301, 317, 312, 71 【文献県内】214, 39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
702	オリヅルラン <i>Chlorophytum comosum</i> Bak.	D	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 佐倉市, 市川市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 匍匐枝による栄養繁殖, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】161: 明治初期 【県内侵入】161: 昭和以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】301, 319, 332, 202, 165 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
703	ドイツズラン <i>Convallaria majalis</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】全国(栽培) 【県内分布】分布度a 市原市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 地下茎による栄養繁殖, 種子: 食散: 秋 【国内侵入】161: - 【県内侵入】161: 1929年以前(栽培) 【影響】210 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】ズランの名で園芸店で販売されている 【文献全般】272, 302, 332, 165 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
704	バイモ <i>Fritillaria verticillata</i> Willd. var. <i>thunbergii</i> (Miq.) Baker	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 鱗茎による栄養繁殖, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 312, 331, 202, 165 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
705	スズランスイセン <i>Leucojum aestivum</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 酒々井市, 少ない 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 鱗茎による栄養繁殖, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】161: 1936年(栽培) 【県内侵入】161: 昭和以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 301, 312, 40, 331 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
706	オニユリ <i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	D	C

【原産】中国 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,珠芽による栄養繁殖,種子:風散+重散:秋 【国内侵入】110,161: 日本原産? 【県内侵入】110,161:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり,販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,109,272,301,317,312,165 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	国内外来生物	影響度	緊急度
707	シンテッポウユリ <i>Lilium x formolongo</i> Hort.		B	C

【原産】日本(タカサゴユリ×テッポウユリ交配種) 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:1924年(導入) 【県内侵入】161:1998年以前 【影響】121,繁殖力つよい,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】タカサゴユリとテッポウユリの交雑種の園芸種 【文献全般】109,301,317,312 【文献県内】214,39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
708	ルリムスカリ <i>Muscari botryoides</i> Mill.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 富里市,八街市, 少ない 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,鱗茎による栄養繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】161:昭和以前 【県内侵入】161:1992年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,301,319,312,331,332,202 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
709	ハタケニラ <i>Nothoscordum fragrans</i> Kunth.	C	C

【原産】アメリカ大陸 【国内分布】本州(神奈川県,千葉県) 【県内分布】分布度a 柏市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:明治中期(導入) 【県内侵入】161:1952年以前(栽培) 【影響】310 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,239,60,109,285,286,301,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
710	ホソバオオアマナ <i>Ornithogalum gussoneri</i> Ten.	C	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 富里市, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,鱗茎による栄養繁殖,種子:風散:夏 【国内侵入】161:1972年以前(栽培) 【県内侵入】161:1991年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】238,109,285,301,317,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
711	オオアマナ <i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	C	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 北総に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,鱗茎による栄養繁殖,種子:風散:夏 【国内侵入】161:- 【県内侵入】161:1987年以前 【影響】220,炎症をおこす.食用・薬用にも,310 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,109,301,317,319,312,40,331,202 【文献県内】214,263,39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
712	ナギイカタ <i>Ruscus aculeatus</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総に散在, 極少 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:1860年代(江戸) 【県内侵入】161:1985年以前 【影響】220 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,109,317,312,202,165 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	国RDB:CR	影響度	緊急度
713	タイワンホトギス <i>Tricyrtis formosana</i> Baker		D	C

【原産】台湾 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総に分布, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:1950年代 【県内侵入】161:1995年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,301,317,311,312,326,202,349 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
714	ハナニラ <i>Tristagma uniflorum</i> (Lindley) Traub.	C	C

【原産】南米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 北総と南総に分布, 多い 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】161:1964年以前 【影響】310,121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,241,238,239,60,109,285,301,316,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
715	アツバキミガヨラン <i>Yucca gloriosa</i> L.	A	A

【原産】北米南部 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 主として全県の水辺(海岸)に分布, 少ない 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:明治中期 【県内侵入】161:平成以前 【影響】280,121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,300,332 【文献県内】39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
716	キミガヨラン <i>Yucca recurvifolia</i> Salisb.	B	B

【原産】北米南部 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 全県に散在, 少ない 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:1995年以前 【影響】280,121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】301,312,332,165 【文献県内】263,39

種子植物	ユリ科	影響度	緊急度
717	イトラン <i>Yucca smalliana</i> Fern.	B	B

【原産】北米南部 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 八街市, 少ない 【形態・生態】常緑・低木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:1931年以前(栽培) 【影響】280,121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】332 【文献県内】39

種子植物	ヒガンバナ科	影響度	緊急度
718	インドハマユウ <i>Crinum latifolium</i> L.	B	B

【原産】インド 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 富里市, 極少 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:海散:秋 【国内侵入】161:昭和初期(導入) 【県内侵入】161:2003年以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】331,332 【文献県内】39

種子植物	ヒガンバナ科	影響度	緊急度
719	ヒガンバナ <i>Lycoris radiata</i> (L'Herit.) Herb.	C	C

【原産】中国南部 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 極多 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,鱗茎による栄養繁殖,種子:重散:冬 【国内侵入】110:弥生 【県内侵入】110:弥生～室町 【影響】210,121,123 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】日本で種子繁殖しない 【文献全般】94,232,222,109,272,302,332,190 【文献県内】34,332

種子植物	ヒガンバナ科	影響度	緊急度
720	ナツズイセン <i>Lycoris squamigera</i> Maxim.	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 北総に散在, 少ない 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,鱗茎による栄養繁殖,種子:重散:冬 【国内侵入】161:日本原産? 【県内侵入】161:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,60,109,301,317,312,40,331,202,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	ヒガンバナ科	影響度	緊急度
721	ラッパズイセン <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 芝山町, 少ない 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,鱗茎による栄養繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:1996年以前(逸出) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,301,202 【文献県内】39

種子植物	ヒガンバナ科	影響度	緊急度
722	スイセン <i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>chinensis</i> Roemer	C	C

【原産】中国南部 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 主として北総・南総・安房の西部に分布, 多い 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,鱗茎による栄養繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】161:室町 【県内侵入】161:江戸 【影響】121,210 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,109,272,301,317,312,331,202,165 【文献県内】214,39

種子植物	ヒガンバナ科	影響度	緊急度
723	タマスダレ <i>Zephyranthes candida</i> Herb.	D	C

【原産】ブラジル 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全県に散在, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,鱗茎による栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】161:1870年頃 【県内侵入】161:1930年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,241,60,109,285,301,317,312,331,202,165,349 【文献県内】263,39

種子植物	ヒガンバナ科	影響度	緊急度
724	サフランモドキ <i>Zephyranthes grandiflora</i> Lindl.	D	C

【原産】中央米 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 千葉市,館山市,南房総市, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,鱗茎による栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】161:1845年 【県内侵入】161:1951年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,241,238,239,60,109,285,301,317,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	アルストロメリア科	影響度	緊急度
725	ユリズイセン <i>Alstromeria pulchella</i> L.	D	C

【原産】南米高地 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 全県に散在, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,塊茎による栄養繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】161:1935年(導入) 【県内侵入】161:1954年以前(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】332 【文献県内】39

種子植物	ヤマノイモ科	影響度	緊急度
726	ナガイモ <i>Dioscorea batatas</i> Decne.	C	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全県に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・つる多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 珠芽による栄養繁殖, 種子: 風散: 秋 【国内侵入】110: 室町 【県内侵入】110: 江戸 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 109, 301, 316, 317, 332, 165 【文献県内】39

種子植物	ミズアオイ科	要注意外来生物(適否検討), IUCN100	影響度	緊急度
727	ホテイアオイ <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.		A	A

【原産】熱帯米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 全県に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 匍匐枝による栄養繁殖, 種子: 水散: 秋 【国内侵入】120, 163: 明治中期 【県内侵入】120, 163: 1975年以前 【影響】121, 350, 150, 280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止, 公共事業などにおける方針策定 【備考】- 【文献全般】94, 232, 241, 222, 239, 60, 101, 109, 285, 286, 301, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 78, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	アヤメ科	影響度	緊急度
728	ヒメヒオウギズイセン <i>Crocossia x crocosmifolia</i> (Burb. et Dean) N.E.Br. (syn. <i>Tritonia x crocosmaeflora</i> N. E. Br.)	B	B

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 球茎による栄養繁殖, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】161: 1890年頃 【県内侵入】161: 1927年以前 【影響】121, 280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 232, 241, 222, 238, 239, 109, 285, 286, 301, 317, 312, 40, 331, 202, 71, 78, 165 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	アヤメ科	影響度	緊急度
729	オランダアヤメ <i>Gladiolus hybridus</i> Hort.	D	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 北総の平野に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 江戸(栽培) 【県内侵入】161: 昭和以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】331, 332, 202 【文献県内】39

種子植物	アヤメ科	影響度	緊急度
730	グラディオルス・トリスティス <i>Gladiolus tristis</i> L.	D	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 安房地方に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 球茎による栄養繁殖, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 昭和(栽培) 【県内侵入】161: 2001年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】332 【文献県内】39

種子植物	アヤメ科	影響度	緊急度
731	シャガ <i>Iris japonica</i> Thunb.	C	C

【原産】中国 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 地下茎による栄養繁殖, 種子: 重散(日本では不稔): 秋 【国内侵入】161: 江戸以前 【県内侵入】161: 江戸以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 232, 222, 109, 332, 190, 165 【文献県内】214, 39, 34

種子植物	アヤメ科	影響度	緊急度
732	キショウブ <i>Iris pseudacorus</i> L.	B	B

要注意外来生物(情報不足), 生態学会100

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 地下茎による栄養繁殖, 種子: 水散: 秋 【国内侵入】161: 1896年頃(栽培) 【県内侵入】161: 1932年以前 【影響】121, 350, 280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 241, 222, 239, 60, 101, 272, 285, 286, 301, 317, 319, 311, 312, 40, 331, 202, 165, 349, 344 【文献県内】214, 263, 39, 34

種子植物	アヤメ科	影響度	緊急度
733	イクシア <i>Ixia polystachya</i> L. var. <i>polystachya</i>	D	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総に散在, 極少 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 鱗茎による栄養繁殖, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】161: 明治(導入) 【県内侵入】161: 1995年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 繁茂することはない 【文献全般】331, 332 【文献県内】39

種子植物	アヤメ科	影響度	緊急度
734	オオニワゼキショウ <i>Sisyrinchium</i> aff. <i>iridifolium</i> H.B.K.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度c 全県に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】210: 1930年以前 【県内侵入】210: 1975年以前 【影響】310, 280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】学名を*S. aff. Iridifolium* H.B.K. としておく 【文献全般】232, 241, 222, 60, 109, 285, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 78, 349 【文献県内】39, 34, 大場達之. 2007. アキマルニワゼキショウが千葉県にも現れた. 千葉県植物誌資料23: 211-212.

種子植物	アヤメ科	影響度	緊急度
735	ルリニワゼキショウ <i>Sisyrinchium angustifolium</i> Bickn.	C	C

【原産】北米東部 【国内分布】本州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 夏 【国内侵入】210: 1970年代以前 【県内侵入】210: 1975年以前 【影響】310, 280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】オオニワゼキショウと混同されていることがある 【文献全般】285, 286, 301, 317, 312, 40, 202 【文献県内】214, 263, 39, 34, 大場達之. 2004. 千葉県のルリニワゼキショウ. 千葉県植物誌資料20: 151-153., 野口昭造・木村陽子・大場達之. 2007. ヒトフサニワゼキショウとルリニワゼキショウの観察と学名. 千葉県植物誌資料23: 210-212.

種子植物	アヤメ科	影響度	緊急度
736	ヒトフサニワゼキショウ <i>Sisyrinchium montanum</i> Greene	D	C

【原産】北アメリカ東部 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1981年 【県内侵入】210:2007年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】学名を*Sisyrinchium montanum* Greeneに変更 【文献全般】232,241,285,317,312,40,202 【文献県内】214,39,野口昭造・木村陽子・大場達之.2007.ヒトフサニワゼキショウとルリニワゼキショウの観察と学名.千葉県植物誌資料23:210-212.

種子植物	アヤメ科	影響度	緊急度
737	ニワゼキショウ <i>Sisyrinchium rossulatum</i> Bickn.	C	C

【原産】北米南東部 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】161:1887年頃 【県内侵入】161:1940年以前 【影響】121,310 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,60,109,272,285,286,301,317,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	アヤメ科	影響度	緊急度
738	キバナニワゼキショウ <i>Sisyrinchium rossulatum</i> E.P.Bicknell (syn. <i>Sisyrinchium exile</i> E.P.Bicknell)	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 千葉市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1986年以前 【県内侵入】210:2004年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241,311,312,326,40,202,349 【文献県内】木村陽子.2004.千葉県のキバナニワゼキショウ.千葉県植物誌資料20:151.

種子植物	アヤメ科	影響度	緊急度
739	アキマルニワゼキショウ <i>Sisyrinchium rossulatum</i> E.P.Bicknell x <i>Sisyrinchium</i> aff. <i>iridifolium</i> H.B.K.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 酒々井市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:2007年以前 【県内侵入】210:2007年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】ニワゼキショウとオオニワゼキショウとの雑種 【文献全般】- 【文献県内】大場達之.2007.アキマルニワゼキショウが千葉県にも現れた.千葉県植物誌資料23:211-212.

種子植物	イグサ科	影響度	緊急度
740	カラフトハナビゼキショウ <i>Juncus articulatus</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア北部,北米 【国内分布】千葉県,神奈川県 【県内分布】分布度a 成田市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1987年以前 【県内侵入】250:1987年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,286,317,312,40,202 【文献県内】39

種子植物	イグサ科	影響度	緊急度
741	セイトカクサイ <i>Juncus interior</i> Wieg.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州(千葉県) 【県内分布】分布度a 富里市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:重散:夏 【国内侵入】250:1992年以前 【県内侵入】250:1992年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】別名トミサトクサイ 【文献全般】312,40 【文献県内】39,内野秀重.2003.イグサ科.In千葉県植物誌(県史シリーズ51.千葉県の自然誌別編4) pp.1181 千葉県.

種子植物	イグサ科	影響度	緊急度
742	ニセコウガイゼキショウ <i>Juncus marginatus</i> Rostk.	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州(千葉県) 【県内分布】分布度a 印西市(旧印旛村),船橋市坪井町, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒, 種子:重散:夏 【国内侵入】250:1990年以前 【県内侵入】250:1990年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】別名タカナベイ,マツカサコウガイゼキショウ,船橋市坪井町 2535 2009.8.26 木村陽子 田島敏子 標本 【文献全般】312,40 【文献県内】39,内野秀重.2004.和名があった *Juncus marginatus* Rostk. 千葉県植物誌資料20:158.

種子植物	イグサ科	影響度	緊急度
743	コゴメイ <i>Juncus</i> sp.	B	B

【原産】ユーラシア? 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 北総に散在, 中程度. 河川敷・池・湿地などはびこる 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎による栄養繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】250:1980年代 【県内侵入】250:1989年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,286,317,312,40,202 【文献県内】214,39

種子植物	ツユクサ科	国内外来生物	影響度	緊急度
744	マルバツユクサ <i>Commelina benghalensis</i> L.		B	C

【原産】熱帯アジア(千葉県に自生あり) 【国内分布】関東 【県内分布】分布度a 柏市,市原市,佐倉市,船橋市, 中 【形態・生態】夏緑・一年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】300:1990年代 【県内侵入】300:1990年代 【影響】141 【緊急】- 【対策】適切な除草 【備考】安房地方の個体群は自生の可能性大,現在南総に分布を広げているのは国内移入の可能性あり 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	ツユクサ科	影響度	緊急度
745	ブライダルベール <i>Gibasis pellucida</i> (M.Martens et Galeotti) R.R.Hunt	C	C

【原産】メキシコ 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 北総西部に散在, 少ない 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,匍匐枝による栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】161:昭和(栽培) 【県内侵入】161:1992年以前 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312,40,332 【文献県内】39

種子植物	ツクサ科		影響度	緊急度
746	トキワツクサ	要注意外来生物(情報不足)	A	A
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.				

【原産】南米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 全県に分布, 極多 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 匍匐枝による栄養繁殖, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 昭和以前 【県内侵入】161: 1937年以前 【影響】121, 120, 150 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】別名ノハカタカラクサ 【文献全般】94, 232, 241, 109, 272, 286, 301, 317, 312, 40, 332, 202 【文献県内】214, 39, 34

種子植物	ツクサ科		影響度	緊急度
747	ムラサキツクサ		D	C
<i>Tradescantia reflexa</i> Rafin.				

【原産】北米 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度b 北総西部に分布, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 1870年頃 【県内侵入】161: 1938年(栽培) 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81, 94, 232, 60, 109, 301, 317, 312, 40, 202, 165, 349 【文献県内】39

種子植物	ツクサ科		影響度	緊急度
748	オオトキワツクサ		B	B
<i>Tradescantia</i> sp.				

【原産】南米 【国内分布】本州(静岡県, 千葉県) 【県内分布】分布度b 主として安房に散在, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 匍匐枝による栄養繁殖, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 1972年以前 【県内侵入】161: 1972年以前 【影響】121, 150 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】286, 312, 40, 332 【文献県内】39

種子植物	ツクサ科		影響度	緊急度
749	オオムラサキツクサ		D	C
<i>Tradescantia virginiana</i> L.				

【原産】北米南部 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 野田市, 極少 【形態・生態】夏緑 【繁殖】花粉: 虫媒, 種子: 重散: 秋 【国内侵入】161: 昭和初期 【県内侵入】161: 2002年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94, 109, 301, 317, 319, 312, 40, 332, 202 【文献県内】263, 39

種子植物	イネ科		影響度	緊急度
750	ヤギムギ		D	C
<i>Aegilops cylindrica</i> Host				

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 千葉市のみ, 少ない. 現在の生存不明 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉: 風媒, 種子: 着散: 初夏 【国内侵入】210: 1973年 【県内侵入】-: 1990年 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】232, 239, 240, 285, 286, 301, 319, 311, 312, 40, 202, 165, 349, 344 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
751	ニセコムギダマシ <i>Agropyron desertorum</i> (Fisch. ex Link) Schult.	D	C

【原産】ヨーロッパ南部,ウラル山脈,モンゴル 【国内分布】本州(千葉県) 【県内分布】分布度a 千葉市浜田のみ, 少ない. 現在の生存不明 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:1991年 【県内侵入】-:1991年 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】千葉県が日本新産地,侵入確認:1991.07.05,1993.06.18千葉市浜田 【文献全般】312,40 【文献県内】39,木村陽子・酒井俊英・大場達之.1994.ニセコムギダマシ(新称)?*Agropyron desertorum* (Fisch. ex Link) Schl.?の帰化. 千葉生物誌43:18-21.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
752	ナンカイヌカボ <i>Agrostis avenacea</i> J.F.Gmel.	D	C

【原産】豪州 【国内分布】本州(千葉県) 【県内分布】分布度a 千葉市青葉町,浦安市明海, 極少. 青葉町のは絶滅,2005.06.12に浦安市で採集されるが, その後絶滅 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】220:- 【県内侵入】-:1996年 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】232,60,109,286,317,40,349 【文献県内】39,木村陽子.1996.千葉市青葉町でナンカイヌカボを採る. 千葉県植物誌資料9:62-63.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
753	コヌカグサ <i>Agrostis gigantea</i> Roth. (syn. <i>Agrostis alba</i> L.)	C	C

【原産】北半球温帯(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 県内全域普通, 中程度 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,地下茎による栄養繁殖,種子:風散:初夏 【国内侵入】160:江戸末期 【県内侵入】160:明治 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,240,60,109,272,285,286,301,317,319,311,312,40,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
754	クロコヌカグサ <i>Agrostis nigra</i> With.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北日本に多い 【県内分布】分布度a 全域, 少ない 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,地下茎による栄養繁殖,種子:風散:初夏 【国内侵入】160:- 【県内侵入】160:明治~昭和30年代 【影響】150 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】コヌカグサと分けない見解もある 【文献全般】81,94,232,240,60,285,301,319,312,190,202,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	イネ科	国内外来生物	影響度	緊急度
755	エゾヌカボ <i>Agrostis scabra</i> Willd.		D	C

【原産】本州中部以北,東アジア北部,サハリン?北米 【国内分布】北海道,本州北部では在来種 【県内分布】分布度a 千葉市,袖ヶ浦市, 極少. おそらく絶滅 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】240:- 【県内侵入】-:1985年 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】本来の分布は本州中部以北なので, 県内のものは持ちこまれたものである 【文献全般】272,301,190,165 【文献県内】39,34,浅野貞夫.1986.ムラサキナギナタガヤとエゾヌカボを採る. 千葉生物誌36:38.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
756	ハイコヌカグサ <i>Agrostis stolonifera</i> L.	C	C

【原産】北半球温帯(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域散発, 少ない 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,地下茎による栄養繁殖,種子:風散:夏 【国内侵入】160:明治 【県内侵入】-:明治～昭和30年代 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,238,240,60,109,285,301,317,319,311,312,40,190,202,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
757	バケヌカボ <i>Agrostis x dimorpholemma</i> Ohwi	D	C

【原産】地中海 【国内分布】本州,四国,九州(宮城県) 【県内分布】分布度a 船橋市など数カ所, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏 【国内侵入】210:- 【県内侵入】-:1991年 【影響】141 【緊急】- 【対策】- 【備考】イトヌカグサ *A. tenuis* Sibthorpとイベリアヌカボ *A. castellana* Boisser et Reuterの交雑により生じた 【文献全般】- 【文献県内】39,木村陽子.1996.船橋市でバケヌカボを採る.千葉県植物誌資料8:51.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
758	ヌカススキ <i>Aira caryophylla</i> L.	C	C

【原産】欧州,西アジア,北アフリカ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 全域, 少ない 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】-:明治～昭和30年代 【影響】150 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,240,60,109,285,301,317,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】-

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
759	ハナヌカススキ <i>Aira elegans</i> Willd. ex Gaudin	C	C

【原産】欧州 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全域, 中程度 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:- 【県内侵入】-:昭和30年代後半以降 【影響】150 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】238,240,60,109,285,286,317,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
760	ヒメヌカススキ <i>Aira elegans</i> Willd. ex Gaudin subsp. <i>ambigua</i> (Aecang.) Holub.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 鴨川市のみ, 少ない 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:- 【県内侵入】-:1948年 【影響】150 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
761	ノスズメノテッポウ <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	D	C

【原産】欧州,温帯アジア 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度a 船橋市日ノ出町, 少ない. 牧草地や市街地,おそらく絶滅 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】210:1973年 【県内侵入】210:1973年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】侵入確認:1973.6.21 【文献全般】241,240,301,316,319,311,312,40,202,344 【文献県内】39,34,吉川代之助.1974.千葉県の新帰化植物アツミゲシとノスズメノテッポウ.植物採集ニュース(74):27.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
762	オオスズメノテッポウ <i>Alopecurus pratensis</i> L.	D	C

【原産】欧州,西アジア,北アフリカ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全域, 中程度. 牧草として入れられる 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】160:明治 【県内侵入】-:明治~昭和30年代 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,238,240,60,109,285,286,301,317,319,311,312,40,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】-

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
763	オオハマガヤ <i>Ammophila breviligulata</i> Fernald.	A	A

【原産】北米,カナダ大西洋岸 【国内分布】青森県,秋田県,山形県,石川県,静岡県 【県内分布】分布度a 館山市,横芝光町, 極多 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,地下茎による栄養繁殖,種子:重散,:夏 【国内侵入】133(砂防用):1950年代静岡県 【県内侵入】-:1990年代? 【影響】150,280,海岸植生をこわす問題植物 【緊急】- 【対策】- 【備考】別名アメリカハマニンニク 【文献全般】286,312,40,330,165 【文献県内】39,由良浩.2006.オオハマガヤ *Ammophila breviligulata* Fernald. 千葉県植物誌資料21:178-179.,木村陽子.2006.オオハマガヤ追記.千葉県植物誌資料21:179.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
764	メリケンカルカヤ <i>Andropogon virginicus</i> L.	B	B

要注意外来生物(情報不足)

【原産】北米~中央米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 極多?多い 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】220:1940年頃 【県内侵入】-:昭和30年代後半以降 【影響】310,280 芝地・ゴルフ場などの強害草 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】94,232,241,238,240,60,109,272,285,286,301,317,319,311,40,202,71,165,349,344 【文献県内】269,39,小松崎一雄.1976.千葉県北部でも見つかったメリケンカルカヤ.植物採集ニュース(85):28.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
765	ヒメハルガヤ <i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 船橋市小室, 少ない. おそらく絶滅 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】210:1973年船橋市が日本初上陸 【県内侵入】-:1973年 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,239,240,109,285,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39,34,齊藤吉永.1974.新帰化植物ヤネタビラコとヒメハルガヤ.植物採集ニュース(73):19-21.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
766	ハルガヤ <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	C	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 極多. 牧草 【形態・生態】多年草
 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】160:明治 【県内侵入】-:明治 【影響】240花粉症(参天製薬ホームページより)
 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】
 81,94,232,241,222,238,239,240,60,272,285,286,301,317,319,311,312,40,190,202,165,349,344 【文献県内】269,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
767	オオカニツリ <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Presl.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 成田市,木更津市, 多い. 牧草 【形態・生態】多年草
 【繁殖】花粉:風媒,地下茎による栄養繁殖,種子:風散:初夏 【国内侵入】160:明治初期 【県内侵入】160:昭和30年代後半以降
 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】
 81,94,232,241,238,239,240,60,109,285,286,301,317,319,311,312,40,190,202,78,165,82,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
768	チョロギガヤ <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Presl. var. <i>bulbosum</i> (Willd.) Spenner	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 市原市の数カ所, 少ない. おそらく絶滅 【形態・生態】多年草
 【繁殖】花粉:風媒,地下茎による栄養繁殖,種子:風散:初夏 【国内侵入】160:- 【県内侵入】160:明治～昭和30年代
 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】
 81,94,238,239,109,286,301,317,319,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
769	オートムギ <i>Avena sativa</i> L.	D	C

【原産】欧州,カラスムギから改良された 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 数カ所, 少ない 【形態・生態】1年草
 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】110:江戸末期 【県内侵入】110:- 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,241,286,301,317,312,40,202,71,165 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
770	セイヨウチャヒキ <i>Avena strigosa</i> Schreb.	D	C

【原産】欧州,栽培種 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 富里市のみだが、調べればさらに産地は増える, 少ない 【形態・生態】1年草
 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】110:- 【県内侵入】-:1992年 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】侵入確認:富里市 1992.05.08 【文献全般】319,312,202 【文献県内】木村陽子.2006.セイヨウチャヒキ(イネ科)千葉県に産す.千葉県植物誌資料21:181-183.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
771	ハウライチク <i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeusch	D	C
【原産】南中国 【国内分布】九州,四国,関東地方以西で栽培 【県内分布】分布度a 船橋市など, 中程度 【形態・生態】常緑・中高木 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:春 【国内侵入】161:- 【県内侵入】161:- 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,232,109,292,319,312,326,202,71,165,349 【文献県内】39			

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
772	ダイサンチク <i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex Wendl.	D	C
【原産】南中国あるいはマダガスカルといわれるが不明 【国内分布】九州,四国,東海地方以西に希に栽培 【県内分布】分布度a 館山市, 中程度 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:不明 【国内侵入】161:- 【県内侵入】161:- 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】39			

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
773	オオモンツキガヤ <i>Bothriochloa pertusa</i> (Linn.) A.Camus	D	C
【原産】中国広東・雲南の標高1500mあたりの山中やインド 【国内分布】千葉県のみか 【県内分布】分布度a 船橋市, 極少. おそらく絶滅 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】210:1960年 【県内侵入】210:1960年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】134,39,桑原義晴.1977.日本イネ科植物生態図譜(北陸の植物の会)3:71.			

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
774	コニクキビ <i>Brachiaria distachya</i> (L.) Stapf	D	C
【原産】熱帯アジア,東アフリカ 【国内分布】千葉県のみか 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 少ない. 現地では絶滅 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1999/10/22 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】134,39			

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
775	ケニクキビ <i>Brachiaria ramosa</i> (L.) Stapf	D	C
【原産】旧世界の熱帯 【国内分布】千葉県のみか 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 少ない. 現地では絶滅 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:1999年 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】134,39			

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
776	ニクキビ <i>Bracharia subquadrifida</i> (Trin.) Hitchc.	D	C

【原産】奄美,琉球,台湾,インド,マレーシア,ミクロネシア 【国内分布】本州,九州 【県内分布】分布度a 船橋市旭町,千葉市中央港, 少ない. 船橋市では絶滅 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】220,250:- 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】134,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
777	コバンソウ <i>Briza maxima</i> L.	C	C

【原産】欧州,地中海沿岸 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全域, 中程度. 草地・道端など 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】161:明治 【県内侵入】-:昭和30年代後半以降 【影響】150 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,240,60,109,272,285,286,301,317,319,311,312,40,190,202,78,165,349,344 【文献県内】269,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
778	ヒメコバンソウ <i>Briza minor</i> L.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 多い. 草地・道端など,群落になることもある 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】161:1867年 【県内侵入】161:昭和30年代後半以降 【影響】150 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,240,60,109,272,285,286,301,317,319,311,312,40,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】269,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
779	ムクゲチャヒキ <i>Bromus commutatus</i> Schrad.	D	C

【原産】アジア西部～北アフリカ 【国内分布】北海道,本州,九州 【県内分布】分布度a 芝山町,旭市, 少ない. おそらく絶滅 【形態・生態】1～2年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:1950年代 【県内侵入】-:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,60,286,301,317,319,311,312,40,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
780	コスズメノチャヒキ <i>Bromus inermis</i> Leyss.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 木更津市貝淵埋め立て地,野田市,千葉市, 少ない. 牧草として栽培もある 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】160:1962年以前 【県内侵入】160:1969年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】侵入確認:木更津市1969.6.12 【文献全般】81,232,238,240,109,285,301,317,319,311,40,190,202,349,344 【文献県内】143,144,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
781	ハトノチャヒキ <i>Bromus molliformis</i> J.Lloyd	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 分布は散発的,船橋市,浦安市, 極少. おそらく絶滅 【形態・生態】1～2年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:1952年 【県内侵入】-:昭和30年代後半以降 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】ハマチャヒキと分けられない見解あり 【文献全般】81,232,241,238,109,285,286,301,317,311,312,40,190,202,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
782	ハマチャヒキ <i>Bromus mollis</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 木更津市貝淵埋め立て地, 極少. おそらく絶滅 【形態・生態】1～2年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:1950年代 【県内侵入】210:1969年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,240,60,109,285,279,301,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】143,144,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
783	ヒゲナガスズメノチャヒキ <i>Bromus rigidus</i> Roth.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 東京湾沿い, 多い 空き地など 【形態・生態】1～2年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:1912年 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,240,60,109,285,286,301,317,319,311,312,40,190,202,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
784	アレチノチャヒキ <i>Bromus sterilis</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア (広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 野田市のみ, 少ない 【形態・生態】1～2年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:1912年 【県内侵入】210:1997年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,241,222,238,109,286,301,317,319,311,312,40,190,202,349,344 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
785	ウマノチャヒキ <i>Bromus tectorum</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 船橋市 北総, 少ない. 空き地に,船橋市では2000年代でも見られる 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:1941年以前 【県内侵入】-:1968年 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】侵入確認:1968.06.19 【文献全般】81,232,241,238,239,240,60,109,285,286,301,317,319,311,312,40,190,202,349,344 【文献県内】39,365

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
786	イヌムギ <i>Bromus unioloides</i> H. B. K. (syn. <i>Bromus catharticus</i> Vahl)	B	C

【原産】南米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 多い. 空き地,草地,道端に普通にみられる,牧草
【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:春?夏 【国内侵入】210:明治初期 【県内侵入】-:明治～昭和30年代 【影響】310 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,240,60,109,285,286,301,317,319,311,326,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】240,263,269,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
787	シンクリノイガ <i>Cenchrus echinatus</i> L.	D	C

【原産】熱帯アメリカ 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 船橋市日の出町のみ, 少ない. おそらく絶滅 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:着散:秋 【国内侵入】210:- 【県内侵入】-:1975年 【影響】220 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】241,109,285,286,302,317,312,40,202,78 【文献県内】39,吉川代之助.1976.千葉県船橋市にシンクリノイガ現る.植物採集ニュース(86):30.

種子植物	イネ科	国内外来生物	影響度	緊急度
788	カンチク <i>Chimonobambusa marmorea</i> (Mitt.) Makino		D	C

【原産】日本産であるがはっきりとした自生地は不明(鈴木貞夫) 【国内分布】四国,九州,本州中部以南に栽培 【県内分布】分布度a 県南部, 中程度 【形態・生態】連緑・低木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎による栄養繁殖,種子:重散:不明 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:江戸 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】タケノコは晩秋から 【文献全般】336,109,317 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
789	アフリカヒゲシバ <i>Chloris gayana</i> Kunth	D	C

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 鴨川市,野田市下三ヶ尾利根運河, 極少. 牧草 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散・着散:秋 【国内侵入】160:1962年頃 【県内侵入】-:1990年 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】94,241,241,239,240,60,109,285,286,301,317,319,311,312,326,40,190,202,71,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
790	クシヒゲシバ <i>Chloris pectinata</i> Benth.	D	C

【原産】オーストラリア 【国内分布】本州(愛知,千葉) 【県内分布】分布度a 市川市鬼高の元日本毛織, 極少. 絶滅 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散・着散:秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250毛織り工場の羊毛から:1950年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】301,316,312,202 【文献県内】99,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
791	チャボヒゲシバ <i>Chloris truncata</i> R.Br.Prod.	D	C

【原産】太平洋諸島 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市船橋高校校庭,市川市市川毛織, 極少. 絶滅 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,匍匐枝による栄養繁殖,種子:風散・着散:秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250毛織り工場の羊毛から:1960年 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】侵入確認:船橋市 1960.10.04 桑原義晴が船橋市の船橋高校で採集したものの図がある 【文献全般】241,286,301,319,40,202,349 【文献県内】39,桑原義晴.1977.日本イネ科植物生態図譜(北陸の植物の会) 3:70.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
792	オヒゲシバ <i>Chloris virgata</i> Swartz.	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 我孫子市,千葉市,市川市,市原市, 少ない 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散・着散:秋 【国内侵入】210:1922年 【県内侵入】210:1968年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】侵入確認:1968.10.29 【文献全般】94,232,241,238,240,109,285,286,301,317,319,311,312,40,202,78,349,344 【文献県内】39,34,斉藤吉永.1969.帰化品だより(2)千葉県手賀沼畔のオヒゲシバ.植物採集ニュース(43):53-54.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
793	ジュズダマ <i>Coix lacryma-jobi</i> L.	C	C

【原産】東南アジア 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 中程度 【形態・生態】1～多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:水散:秋 【国内侵入】161: 古いに栽培のため移入 【県内侵入】-:江戸 【影響】150 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】94,232,241,238,239,240,109,272,285,286,301,317,312,326,40,202,78 【文献県内】39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
794	ハトムギ <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>mayuen</i> (Roman.) Stapf	D	C

【原産】東南アジア 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 全域に希, 少ない. 栽培畑から逸出 【形態・生態】1～多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:水散:秋 【国内侵入】110: 古いに栽培のため移入 【県内侵入】-:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】232,301,317,326,165 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
795	パンパスグラス <i>Cortaderia selloana</i> (Schult.) Aschers. et Graebn.	D	C

【原産】南米 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 全域,時折, 少ない 植栽放置的 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】161:- 【県内侵入】161:1990年代? 【影響】280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】241,285,286,301,312,40,331,332,202,71,165 【文献県内】237,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
796	ヒゲガヤ <i>Cynosurus echinatus</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州(千葉県,神奈川県,岡山県),九州 【県内分布】分布度a 木更津市貝淵埋め立て地,柏市, 極少 おそらく絶滅 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:1960年 【県内侵入】-:1970年 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】侵入確認:木更津市 1970.6.12 【文献全般】81,232,241,238,239,240,60,109,286,301,319,311,312,40,190,202,165,349,344 【文献県内】144,39,34

種子植物	イネ科	要注意外来生物(緑化植物), 生態学会100	影響度	緊急度
797	カモガヤ <i>Dactylis glomerata</i> L.		B	C

【原産】欧州～西アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 多い 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏 【国内侵入】160:江戸末期 【県内侵入】160:明治～昭和30年代 【影響】240 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,240,60,109,272,285,286,301,317,319,311,312,40,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,330

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
798	タツノツメガヤ <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv.	C	C

【原産】琉球,奄美,小笠原諸島,旧世界熱帯地方 【国内分布】本州,四国,九州(琉球では在来種) 【県内分布】分布度a 千葉市市原市 八千代市 船橋市 市川市, 少ない 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:着散:秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250毛織り工場の羊毛から:1955年 【影響】310 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】侵入確認:市川市日本毛織 1955.09.10 【文献全般】94,232,241,109,285,286,301,317,326,40,71,78,165 【文献県内】39,K.O.1956.第20回さく葉展.千葉生物誌6 (1):20

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
799	ヒメタツノツメガヤ <i>Dactyloctenium radulans</i> (R. Br.) P. Beauv.	D	C

【原産】アフリカ,オーストラリア 【国内分布】近畿,中部,関東 【県内分布】分布度a 銚子市,市川市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1955年以前 【県内侵入】210:1955年以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】適切な除草 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
800	チャボメヒシバ <i>Digitaria longiflora</i> (Retz.) Pers.	D	C

【原産】旧世界の熱帯 【国内分布】琉球,本州(千葉県) 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 少ない 絶滅 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】134,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
801	イヌメヒシバ <i>Digitaria microbachne</i> (Presl) Henr. (syn. <i>D. setigera</i> Roth apud Roem. et Schult.)	D	C

【原産】熱帯アジア 【国内分布】琉球 千葉県 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 少ない 絶滅 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】301,319,311,202,71,78,349 【文献県内】134,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
802	ザラツキコメヒシバ(仮称) <i>Digitaria</i> sp.	D	C

【原産】不明 【国内分布】千葉県 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 少ない 絶滅 【形態・生態】多年草? 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】134,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
803	ハキダメガヤ <i>Dinebra retroflexa</i> (Vahl) Panz. (syn. <i>Dinebra arabica</i> Jacq.)	D	C

【原産】インド西部～アフリカ東部,南アフリカ? 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 市原市, 極少 絶滅か? 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:1931年 【県内侵入】-:1992年 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】標本CBM(市原市ちはら台 1992.11.06 BS-47417) 【文献全般】81,238,240,109,285,286,301,317,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
804	コヒメビエ <i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link	D	C

【原産】アジア,アフリカ熱帯 【国内分布】九州(奄美,琉球),小笠原では在来種,本州(千葉) 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 少ない 絶滅 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】310 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,285,286,302,319,311,312,40,202,165 【文献県内】134

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
805	ノゲシバムギ <i>Elymus repens</i> (L.) Gould. var. <i>aristatum</i> Baumg.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 船橋市2カ所, 少ない 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】220:1953年 【県内侵入】220:平成以前 【影響】310 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,240,109,286,301,312,40,190,202 【文献県内】39

種子植物	イネ科		影響度	緊急度
806	シバムギ	要注意外来生物(緑化植物)	D	C
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski				

【原産】地中海沿岸 【国内分布】北海道,本州 【県内分布】分布度a 船橋市 八千代市 富浦町, 少ない 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210,220:明治 【県内侵入】210,220:明治～昭和30年代 【影響】310,123 トウモロコシへのアレロパシー 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,232,241,238,240,60,109,285,286,302,317,319,311,312,40,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	イネ科		影響度	緊急度
807	シナダレスズメガヤ	要注意外来生物(緑化植物), 生態学会100	B	B
<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees				

【原産】南アフリカ 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 多い 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏?秋 【国内侵入】131:昭和初期 【県内侵入】131:昭和30年代後半以降 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,方針策定 【備考】- 【文献全般】81,94,222,238,239,240,60,109,272,285,317,319,311,312,326,40,190,202,71,165,82,349,344 【文献県内】214,269,39,34

種子植物	イネ科		影響度	緊急度
808	ノハラカゼクサ		D	C
<i>Eragrostis intermedia</i> Hitch.				

【原産】北米南部 【国内分布】本州(神奈川,千葉) 【県内分布】分布度a 市原市, 少ない 絶滅か? 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏?秋 【国内侵入】210:1986年以前 【県内侵入】210:1992年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,109,286,40,202,349 【文献県内】39

種子植物	イネ科		影響度	緊急度
809	スズメガヤ		D	C
<i>Eragrostis minor</i> Host. (syn. <i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) F.T.Hubb.)				

【原産】ユーラシア (広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全域, 少ない 現在はほとんどみられない 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】210:- 【県内侵入】210:1928年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,238,240,109,285,286,301,317,312,40,190,202,78 【文献県内】39

種子植物	イネ科		影響度	緊急度
810	コスズメガヤ		C	C
<i>Eragrostis poaeoides</i> P.Beauv.				

【原産】ユーラシア (広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 中程度 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】210:明治以降 【県内侵入】210:明治～昭和30年代 【影響】310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,240,60,109,272,285,286,301,317,319,311,312,326,40,190,202,71,78,165,344 【文献県内】39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
811	シナダレスズメガヤモドキ(仮称) <i>Eragrostis</i> sp.	D	B

【原産】不明 【国内分布】本州(千葉) 【県内分布】分布度b 各地に散在, 多い 河原 空き地に砂防用に植栽される 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】131:1990年代 【県内侵入】131:1990年代 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】214,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
812	コバンソウモドキ <i>Eragrostis superba</i> Peyr.	D	C

【原産】アフリカ 【国内分布】本州(山梨県,千葉県) 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 極少 絶滅 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】250:1953年 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】301,319,311,312,40,202,349 【文献県内】134,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
813	ヌカカゼクサ <i>Eragrostis tenella</i> (L.) P.Beauv. ex Roem. et Schult.	D	C

【原産】アジア熱帯,亜熱帯 【国内分布】本州,九州(宮崎) 【県内分布】分布度a 千葉市川崎鉄工所内 船橋市旭町, 極少 絶滅か? 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏?秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1950年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】238,240,272,285,286,301,319,311,312,326,40,202,78,349,344 【文献県内】134,K.O.1956.第20回さく葉展.千葉生物誌6 (1):20.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
814	ベニスズメガヤ <i>Eragrostis unioides</i> (Retz.) Nees ex Steud.	D	C

【原産】熱帯アジア 【国内分布】本州(千葉) 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 極少 絶滅 【形態・生態】1~多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】250:1999年 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】312 【文献県内】134,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
815	チャボウシノシッペイ <i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hach.	C	C

【原産】東南アジア,中国南部,台湾 【国内分布】本州,九州 【県内分布】分布度a 各地に散在, 極多 芝生につかわれる 有るところには群落になる 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,地下茎による栄養繁殖,種子:重散 :秋 【国内侵入】131:- 【県内侵入】131:2000年頃 【影響】150 【緊急】緑化用から増える 【対策】公共事業などにおける管理区域外への逸出監視と防止,方針策定 【備考】- 【文献全般】232,109,286,317,319,311,326,40,202,71,349 【文献県内】39,長谷川義人.2003.千葉県のチャボウシノシッペイ.千葉県植物誌資料19:148.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
816	ムラサキノキビ <i>Eriochloa procera</i> (Retz.) O.E.Hubb.	D	C

【原産】熱帯アジア, アフリカ, オーストラリア 【国内分布】本州(小笠原, 名古屋), 九州(琉球) 【県内分布】分布度a 市川市 日本毛織 船橋市旭町, 少ない 絶滅 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:秋 【国内侵入】250,250:1955年以前 【県内侵入】250,250園芸用土のヤシマットから, 毛織り工場から:1955年 【影響】- 【緊急】- 【対策】異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 逸出監視と防止, 輸入時に熱をかける等の侵入防止, 県内土壌で育苗する, 輸送時の洗浄, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】侵入確認:市川市 1955.9.10 【文献全般】286,301,312,40,165 【文献県内】134,39

種子植物	イネ科	要注意外来生物(緑化植物), 生態学会100	影響度	緊急度
817	オニウシノケグサ <i>Festuca arundinacea</i> Schreb.		B	B

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全域, 多い 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:風散:夏 【国内侵入】160:昭和 【県内侵入】160:明治～昭和30年代 【影響】240,150,280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,222,238,240,60,109,272,285,286,301,317,319,311,312,40,190,202,78,349,344 【文献県内】214,269,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
818	ウシノケグサ <i>Festuca ovina</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア, 北米 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州(在来) 【県内分布】分布度b 千葉県のはおそらく帰化品 全域, 少ない 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:風散:夏 【国内侵入】210:日本原産 【県内侵入】-:明治(国内帰化) 【影響】150 【緊急】- 【対策】- 【備考】千葉県のものは逸出 【文献全般】94,240,109,272,301,332,165 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
819	ヒロハウシノケグサ <i>Festuca pratensis</i> Huds.	B	B

【原産】ユーラシア北部 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全域, 多い 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:風散:夏 【国内侵入】160:明治 【県内侵入】160:明治～昭和30年代 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】オニウシノケグサとの交雑品が良くつかわれるようになっている 【文献全般】81,94,222,238,240,60,109,272,285,286,301,317,319,311,312,40,190,202,71,165,349,344 【文献県内】263,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
820	オオウシノケグサ <i>Festuca rubra</i> L.	C	C

【原産】北半球の温帯?亜寒帯 【国内分布】北海道, 本州(在来), 四国, 九州 【県内分布】分布度c 千葉県のはおそらく帰化品 全域, 少ない 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒, 地下茎による栄養繁殖, 種子:風散:夏 【国内侵入】160:- 【県内侵入】160:明治～昭和30年代 【影響】150 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,240,109,272,285,286,301,317,312,40,71,165 【文献県内】213,269,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
821	ムカゴオオウシノケグサ <i>Festuca rubra</i> L. form. <i>vivipara</i> L. Kawano - <i>Festuca vivipara</i> (L.) Sm.	C	C

【原産】北半球の亜寒帯 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 千葉県のはおそらく帰化品, 少ない 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,地下茎・珠芽による栄養繁殖,種子:風散:夏 【国内侵入】160,210:- 【県内侵入】160,210: 明治～昭和30年代 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,286,301,312,202 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
822	ハリノホ <i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) Greuter	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 安房郡 富津市, 少ない 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:水散:初夏 【国内侵入】210:1959年 【県内侵入】210:1950年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,238,240,109,286,301,311,312,40,71,349,344 【文献県内】39,田村正道.1959.安房郡各駅における帰化植物の研究.千葉生物誌8(3):59-63

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
823	シラゲガヤ <i>Holcus lanatus</i> L.	D	C

【原産】欧州,西アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全域, 少ない 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏 【国内侵入】-:1905年以前 【県内侵入】-:1974年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】侵入確認:平塚市博収蔵標本(船橋市小室 1974.6.2 平塚市博標本46213) 【文献全般】81,94,232,222,238,239,240,60,109,272,285,279,301,317,319,311,312,40,190,202,71,78,165,349,344 【文献県内】269,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
824	ニセシラゲガヤ <i>Holcus mollis</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度a 富里市,野田市, 極少 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏 【国内侵入】210:1984年 【県内侵入】210:1991年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】標本CBM(印旛郡富里町中沢 1991.07.03 BS-60838) 【文献全般】81,232,241,109,285,317,319,311,40,349 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
825	ヤバネムギ <i>Hordeum distichon</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア (広域)オオムギの改良種 【国内分布】北海道,本州,四国 【県内分布】分布度a 船橋市 八街市, 少ない 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散 :初夏 【国内侵入】110: 明治以降?ビールの原料 【県内侵入】110: 明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,109,286,301,312,40,202,165 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
826	ホソノゲムギ <i>Hordeum jubatum</i> L.	D	C

【原産】東アジア～北米(広域) 【国内分布】北海道,本州(群馬 千葉) 【県内分布】分布度a 船橋市日の出町, 少ない 【形態・生態】1年草(原産地では多年草) 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:明治以降 【県内侵入】210:1968年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】侵入確認:1968.7.17 【文献全般】81,238,240,60,109,285,286,301,317,319,311,202,349,344 【文献県内】39,34,吉川代之助.1969.千葉県船橋港に上陸したホソノゲムギ.植物採集ニュース(42):44.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
827	ムギクサ <i>Hordeum murinum</i> L.	C	C

【原産】欧州,西アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全域, 中程度 【形態・生態】1～2年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:1868年 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,232,238,240,60,109,285,286,301,317,319,311,312,40,202,71,71,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
828	オオムギクサ <i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】本州(福島) 【県内分布】分布度a 富里市,八街市, 少ない? 【形態・生態】1～2年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:明治以降 【県内侵入】210:2000年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】侵入確認:八街市 2000.5.9 今井正臣 【文献全般】286,319,312,40,202,349 【文献県内】237,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
829	タイワンアイアシ <i>Ischaemum rugosum</i> Salisb.	D	C

【原産】熱帯アジア 【国内分布】琉球在来 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 少ない 絶滅 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:日本原産 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】侵入確認:船橋市 1999.10.22 【文献全般】240,71 【文献県内】134,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
830	ウサギノオ <i>Lagurus ovatus</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 館山市 八千代市, 中程度 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏 【国内侵入】161:1975年 【県内侵入】161:1988年 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】侵入確認:観察記録(館山市船形 1988.5.29 山井廣氏資料目録) 【文献全般】232,109,285,286,301,317,319,311,312,40,331,332,202,165,349 【文献県内】39,34,伊藤至.1975.安房白浜でウサギガヤ採集.植物採集ニュース(82):86.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
831	ハマガヤ <i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth (syn. <i>Diplachne fusca</i> (L.) P.Beauv.)	D	C

【原産】アジア～アフリカ 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 全域海岸部, 中程度 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:水散:秋 【国内侵入】250:1903年 【県内侵入】250:1934年 【影響】150 280 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】標本CBM(長生郡一松村驚海岸 1934.07.15 BS-1690) 【文献全般】232,241,238,240,60,109,285,286,301,317,319,311,40,202,165,349,344 【文献県内】39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
832	ニセアゼガヤ <i>Leptochloa uninervia</i> (C. Presl) Hitchc. et Chase.	D	C

【原産】北米, 南米 【国内分布】本州(愛知, 神奈川) 【県内分布】分布度a 船橋市, 少ない 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:水散:秋 【国内侵入】250:1962年 【県内侵入】250:1989年 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能なかぎり外来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】侵入確認:船橋市1989.11.5 別名ニブイロアゼガヤ 【文献全般】109,285,286,301,317,319,312,40,202,349 【文献県内】39, 木村陽子.1989. 船橋市・海浜公園の帰化植物3種. 千葉生物誌39(1):32-33.

種子植物	イネ科	国内外来生物	影響度	緊急度
833	ハマニンニク <i>Leymus mollis</i> (Trin.) Pilger		C	C

【原産】千島, サハリン, 北米 日本 【国内分布】北海道, 本州, 九州(在来) 【県内分布】分布度b 全域海岸部, 多い 【形態・生態】多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:風散:夏 【国内侵入】133:- 【県内侵入】133 千葉県では砂防用の植栽からの逸出:1950年代 【影響】121,141(在来系統あり) 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける地域個体群の遺伝的多様性を保持した種苗の植栽, 方針策定 【備考】九十九里浜に砂防用に植えられたものから逸出している. 海上郡銚子町犬吠 1929.5.1の標本は自生品か? 【文献全般】240,272,301,312,40,165 【文献県内】39,34

種子植物	イネ科	要注意外来生物(緑化植物)	影響度	緊急度
834	ネズミムギ <i>Lolium multiflorum</i> Lam.		B	B

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全域, 中程度?多い 【形態・生態】冬緑・1～2年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:初夏 【国内侵入】160:明治 【県内侵入】160:明治～昭和30年代 【影響】240 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,240,60,109,285,286,301,317,319,311,40,202,71,165,349,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	イネ科	要注意外来生物(緑化植物)	影響度	緊急度
835	ホソムギ <i>Lolium perenne</i> L.		B	B

【原産】ユーラシア(広域) 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全域, 中程度 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:初夏 【国内侵入】160:明治 【県内侵入】160:明治～昭和30年代 【影響】240,120,150 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】花粉症(参天製薬ホームページより) 【文献全般】81,94,222,238,240,60,109,285,286,301,317,319,311,312,326,40,202,71,78,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
836	ボウムギ <i>Lolium rigidum</i> Gaudin subsp. <i>lepturoides</i> (Boiss.) Sennen et Mauricio	C	C
【原産】ユーラシア（広域）【国内分布】本州, 四国, 九州【県内分布】分布度b 全域の沿海地, 中程度【形態・生態】冬緑・1年草【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:夏【国内侵入】210:1931年【県内侵入】210:昭和30年代後半以降【影響】121【緊急】-【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり【備考】-【文献全般】81, 94, 222, 238, 240, 60, 109, 285, 286, 301, 317, 319, 311, 40, 202, 71, 78, 349, 344【文献県内】39, 34			

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
837	ドクムギ <i>Lolium temulentum</i> L.	C	C
【原産】欧州【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州【県内分布】分布度b 湾岸部に散在, 中程度【形態・生態】冬緑・1年草【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:初夏【国内侵入】210:明治【県内侵入】210:明治～昭和30年代【影響】210(果実に毒性のある菌がつく)【緊急】-【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり【備考】-【文献全般】81, 232, 241, 222, 238, 240, 60, 285, 286, 301, 319, 311, 312, 40, 202, 71, 78, 165, 349, 344【文献県内】39, 34			

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
838	ネズミホソムギ <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn	B	B
【原産】ユーラシア（広域）ホソムギとネズミムギの交配種【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州【県内分布】分布度c 全域, 中程度?多い【形態・生態】冬緑・1年草【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:初夏【国内侵入】160:明治【県内侵入】160:昭和30年代後半以降【影響】150【緊急】-【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり【備考】-【文献全般】232, 241, 238, 109, 286, 301, 317, 312, 40, 190, 202【文献県内】214, 39			

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
839	コネズミガヤ <i>Muhlenbergia schreberi</i> J.F.Gmel.	D	C
【原産】北米【国内分布】本州【県内分布】分布度a 佐倉市 鴨川市, 中程度【形態・生態】夏緑・多年草【繁殖】花粉:風媒, 種子:風散:秋【国内侵入】220:1929年【県内侵入】220:1997年【影響】121【緊急】種子からも発芽率が高い【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定【備考】標本CBM(鴨川市平塚愛宕山 1997.10.31 BS-153793)【文献全般】238, 239, 240, 109, 286, 301, 317, 319, 311, 312, 40, 202, 78, 165, 349, 344【文献県内】39			

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
840	ハナクサキビ <i>Panicum capillare</i> L.	D	C
【原産】北米【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州【県内分布】分布度a 銚子市ヤマサ醤油工場 浦安市, 極少【形態・生態】夏緑・1年草【繁殖】花粉:風媒, 種子:風散:秋【国内侵入】210, 220:1955年【県内侵入】211, 220輸入大豆から:1954年【影響】-【緊急】-【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定【備考】侵入確認:銚子市ヤマサ醤油工場 1954.8.25【文献全般】81, 232, 241, 222, 238, 240, 60, 109, 285, 286, 301, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 349, 344【文献県内】98, 39, 34			

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
841	オオクサキビ <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	C	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】220:1927年 【県内侵入】-:明治～昭和30年代 【影響】121 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,240,60,109,285,286,301,317,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,263,269,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
842	ニコゲヌカキビ <i>Panicum lanuginosum</i> Ell.	D	C

【原産】北米 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 北総 君津市, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】210:1940年 【県内侵入】210:1991年 【影響】121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】標本CBM(印旛郡富里町金堀 1991.07.09 BS-60878) 【文献全般】81,238,240,109,286,301,317,311,312,326,40,202,78,349,344 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
843	キビ <i>Panicum miliaceum</i> L.	D	C

【原産】インド 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 佐倉市 我孫子市 成東町, 極少 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】110:奈良以前 【県内侵入】110:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,240,109,272,301,317,326,332,165 【文献県内】214,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
844	ヒゲギネアキビ(仮称) <i>Panicum</i> sp.	D	C

【原産】学名未詳につき不明 【国内分布】本州(千葉) 【県内分布】分布度a 八千代市, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:秋 【国内侵入】210:1999年 【県内侵入】210:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】侵入確認:八千代市 1999.08.20 【文献全般】312 【文献県内】134,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
845	スズメノナギナタ <i>Parapholis incurva</i> (L.) C. E. Hubb.	C	C

【原産】欧州 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 千葉市 船橋市など東京湾海岸部 鴨川市 館山市, 多い 【形態・生態】1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】250:1988年 【県内侵入】250:1988年 【影響】121 【緊急】- 【対策】可能な限り在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】侵入確認:千葉中央港 1988年 【文献全般】109,286,301,319,311,312,40,202,349 【文献県内】39,133,265,266

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
846	オガサワラスズメノヒエ <i>Paspalum conjugatum</i> Bergius	D	C

【原産】新世界の熱帯 【国内分布】本州(千葉県),九州(琉球) 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】侵入確認:船橋市 1999.09.30 【文献全般】240,285,286,317,326,71,165 【文献県内】134,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
847	シマスズメノヒエ <i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	B	C

【原産】南米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 少ない?中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:1915年 【県内侵入】210:明治~昭和30年代 【影響】150 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】熱帯では牧草として栽培される 【文献全般】94,232,241,222,238,240,60,109,285,286,301,317,319,311,312,326,40,202,71,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	イネ科	要注意外来生物(緑化植物)	影響度	緊急度
848	キシウスズメノヒエ <i>Paspalum distichum</i> L.		B	B

【原産】熱帯(広域) 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 極多 【形態・生態】夏緑・抽水多年草 【繁殖】花粉:風媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】210:1924年 【県内侵入】210:昭和30年代後半以降 【影響】150 280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,241,222,238,240,60,101,109,272,285,286,301,317,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
849	チクゴスズメノヒエ <i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinners	B	B

【原産】北米南部 【国内分布】本州,九州 【県内分布】分布度b 北総,九十九里平野, 多い 【形態・生態】夏緑・抽水多年草 【繁殖】花粉:風媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】210:戦後 【県内侵入】210:1986年 【影響】150 280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】標本CBM(栄町北 1986.10.10 BS-057898) 【文献全般】94,240,60,101,109,285,286,317,319,311,312,202,71,349,344 【文献県内】214,39,土屋守.1990.埼玉県と千葉のチクゴスズメノヒエ.水草研究会会報(35):13.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
850	アメリカスズメノヒエ <i>Paspalum notatum</i> Flgge	C	C

【原産】熱帯米,南米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全域, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:1969年 【県内侵入】-:昭和30年代後半以降 【影響】150 【緊急】- 【対策】- 【備考】牧草として 【文献全般】94,232,241,239,240,60,109,285,286,301,319,311,312,326,40,202,71,349,344 【文献県内】214,269,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
851	スズメノコビエ <i>Paspalum scrobiculatum</i> L.	D	C

【原産】旧世界の熱帯 【国内分布】本州(東海地方以西 千葉県), 四国, 九州在来 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 少ない
【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:秋 【国内侵入】-: 日本原産 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止, 県内土壌で育苗する, 輸送時の洗浄, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】侵入確認:船橋市 1999.9.30 【文献全般】240,272,301,165 【文献県内】134,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
852	タチスズメノヒエ <i>Paspalum urvillei</i> Steud.	C	C

【原産】南米 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 主として南総・安房に分布 分布拡大傾向, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:秋 【国内侵入】210:1958年 【県内侵入】210:1985年 【影響】150 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】標本CBM(鴨川市前原 1985.09.07 BS-058384) 【文献全般】94,232,241,222,238,240,60,109,285,286,301,317,319,311,312,326,40,202,71,165,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
853	シロガネチカラシバ <i>Pennisetum villosum</i> Fresen.	D	C

【原産】アフリカ?アラビア半島 【国内分布】本州(千葉県が日本新産) 【県内分布】分布度a 市川市妙典, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草原産地では多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:風散:秋 【国内侵入】220:2001年 【県内侵入】220植え込み花壇から:2001年 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】「ギンギツネ」観賞用としても栽培される. 侵入確認:市川市 2001.10.11 【文献全般】- 【文献県内】134,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
854	コササガヤ <i>Perotis indica</i> (L.) Kuntze	D	C

【原産】熱帯?亜熱帯アジア 【国内分布】本州(千葉) 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 少ない 【形態・生態】夏緑・1年草-多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:着散:秋 【国内侵入】250:1999年 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止, 県内土壌で育苗する, 輸送時の洗浄, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】侵入確認:船橋市 1999.9.30 【文献全般】- 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
855	オニクサヨシ <i>Phalaris aquatica</i> L.	D	C

【原産】北アフリカ ヨーロッパ 西アジア 【国内分布】本州(神奈川 千葉) 【県内分布】分布度a 千葉市青葉町造成地, 少ない 造成地に出現したが絶滅 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:初夏 【国内侵入】220:1986年神奈川県横浜市 【県内侵入】220:1998年 【影響】- 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】侵入確認:千葉市 1998.6.2 【文献全般】109,286,317,40,202 【文献県内】39,木村陽子・大場達之.2003.ミノボロモドキとオニクサヨシの帰化.千葉県植物誌資料19:144.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
856	カナリークサヨシ <i>Phalaris canariensis</i> L.	D	C

【原産】欧州,西アジア,シベリア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全域, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】110:江戸末期 【県内侵入】-:- 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】小鳥のえさ 【文献全般】81,94,232,241,238,240,60,109,285,317,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】263,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
857	アレチクサヨシ <i>Phalaris paradoxa</i> L. var. <i>praemorsa</i> (Lam.) Coss. et Dur.	D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州(千葉) 【県内分布】分布度a 八街市大街道, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:2003年 【県内侵入】210:2003年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】別名:ヒメセトガヤモドキ,侵入確認:八街市 2003.5.26 【文献全般】- 【文献県内】木村陽子.2004.アレチクサヨシ(イネ科)千葉県に産す.千葉県植物誌資料20:154-155.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
858	ヒメカナリークサヨシ <i>Phalaris minor</i> Retz.	D	C

【原産】ユーラシア (広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 船橋市日の出町 八千代市 市川市, 極少 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】210:昭和初期 【県内侵入】210:1969年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】侵入確認:船橋市 1969.6.1 吉川代之助 HCM52787 【文献全般】81,232,241,238,240,60,109,285,286,301,317,319,311,40,202,78,349,344 【文献県内】39,34,366

種子植物	イネ科	要注意外来生物(緑化植物)	影響度	緊急度
859	オオアワガエリ <i>Phleum pratense</i> L.		C	C

【原産】ユーラシア (広域) 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全域, 中程度 牧草地 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:夏 【国内侵入】-:明治 【県内侵入】-:戦前? 【影響】240花粉症(参天製薬ホームページより) 【緊急】- 【対策】- 【備考】標本CBM(千葉市 1944.05.30 BS-183271) 【文献全般】81,94,232,241,222,238,239,240,60,109,272,285,286,301,317,319,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】214,263,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
860	ホテイチク <i>Phyllostachys aurea</i> Carr. ex A.Riv. et C.Riv.	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全域に希, 少ない 【形態・生態】連緑・中高木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:春(栄養繁殖) 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】161:江戸 【影響】150 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】タケ亜科は春に開花するが、開花周期が67~120年と長く、栄養繁殖が主 【文献全般】336,109,273,301,317,312,332,165 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
861	タイワンマダケ <i>Phyllostachys makinoi</i> Hayata	C	C

【原産】台湾固有種 【国内分布】希に栽培,逸出 【県内分布】分布度a 八日市場市吉崎浜, 中程度 【形態・生態】連緑・高木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】161:- 【県内侵入】:- 【影響】150 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】336,273,301,317,312 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
862	クロチク <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 散在, 少ない 【形態・生態】連緑・中高木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸以前 【県内侵入】:-江戸 【影響】150 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】336,232,273,301,317,312,332,165 【文献県内】240,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
863	ハチク <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Bean) Stapf ex Rendle	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 県南部の方が多い, 中程度 【形態・生態】連緑・高木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】161:平安以前 【県内侵入】:-弥生~室町 【影響】150 【緊急】- 【対策】- 【備考】日本在来と中国から持ち込み両方あり 【文献全般】336,232,273,301,317,312,332,165 【文献県内】214,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
864	モウソウチク <i>Phyllostachys pubescens</i> Mazel ex Houz. de Leh.	C	B

【原産】中国 【国内分布】北海道(函館市以南),本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 多い?極多 【形態・生態】連緑・高木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】161:江戸 【県内侵入】:-江戸 【影響】150 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】94,336,222,109,273,301,316,312,332,165 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
865	タイミンチク <i>Pleioblastus gramineus</i> (Been) Nakai	D	C

【原産】琉球諸島 【国内分布】本州(関東以西),四国,九州 【県内分布】分布度a 山武郡,安房郡,長生郡, 中程度 【形態・生態】連緑・亜高木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】161:- 【県内侵入】161:- 【影響】150 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,301,332 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
866	カンザンチク <i>Pleioblastus hindsii</i> (Munro) Nakai	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州(関東地方南部以西), 四国, 九州 【県内分布】分布度a 一宮町, 富津市, 佐倉市, 少ない 【形態・生態】連緑・亜高木 【繁殖】花粉:風媒, 地下茎で栄養繁殖, 種子:重散:秋 【国内侵入】161:- 【県内侵入】161:- 【影響】150 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,301,332 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
867	リュウキュウチク <i>Pleioblastus linearis</i> (Hackel) Nakai	D	C

【原産】琉球諸島 【国内分布】本州中部以西, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 佐倉市 睦岡村, 少ない 【形態・生態】連緑・亜高木 【繁殖】花粉:風媒, 地下茎で栄養繁殖, 種子:重散:秋 【国内侵入】161:- 【県内侵入】161:明治～昭和30年代 【影響】150 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,301 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
868	ホソバナガハグサ <i>Poa angustifolia</i> L.	D	C

【原産】ユーラシア (広域) 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 船橋市小室町, 少ない 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒, 地下茎で栄養繁殖, 種子:重散:初夏 【国内侵入】160:- 【県内侵入】160:1998年 【影響】150 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】標本CBM(野田市岩名 1998.05.17 BS-238899) 【文献全般】109,286,301,317,312,40,202 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
869	アオスズメノカタビラ <i>Poa annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	C	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度c 全域, 少ない?中程度 【形態・生態】冬?連緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:春 【国内侵入】210:明治以降 【県内侵入】210:明治以降 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】213,134,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
870	コイチゴツナギ <i>Poa compressa</i> L.	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道, 本州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 少ない 【形態・生態】冬緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒, 地下茎で栄養繁殖, 種子:重散:初夏 【国内侵入】210,220:戦後 【県内侵入】210,220:昭和30年代後半以降 【影響】150 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり, 公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化, 方針策定 【備考】- 【文献全般】81,94,238,240,60,109,286,301,317,319,311,40,202,78,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
871	ミスジナガハグサ <i>Poa humilis</i> Ehrh.	D	C

【原産】ユーラシア（広域）【国内分布】本州【県内分布】分布度a 富津市小久保, 中程度【形態・生態】連緑・多年草【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:初夏【国内侵入】160:-【県内侵入】160:1991年【影響】150【緊急】-【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり【備考】標本CBM(富津市小久保 1991.05.16 BS-150783)【文献全般】94,109,286,312,40,202,349,344【文献県内】-

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
872	ナガハグサ <i>Poa pratensis</i> L.	C	C

【原産】ユーラシア（広域）【国内分布】北海道,本州,四国,九州【県内分布】分布度c 全域, 多い【形態・生態】連緑・多年草【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:初夏【国内侵入】160:明治初期【県内侵入】-:1928年【影響】150,280【緊急】-【対策】-【備考】標本CBM(山武郡成東町 1928.06.05 BS-26437)【文献全般】81,94,232,241,222,238,240,60,272,285,286,301,317,319,311,312,40,190,202,71,165,349,344【文献県内】214,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
873	ケナガハグサ <i>Poa pratensis</i> L. var. <i>hirsata</i> Asch. et Graebn.	D	C

【原産】欧州【国内分布】本州【県内分布】分布度a 船橋市古和釜町, 少ない【形態・生態】連緑・多年草【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:初夏【国内侵入】160:-【県内侵入】160:2000年【影響】150【緊急】-【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり【備考】標本CBM(船橋市古和釜町 2000.05.22 BS-180263)【文献全般】94,109,312,202,165,349【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
874	オオスズメノカタビラ <i>Poa trivialis</i> L.	C	C

【原産】欧州～西アジア【国内分布】北海道,本州,四国,九州【県内分布】分布度c 全域, 中程度【形態・生態】冬緑・多年草【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:初夏【国内侵入】210:明治以降【県内侵入】210:明治～昭和30年代【影響】150【緊急】-【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり【備考】-【文献全般】81,94,232,238,240,60,109,285,286,319,311,312,40,202,165,349,344【文献県内】214,39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
875	タマオオスズメノカタビラ <i>Poa trivialis</i> L. form. <i>bulbifera</i> prov.	D	C

【原産】欧州～西アジア【国内分布】本州【県内分布】分布度a 船橋市, 中程度【形態・生態】冬緑・多年草【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:初夏【国内侵入】210:-【県内侵入】210:2001年【影響】150【緊急】-【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり【備考】侵入確認:船橋市 2001.05.18【文献全般】286,40【文献県内】213,39

種子植物	イネ科	国内外来生物	影響度	緊急度
876	ヤダケ <i>Psuedosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino		C	C

【原産】日本,朝鮮南部 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 多い?極多 【形態・生態】連緑・低木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:夏 【国内侵入】-:- 【県内侵入】100:弥生~室町 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】本州,四国,九州に在来 【文献全般】336,273,301,332 【文献県内】39

種子植物	イネ科	国内外来生物	影響度	緊急度
877	ミノボロモドキ <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tsvet.		D	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 君津市を中心とした内房沿岸部, 中程度-多い 【形態・生態】- 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】220:1932年 【県内侵入】220:1997年 【影響】150 【緊急】- 【対策】公共事業などにおける緑化植物の品質チェック強化,方針策定 【備考】侵入確認:袖ヶ浦市 1997.05.17 【文献全般】241,238,240,60,109,285,286,317,319,311,312,40,202,78,165,349,344 【文献県内】39,木村陽子・大場達之.2003.ミノボロモドキとオニクサヨシの帰化.千葉県植物誌資料19:144.

種子植物	イネ科	国内外来生物	影響度	緊急度
878	オクヤマザサ <i>Sasa cernua</i> Makino		D	C

【原産】樺太,北朝鮮,北海道,本州北部 【国内分布】北海道,本州北部は在来 【県内分布】分布度a 鴨川市,佐倉市,山武町, 中程度 【形態・生態】連緑・低木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:春 【国内侵入】-:- 【県内侵入】161:- 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,301 【文献県内】39

種子植物	イネ科	国内外来生物	影響度	緊急度
879	チマキザサ <i>Sasa palmata</i> (Muhl.) Nakai		D	C

【原産】北海道,本州(日本海側);樺太,千島 【国内分布】北海道,本州(在来) 【県内分布】分布度a 佐倉市, 中程度 【形態・生態】連緑・低木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:春?夏 【国内侵入】-:- 【県内侵入】161:江戸 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,301,332 【文献県内】39

種子植物	イネ科	国内外来生物	影響度	緊急度
880	クマザサ <i>Sasa veitchii</i> (Carr.) Rehder		C	C

【原産】京都府の山地 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 多い 【形態・生態】連緑・低木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:春 【国内侵入】-:- 【県内侵入】161:江戸 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,301,332 【文献県内】39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
881	ナリヒラダケ	D	C
<i>Semiarundinaria fastuosa</i> (Mittf.) Makino			

【原産】本州西南部原産 【国内分布】関東地方以西で栽培 【県内分布】分布度a 南部, 中程度 【形態・生態】連緑・小高木
 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:秋?春 【国内侵入】161:江戸以前 【県内侵入】161:江戸 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,273,301,332 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
882	ビゼンナリヒラ	D	C
<i>Semiarundinaria okudoi</i> Makino			

【原産】岡山県? 【国内分布】関東地方以西で栽培,四国,九州 【県内分布】分布度a 清澄山, 中程度 【形態・生態】連緑・小高木
 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:不明 【国内侵入】-:- 【県内侵入】161:- 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,301 【文献県内】39

種子植物	イネ科	国内外来生物	影響度	緊急度
883	ヤシャダケ		D	C
<i>Semiarundinaria yashadake</i> (Makino) Makino				

【原産】日本原産だがはっきりとした産地は不明 【国内分布】本州以南,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度a 清澄山, 中程度
 【形態・生態】連緑・小高木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:不明 【国内侵入】-:- 【県内侵入】161:- 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,301 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
884	フシネキンエノコロ	C	B
<i>Setaria gracilis</i> Kunth			

【原産】熱帯 【国内分布】本州(関東以南?) 【県内分布】分布度a 大多喜町中野ほか, 中程度 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:- 【県内侵入】-:2009年 【影響】121 【緊急】- 【対策】- 【備考】標本CBM(大多喜町中野 2009.8.18 BS-282541).学名は検討の余地がある 【文献全般】240,109,286,317,312,40,202,71 【文献県内】天野誠.2009.ついにフシネキンエノコロが千葉県で見つかった.いすみ大多喜植物調査通信5:1.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
885	イヌエノコロ	D	C
<i>Setaria x decipiens</i> Schimp.			

【原産】欧州 【国内分布】本州(千葉県),九州 【県内分布】分布度a 富里市, 極少 【形態・生態】夏緑・一年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】-:戦後 【県内侵入】-:- 【影響】- 【緊急】- 【対策】- 【備考】エノコログサとザラツキエノコログサとの雑種. 【文献全般】222,319,311,349 【文献県内】237,木村陽子.2007.イヌエノコロ(イネ科)が千葉県で記録.千葉県植物誌資料22:190-191.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
886	ムラサキオオエノコロ <i>Setaria x pycnocomma</i> (Steud.) Henrard ex Nakai form.	C	C

【原産】- 【国内分布】- 【県内分布】分布度a 全域(時折), 極少 【形態・生態】夏緑・一年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋
【国内侵入】210:明治～昭和30年代 【県内侵入】210:- 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
887	オオエノコロ <i>Setaria x pycnocomma</i> (Steud.) Henrard ex Nakai	C	C

【原産】- 【国内分布】- 【県内分布】分布度c 全県に分布, 中程度 【形態・生態】夏緑・中一年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:明治 【県内侵入】210:明治～昭和30年代 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,301 【文献県内】39

種子植物	イネ科	国内外来生物	影響度	緊急度
888	オカメザサ <i>Shibataea kumasasa</i> (Zoll.) Makino		C	C

【原産】日本西南 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 全域, 中程度 【形態・生態】連緑・低木 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:希に初夏 【国内侵入】-:- 【県内侵入】161:江戸 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】273,301,332 【文献県内】39,34

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
889	セイバンモロコシ <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	B	B

【原産】旧世界の熱帯?亜熱帯 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 中程度 牧草 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】110:1943年 【県内侵入】110:1943年 【影響】280 ススキ草地の破壊 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】ヒメモロコシも含む. 1943年千葉県三里塚が日本新産 【文献全般】94,232,109,285,286,317,312,326,40,202,71,78,165 【文献県内】214,263,269,39,久内清孝.1947.セイバンモロコシの帰化.植物研究雑誌21:142.

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
890	イヌシバ <i>Stenotaphrum secundatum</i> Kuntze	D	C

【原産】北米南部～南米 【国内分布】本州(千葉),九州 【県内分布】分布度a 和田町, 中程度 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,匍匐枝で栄養繁殖,種子:重散:秋 【国内侵入】131:1956年 【県内侵入】-:1998年 【影響】121 【緊急】- 【対策】- 【備考】アメリカでは芝生として栽培. 標本CBM(和田町花園 1998.10.14 BS-161268) 【文献全般】238,240,60,286,299,319,311,312,40,202,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
891	シホウチク <i>Tetragonocalamus angulatus</i> (Munro) Nakai	D	C

【原産】中国四川省峨眉山,台湾は持ち込まれた 【国内分布】本州(関東地方以西),四国,九州 【県内分布】分布度a 県南部に散在, 少ない 【形態・生態】連緑・低木 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:不明 【国内侵入】-:120 【県内侵入】161:江戸 【影響】150 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】タケノコは10月 【文献全般】336,273,301,317,312,332,165 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
892	ナギナタガヤ <i>Vulpia myuros</i> (L.) K.C.Gmel.	B	C

【原産】欧州～西アジア 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全域, 極多 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】160:明治 【県内侵入】160:明治～昭和30年代 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】81,94,232,241,222,238,240,60,109,285,286,317,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】-

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
893	オオナギナタガヤ <i>Vulpia myuros</i> (L.) K.C.Gmel. var. <i>megalura</i> (Nutt.) Rydb.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 富里町,袖ヶ浦市 など, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】160:明治 【県内侵入】160:昭和30年代後半以降 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,238,240,60,109,285,286,317,319,311,40,202,78,165,349,344 【文献県内】214,39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
894	ムラサキナギナタガヤ <i>Vulpia octoflora</i> (Walt.) Rydb.	C	C

【原産】北米 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 佐倉市 袖ヶ浦市, 少ない 【形態・生態】冬緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:風散:初夏 【国内侵入】160:1937年以降 【県内侵入】-:明治～昭和30年代 【影響】150,280 【緊急】- 【対策】- 【備考】- 【文献全般】232,241,238,240,60,285,286,319,311,312,40,202,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
895	コウシュンシバ <i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr.	D	C

【原産】九州,琉球,小笠原,東南アジア 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全域, 極多(芝地) 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:初夏 【国内侵入】161:- 【県内侵入】161:明治～昭和30年代 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】240,272,312,40,332 【文献県内】-

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
896	コウライシバ <i>Zoysia pacifica</i> (Goudwaard) M.Hotta et S.Kuroki	D	C

【原産】九州南部,琉球,台湾,中国南部,東南アジア 【国内分布】本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 全域, 極多(芝地) 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散:初夏 【国内侵入】161:日本原産 【県内侵入】161:明治 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】240,312 【文献県内】-

種子植物	イネ科	影響度	緊急度
897	ネズミウシノケグサ(仮称) <i>x Festulolium braunii</i> (K.Richter) A.Camus	D	C

【原産】ユーラシア 【国内分布】本州(千葉県のみ) 【県内分布】分布度a 千葉市青葉町生態園, 少ない 絶滅 【形態・生態】1-2年草と多年草との雑種なので多年草? 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:初夏 【国内侵入】210:- 【県内侵入】210:1989年 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】侵入確認:1989.5 千葉市青葉町. ヒロハウシノケグサかオオウシノケグサとネズミムギの属間雑種 【文献全般】- 【文献県内】大場達之.1989.生態園今のみどころ-ムギの秋-No.13.

種子植物	ヤシ科	国内外来生物	影響度	緊急度
898	シュロ <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.		B	B

【原産】中国,九州南部 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 中程度 【形態・生態】常緑・高木 【繁殖】花粉:虫媒,種子:食散:秋 【国内侵入】161:江戸以前 【県内侵入】161:1937年以前 【影響】121,280 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,336,232,222,109,273,300,302,326 【文献県内】214,39,34

種子植物	サトイモ科	影響度	緊急度
899	ムサシアブミ <i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	D	C

【原産】関東以南の暖地,千葉県のは逸出? 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 富里市, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,塊茎で栄養繁殖,種子:食散:秋 【国内侵入】自生:日本原産 【県内侵入】161:1995年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】109,272,312,332 【文献県内】39

種子植物	サトイモ科	影響度	緊急度
900	サトイモ <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	D	C

【原産】熱帯アジア 【国内分布】北海道,本州,四国,九州(栽培) 【県内分布】分布度b 各地に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,塊茎で栄養繁殖,種子:食散:秋 【国内侵入】110:縄文(栽培) 【県内侵入】110:弥生~室町 【影響】- 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】286,316,312,332 【文献県内】39

種子植物	サトイモ科		影響度	緊急度
901	ボタンウキクサ	特定外来生物, 生態学会100	A	A
	<i>Pistia stratiotes</i> L.			

【原産】熱帯アフリカ 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 各地に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・浮遊多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 匍匐枝で栄養繁殖, 種子: 水散: 秋 【国内侵入】163: 1887年以前 【県内侵入】163: 1995年以前 【影響】121, 120, 350 【緊急】- 【対策】外来生物法の遵守 【備考】- 【文献全般】232, 60, 109, 285, 286, 301, 317, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 71, 349 【文献県内】39

種子植物	サトイモ科		影響度	緊急度
902	オランダカイウ		C	C
	<i>Zantedeschia aethiopica</i> Spreng.			

【原産】南アフリカ 【国内分布】本州, 四国, 九州(栽培) 【県内分布】分布度a 北総に散在, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 虫媒, 塊茎で栄養繁殖, 種子: 水散: 秋 【国内侵入】161: 江戸 【県内侵入】161: 2003年以前 【影響】280, 350 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】286, 312, 332 【文献県内】39

種子植物	ウキクサ科		影響度	緊急度
903	イボウキクサ		D	C
	<i>Lemna gibba</i> L.			

【原産】欧州 【国内分布】本州, 四国 【県内分布】分布度a 袖ヶ浦市, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 水媒, 茎葉体の分裂で栄養繁殖, 種子: 水散: 秋 【国内侵入】210: 1974年以前 【県内侵入】210: 2000年以前 【影響】310, 121 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】239, 60, 101, 109, 285, 286, 301, 319, 311, 312, 40, 202, 349, 344 【文献県内】39

種子植物	ウキクサ科		影響度	緊急度
904	ヒナウキクサ		B	B
	<i>Lemna miniscula</i> Herter			

【原産】北米 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 富里市, 佐倉市, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 水媒, 茎葉体の分裂で栄養繁殖, 種子: 水散: 秋 【国内侵入】210: 1965年以前 【県内侵入】210: 1982年以前 【影響】121, 310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】239, 60, 101, 109, 286, 301, 319, 311, 312, 326, 40, 202, 349, 344 【文献県内】39, 大滝末男. 1981. 印旛沼にヒメウキクサの大繁殖を見る. 水草研究会会報(6): 10-11.

種子植物	ウキクサ科		影響度	緊急度
905	コウキクサ		C	C
	<i>Lemna minor</i> L. (s.l.)			

【原産】南米を除く全世界 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度b 北総に散在, 極多 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉: 水媒, 茎葉体の分裂で栄養繁殖, 種子: 水散: 秋 【国内侵入】210: 日本原産? 【県内侵入】210: 1975年以前 【影響】121, 310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】101, 272, 165 【文献県内】39, 34

種子植物	ウキクサ科	影響度	緊急度
906	ヒメウキクサ <i>Spirodela punctata</i> (G.F.W.) Thomson	A	B

【原産】オーストラリア, アフリカ南部, 東アジア 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 君津市亀山湖, 極多 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:水媒, 茎葉体の分裂で栄養繁殖, 種子:水散:秋 【国内侵入】110:日本原産? 【県内侵入】110:2009年以前 【影響】121,310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,239,101,272,285,286,302,312,40,202 【文献県内】-

種子植物	ウキクサ科	影響度	緊急度
907	ミジンコウキクサ <i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas	C	C

【原産】欧州南部 【国内分布】本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 各地に散在, 極多 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:水媒, 茎葉体の分裂で栄養繁殖, 種子:水散:秋 【国内侵入】210:1938年 【県内侵入】210:1975年以前 【影響】121,310 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出監視と防止, 適切な除草の徹底, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】94,232,239,60,101,272,285,286,301,319,311,312,326,40,202,71,78,165,349,344 【文献県内】214,39,34

種子植物	ガマ科	影響度	緊急度
908	モウコガマ <i>Typha laxmannii</i> Lepech.	B	B

【原産】ユーラシア (広域) 【国内分布】本州 【県内分布】分布度a 芝山町, 少ない 【形態・生態】夏緑・挺水多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:風散:夏～秋 【国内侵入】161:1990年代? 【県内侵入】161:1995年以前 【影響】121 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報, 販売規制などの検討, 管理区域外への遺棄防止, 栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】101,109,286,319,312,40,202 【文献県内】236,39,折目庸雄・大場達之.1996.モウコガマが芝山町に現れた.千葉県植物誌資料 9:55-56.

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
909	オオハタガヤ <i>Bulbostylis puberula</i> (Poir.) Clarke	D	C

【原産】熱帯アジア, アフリカ 【国内分布】本州(千葉県のみ) 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 一時的, 極少(消滅) 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能な限り在来品種を使う, 異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり, 管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】213

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
910	アメリカヤガミスゲ <i>Carex scoparia</i> Schkuhr	C	C

【原産】北アメリカ 【国内分布】北海道, 本州, 四国, 九州 【県内分布】分布度a 非常にまれ, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒, 種子:重散:春 【国内侵入】200:1980年代 【県内侵入】200:2002年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸送時の検査・洗浄, 工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】- 【文献全般】286,312,40 【文献県内】214

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
911	ナガバアメリカミコシガヤ <i>Carex vulpinoidea</i> Michx.	C	C

【原産】北アメリカ 【国内分布】神奈川,北海道,宮城,栃木,埼玉,愛知,岡山,福岡 【県内分布】分布度a 印西市,印旛沼畔の湿地
 【形態・生態】多年生草本.夏緑.地下茎は伸ばさない.外形はミコシガヤに似る 【繁殖】花粉:風媒,種子:自散 【国内侵入】-:1992年以前 【県内侵入】-:2010年以前 【影響】休耕田で発見 【緊急】- 【対策】抜き取り 【備考】標本CBM(BS300785,BS300786等)
 【文献全般】285 【文献県内】-

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
912	シュロガヤツリ <i>Cyperus alternifolius</i> L.	D	C

【原産】マダガスカル島 【国内分布】本州,四国,九州,琉球,小笠原 【県内分布】分布度a 各地に散在, 少ない 【形態・生態】常緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:水散:夏～秋 【国内侵入】161,300:- 【県内侵入】161:明治～昭和30年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】-
 【文献全般】232,241,60,109,272,285,286,317,319,311,312,326,40,61,71,165,349 【文献県内】39

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
913	ナガミイッスンガヤツリ <i>Cyperus castaneus</i> Willd.	D	C

【原産】東南アジア,インド,北オーストラリア 【国内分布】千葉県のみ 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 極少(一時的,消滅)
 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:春～秋 【国内侵入】250(園芸用のヤシマツから):- 【県内侵入】250:1999年のみ 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能な限り在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】木村陽子・大場達之・須賀はる子.2007.船橋市に一時帰化したクルマバヒメクグヒメナンヨウガヤツリナガミイッスンガヤツリ(新称).千葉県植物誌資料23:207-209.

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
914	ユメノシマガヤツリ <i>Cyperus congestus</i> (Vahl) C.B.Clarke	B	B

【原産】アフリカ南部,オーストラリア 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 各地に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草
 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】200:1980年頃 【県内侵入】200:昭和30年代後半以降 【影響】121 【緊急】-
 【対策】輸送時の検査・洗浄,工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】- 【文献全般】60,109,285,286,311,312,40,202,349,344 【文献県内】214,39,大野景徳・木村陽子.1996.千葉県内に広がるユメノシマガヤツリ.千葉県植物誌資料7:42-43.,大野景徳・木村陽子・倉俣武男.1996.千葉県内に広がるユメノシマガヤツリ続報.千葉県植物誌資料8:54.

種子植物	カヤツリグサ科	国RDB:CR	影響度	緊急度
915	ホウキガヤツリ <i>Cyperus distans</i> L.f.		D	C

【原産】熱帯 【国内分布】四国,本州(千葉),琉球 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 極少(一時的,消滅) 【形態・生態】夏緑・多年草
 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】200,300:- 【県内侵入】250園芸用土のヤシマツから:1999～2000年
 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能な限り在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】木村陽子.2006.ホウキガヤツリの一時帰化.千葉県植物誌資料21:184-185.

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
916	ホソミキンガヤツリ <i>Cyperus engelmannii</i> Steud.	B	B

【原産】北米 【国内分布】本州,小笠原 【県内分布】分布度b 横芝光町,佐倉市,野田市,館山市,佐原市,柏市,印西市,神崎町,山武市, 中程度 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散,水散:秋 【国内侵入】200:1980年代 【県内侵入】200:1980年代? 【影響】310 【緊急】- 【対策】輸送時の検査・洗浄,工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】標本CBM 【文献全般】109,286,312,40,202 【文献県内】214

種子植物	カヤツリグサ科	要注意外来生物(情報不足)	影響度	緊急度
917	メリケンガヤツリ <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.		B	B

【原産】熱帯米 【国内分布】本州,小笠原,四国,九州,琉球 【県内分布】分布度b 北部に散在, 少ない 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】200:1959年 【県内侵入】200:- 【影響】121 【緊急】- 【対策】輸送時の検査・洗浄,工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】- 【文献全般】239,60,109,285,286,317,319,311,312,326,40,61,71,165,349,344 【文献県内】39

種子植物	カヤツリグサ科	要注意外来生物(情報不足)	影響度	緊急度
918	シヨクヨウガヤツリ <i>Cyperus esculentus</i> L.		B	B

【原産】ヨーロッパ〜アフリカ 【国内分布】本州 【県内分布】分布度b 北部に散在, 少ない. 水田の畦,穀類・豆類の畑に多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,塊茎で栄養繁殖,種子:重散:夏〜秋 【国内侵入】200:1980年代 【県内侵入】200:1990年代 【影響】121,310 【緊急】- 【対策】輸送時の検査・洗浄,工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】別名キハマスゲ 【文献全般】109,285,286,317,312,40,61,165 【文献県内】39

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
919	ヒメムツオレガヤツリ <i>Cyperus ferruginescens</i> Boeckl.	D	C

【原産】北アメリカ 【国内分布】近畿,中部,関東 【県内分布】分布度a 佐原市,神崎町, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:1984年 【県内侵入】210:1984年 【影響】121 【緊急】- 【対策】適切な除草 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
920	コガネガヤツリ <i>Cyperus laetus</i> J. & C. Presl	D	C

【原産】南アメリカ 【国内分布】関東 【県内分布】分布度a 我孫子市,沼南町, 極少 【形態・生態】夏緑・一年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】210:1976年 【県内侵入】210:1976年 【影響】121 【緊急】- 【対策】適切な除草 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】-

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
921	セイタカハマスゲ <i>Cyperus longus</i> L.	D	C

【原産】地中海沿岸,西南アジア,アフリカ 【国内分布】本州(関東) 【県内分布】分布度a 佐倉市, 極少(一時的,消滅) 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】200:1984年 【県内侵入】200:1990年代 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸送時の検査・洗浄,工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】- 【文献全般】285,286,319,312,40,202 【文献県内】39

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
922	シチトウイ <i>Cyperus monophyllus</i> Vahl	D	C

【原産】熱帯アジア 【国内分布】本州以南 【県内分布】分布度a かつて散在したが、現在は確認されない, 極少(消滅か?) 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,地下茎で栄養繁殖,種子:重散・水散:秋 【国内侵入】200:- 【県内侵入】200:- 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸送時の検査・洗浄,工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】- 【文献全般】232,285,319,311,312,326,40,71,165,349 【文献県内】39

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
923	タイトウクグ <i>Cyperus sesquiflorus</i> (Torr.) Mattf. et Kuk. var. <i>subtriceps</i> (Nees) T.Koyama	D	C

【原産】アジア〜アフリカの熱帯 【国内分布】琉球 【県内分布】分布度a 袖ヶ浦市の港湾, 極少(消滅?) 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:秋 【国内侵入】200,300:- 【県内侵入】200(荷揚げ物資や埋め立て用土に混入か):1985年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸送時の検査・洗浄,工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】- 【文献全般】286,312,71 【文献県内】39,堀内洋.1996.千葉県に未記録のタイトウクグ(カヤツリグサ科)の標本を確認する.千葉県植物誌資料8:47-48.

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
924	ゴマフガヤツリ <i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb.	D	C

【原産】熱帯米 【国内分布】千葉県,東京都,神奈川県 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 消滅(一時的,消滅) 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏〜秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】109,286,312,40,202 【文献県内】213,39

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
925	シバヤマハリイ <i>Eleocharis engelmanni</i> Steud. var. <i>detonsa</i> A.Gray	D	C

【原産】北アメリカ 【国内分布】千葉県のみ 【県内分布】分布度a 芝山町, 極小(消滅) 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:水散:秋 【国内侵入】200,300:1990年代 【県内侵入】200:1995年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸送時の検査・洗浄,工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】- 【文献全般】286,312,40,202 【文献県内】236,39,折目庸雄・大場達之・木村陽子・勝山輝男・小崎昭則・遠藤泰彦.1996.ハリイ属の新しい帰化種.千葉県植物誌資料6:29-33.

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
926	ヒメナンヨウガヤツリ <i>Pycneus pumilus</i> (L.) Nees subsp. <i>pumilus</i>	D	C

【原産】インド,東南アジア,オーストラリア 【国内分布】本州(千葉県のみ) 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 極小(一時的,消滅) 【形態・生態】夏緑・1年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】200,300:1999年 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年のみ 【影響】- 【緊急】- 【対策】可能なかぎり在来品種を使う,異物混入として排除された種子の廃棄方法のガイドラインづくり,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】木村陽子・大場達之・須賀はる子.2007.船橋市に一時帰化したクルマバヒメグヒメナンヨウガヤツリナガミイッスンガヤツリ(新称).千葉県植物誌資料23:207-209.

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
927	クルマバヒメグ <i>Kyllinga polyphylla</i> Willd. ex Kunth	D	C

【原産】熱帯アフリカ,マダガスカル 【国内分布】本州(現在の所, 千葉県のみか?) 【県内分布】分布度a 船橋市旭町, 極少 絶滅 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250園芸用土のヤシマットから:1999年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた種子の混入防止,県内土壌で育苗する,輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】木村陽子・大場達之・須賀はる子.2007.船橋市に一時帰化したクルマバヒメグヒメナンヨウガヤツリナガミイッスンガヤツリ(新称).千葉県植物誌資料23:207-209.

種子植物	カヤツリグサ科	影響度	緊急度
928	セフリアブラガヤ <i>Scirpus georgianus</i> R.M.Harper	D	C

【原産】北米 【国内分布】本州,九州 【県内分布】分布度a 印西市, 極小(一時的,消滅) 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:風媒,種子:重散:夏～秋 【国内侵入】200,300:1980年代 【県内侵入】200:1989年 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸送時の検査・洗浄,工場・空港・港湾などのモニタリングと除去 【備考】- 【文献全般】109,286,317,312,40,61 【文献県内】木村陽子.1998.セフリアブラガヤ、印西町に産す.千葉県植物誌資料11:78-79.

種子植物	バショウ科	影響度	緊急度
929	バショウ <i>Musa basjoo</i> Makino	D	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 鋸南町, 極少 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:食散:秋 【国内侵入】161:平安 【県内侵入】161:江戸 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】336,301,312,332,202,165,349 【文献県内】-

種子植物	ショウガ科	影響度	緊急度
930	ミョウガ <i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe	C	C

【原産】中国 【国内分布】本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 全県に分布, 多い 【形態・生態】夏緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,地下茎で栄養繁殖,種子:食散:秋 【国内侵入】110:奈良以前 【県内侵入】110:江戸以前 【影響】121,120 【緊急】- 【対策】管理区域外への逸出防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】232,109,301,317,312,40,332,190,71,165 【文献県内】39

種子植物	クズウコン科		影響度	緊急度
931	ミズカンナ		D	C
	<i>Thalia dealbata</i>			

【原産】北アメリカ,南アメリカ 【国内分布】本州,四国 【県内分布】分布度a 木更津市十日市場(小櫃川河岸), 極少 【形態・生態】連緑・多年草 【繁殖】花粉:虫媒,種子:重散:秋 【国内侵入】161:1979年以前 【県内侵入】161:平成以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】販売時の外来種問題の広報,販売規制などの検討,管理区域外への遺棄防止,栽培時のガイドラインづくり 【備考】標本CBM(2009.8.9小櫃川河岸(木更津市十日市場)小田島氏発見 【文献全般】- 【文献県内】-

蘚苔類	センボンゴケ科	国内外来生物	影響度	緊急度
932	チュウゴクネジクチゴケ		D	C
	<i>Didymodon constrictus</i> (Mitt.) Saito			

【原産】日本在来種 【国内分布】本州以南 【県内分布】分布度c 道路脇のコンクリート壁, 多い 【形態・生態】多年生 【繁殖】孢子,無性芽,種子:孢子は風散. 無性芽は不明. :通年 【国内侵入】250:日本原産 【県内侵入】250:不明 【影響】- 【緊急】- 【対策】風散のため対策は困難 【備考】好石灰性だが、石灰質の凝灰岩にはみられないため、国内移入だと思われる 【文献全般】100,260 【文献県内】112,260,298,55,56

蘚苔類	ギボウシゴケ科	国内外来生物	影響度	緊急度
933	コバノスナゴケ		D	C
	<i>Racomitrium barbuloides</i> Cardot			

【原産】日本在来種 【国内分布】全国 【県内分布】分布度b 市原市,白井市,佐倉市ほか, 中程度 【形態・生態】多年生 【繁殖】孢子,種子:風散:秋から春 【国内侵入】250:日本原産 【県内侵入】250:不明 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着している火成岩を移動させる際には、植物体を可能な限り除去する 【備考】県内には産しない火成岩上にのみ生育している状況から推測して国内移入だと思われる 【文献全般】100 【文献県内】112,55,56,58

蘚苔類	ギボウシゴケ科	国内外来生物	影響度	緊急度
934	チョウセンスナゴケ		D	C
	<i>Racomitrium carinatum</i> Cardot			

【原産】日本在来種 【国内分布】本州以南 【県内分布】分布度a 東金市, 中程度 【形態・生態】多年生 【繁殖】孢子,種子:風散:秋から春 【国内侵入】250:日本原産 【県内侵入】250:不明 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着している火成岩を移動させる際には、植物体を可能な限り除去する 【備考】県内には産しない火成岩上にのみ生育している状況から推測して国内移入だと思われる 【文献全般】100 【文献県内】59

蘚苔類	ギボウシゴケ科	国内外来生物	影響度	緊急度
935	シモフリゴケ		D	C
	<i>Racomitrium lanuginosum</i> (Hedw.) Brid.			

【原産】日本在来種 【国内分布】全国の高山 【県内分布】分布度b 市原市,白井市, 少ない 【形態・生態】多年生 【繁殖】孢子,種子:風散:夏 【国内侵入】250:日本原産 【県内侵入】250:不明 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着している火成岩を移動させる際には、植物体を可能な限り除去する 【備考】県内には産しない火成岩上にのみ生育している状況から推測して国内移入だと思われる 【文献全般】100 【文献県内】58

藓苔類	ヒジキゴケ科	国内外来生物	影響度	緊急度
936	ヒジキゴケ <i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P.Beauv.		D	C

【原産】日本在来種 【国内分布】全国 【県内分布】分布度a 詳細は不明,社寺や人家, 多い 【形態・生態】多年生 【繁殖】胞子,種子:風散:秋から春 【国内侵入】250:日本原産 【県内侵入】250:不明 【影響】- 【緊急】- 【対策】付着している火成岩を移動させる際には,植物体を可能な限り除去する 【備考】県内には産しない火成岩上にのみ生育している状況から推測して国内移入だと思われる 【文献全般】100 【文献県内】36,56

藓苔類	ミカヅキゼニゴケ科	影響度	緊急度
937	ミカヅキゼニゴケ <i>Lunularia cruciata</i> Dumort.	B	C

【原産】地中海沿岸 【国内分布】全国 【県内分布】分布度c 全県の裸地, 極多 【形態・生態】多年生 【繁殖】胞子,無性芽,種子:胞子は風散. 無性芽は雨滴によるはね散り. :通年 【国内侵入】240:昭和4年 【県内侵入】240:不明 【影響】裸地の表面を覆ってしまうため,道端に生育するコケ植物や維管束植物への影響が懸念される 【緊急】- 【対策】生育地を歩いた靴に付着した土壌が拡散しないように注意する 【備考】- 【文献全般】100 【文献県内】36

藓苔類	ジンガサゴケ科	国内外来生物	影響度	緊急度
938	ミヤコゼニゴケ <i>Mannia fragrans</i> (Barbis) Frye et Clark		C	C

【原産】日本在来種 【国内分布】関東地方 【県内分布】分布度b 詳細は不明,公園や人家,畑, 多い 【形態・生態】多年生 【繁殖】胞子,種子:風散:初冬 【国内侵入】210:日本原産 【県内侵入】210:戦後 【影響】- 【緊急】- 【対策】生育地の土壌を移動させる際には,植物体を可能な限り除去する. また,生育地を歩いた靴に付着した土壌が拡散しないように注意する 【備考】- 【文献全般】100 【文献県内】36

藓苔類	ウキゴケ科	影響度	緊急度
939	ウロコハタケゴケ <i>Riccia lamellosa</i> Raddi	B	B

【原産】欧米 【国内分布】関東地方 【県内分布】分布度b 下総台地の社寺,公園,畑, 極多 【形態・生態】一年草 【繁殖】胞子,種子:植物体の枯死による:秋から冬 【国内侵入】240:2000年頃以降 【県内侵入】240:2000年頃以降 【影響】大量に生育するため,在来ウキゴケ属への影響が懸念される 【緊急】近年, 関東地方では急速に拡大している 【対策】生育地の土壌を移動させる際には,植物体を可能な限り除去する. また生育地を歩いた靴に付着した土壌が拡散しないように注意する 【備考】- 【文献全般】54 【文献県内】112,57

藓苔類	ウキゴケ科	影響度	緊急度
940	サビイロハタケゴケ <i>Riccia nigrella</i> DC.	C	B

【原産】欧米 【国内分布】関東地方 【県内分布】分布度b 都市部の社寺,公園, 多い 【形態・生態】多年生 【繁殖】胞子,種子:植物体の枯死による:秋から春 【国内侵入】240:2000年頃以降 【県内侵入】240:2000年頃以降 【影響】大量に生育するため,在来ウキゴケ属への影響が懸念される 【緊急】近年, 関東地方では急速に拡大している 【対策】生育地の土壌を移動させる際には,植物体を可能な限り除去する. また生育地を歩いた靴に付着した土壌が拡散しないように注意する 【備考】- 【文献全般】128 【文献県内】112,128

地衣類	イワノリ科	国内外来生物	影響度	緊急度
941	ウスバイシバイイワノリ <i>Collema latzelii</i> Zahlbr.		D	C

【原産】北半球 【国内分布】不明(国内在来種) 【県内分布】分布度a 千葉市中央区,定着しているが、逸出は確認できない 【形態・生態】葉状 【繁殖】子のう胞子,種子:風散:不明 【国内侵入】-:- 【県内侵入】250,当該地衣が付着する庭石(石灰岩)の搬入に伴う。明らかに県外から。:2001年以前 【影響】- 【緊急】- 【対策】輸入時に熱をかける・消毒する等の生きた地衣体の混入防止。輸送時の洗浄,管理区域外への逸出監視と防止 【備考】文献情報なし,未発表 生育確認(原田浩 2001.10.12)国RDB(NT) 【文献全般】- 【文献県内】-

大型菌類	ショウロ科	県RDB:D	影響度	緊急度
942	ショウロ <i>Rhizopogon rubescens</i> (Tul. & C. Tul.) Tul. & C. Tul.		D	C

【原産】北半球一帯 【国内分布】- 【県内分布】分布度c 千葉市美浜区,中央区,植栽クロマツ林 【形態・生態】外生菌根共生(マツ属) 【繁殖】胞子と植物に感染した菌糸,秋～冬 【国内侵入】-:- 【県内侵入】210(植栽クロマツの苗土壌):1970年代以降 【影響】141 【緊急】- 【対策】植栽を可能な限り県内産にする。管理区域外への逸出監視と防止,適切な除去の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】県内各地に自生する種類だが、外来と思われるものが東京湾岸の埋立地の植栽クロマツ林内に見られる 【文献全般】- 【文献県内】46,47

大型菌類	キシメジ科	国内外来生物	影響度	緊急度
943	ハマシメジ <i>Tricholoma myomyces</i> (Pers.) J.E.Lange	県RDB:D	D	C

【原産】欧州,北米,日本 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度c 千葉市美浜区,中央区,植栽クロマツ林 【形態・生態】外生菌根共生(マツ属) 【繁殖】胞子と植物に感染した菌糸:秋 【国内侵入】-:- 【県内侵入】210(植栽クロマツの苗土壌):1970年代以降 【影響】141 【緊急】- 【対策】植栽を可能な限り県内産にする。管理区域外への逸出監視と防止,適切な除草の徹底,栽培時のガイドラインづくり 【備考】県内各地に自生する種類だが、外来と思われるものが東京湾岸の埋立地の植栽クロマツ林内に見られる 【文献全般】- 【文献県内】46,48

大型菌類	イグチ科	国内外来生物	影響度	緊急度
944	シロヌメリイグチ <i>Suillus laricinus</i> (Berk.) Kuntze		D	C

【原産】ユーラシア,北米,日本 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度a 千葉市泉自然公園,佐倉市佐倉城址公園,植栽カラムツ 【形態・生態】外生菌根共生(カラムツ属) 【繁殖】胞子と植物に感染した菌糸:夏～秋 【国内侵入】-:- 【県内侵入】210(植栽カラムツの苗土壌):1996年 【影響】- 【緊急】- 【対策】県内に分布しない樹木植栽時のガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】48

大型菌類	タマハジキタケ科	影響度	緊急度
945	タマハジキタケ属種 <i>Sphaerobolus</i> sp.	D	C

【原産】中国 【国内分布】- 【県内分布】分布度a 松尾町木刀,観葉植物カーラーの鉢植え土壌表面 【形態・生態】腐生性 【繁殖】胞子と菌糸,種子:自散:夏～秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250(堆肥?):1992年 【影響】310 【緊急】- 【対策】輸入堆肥使用についてのガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】46,103

大型菌類	ウラボニガサ科	影響度	緊急度
946	トゲウラボニガサ <i>Pluteus magnus</i> McClatchie	D	C

【原産】北米 【国内分布】- 【県内分布】分布度a 長柄町長柄山,マイタケ栽培の廃棄培地放棄跡 【形態・生態】腐生性 【繁殖】胞子と菌糸,種子:風散:夏～秋 【国内侵入】250:- 【県内侵入】250(栽培きのこの培地(木材チップ?)?):2007年 【影響】- 【緊急】- 【対策】培地廃棄時のガイドラインづくり 【備考】日本新産種として報告された,分布は北米と日本の千葉県 【文献全般】- 【文献県内】315

大型菌類	ハラタケ科	影響度	緊急度
947	ツブエノシメジ <i>Melanoleuca verrucipes</i> (Fr.) Singer	D	C

【原産】欧州 【国内分布】北海道,本州,四国,九州 【県内分布】分布度b 我孫子市,印旛郡,佐倉市,千葉市,市原市,公園,植栽木,公園内の園路沿いなどの周囲に撒布された木材チップ,バーク堆肥などの場所 【形態・生態】腐生性 【繁殖】胞子と菌糸:風散:夏～秋 【国内侵入】:- 【県内侵入】250(木材チップなど):1987年 【影響】- 【緊急】- 【対策】野外散布木材チップについてのガイドラインづくり 【備考】- 【文献全般】- 【文献県内】47

線虫類	ブラティレンクス科	影響度	緊急度
948	レンコンネモグリセンチュウ <i>Hirschmanniella</i> sp.	C	B

【原産】? 【国内分布】レンコン栽培地 【県内分布】長生郡,君津郡,香取郡,レンコン栽培圃場 【形態・生態】TL♀1-2mm,草食,環境:淡水域(レンコン栽培田) 【繁殖】卵生,場所:レンコン根部,時期:通年 【国内侵入】210:? 【県内侵入】210:1990年代前半 【影響】310(レンコン) 【緊急】登録農薬がなく汚染圃場は拡大中 【対策】無寄生の種はす選択. 線虫汚染圃場からの土の移動防止,連作を避け,休耕又は乾田化し,線虫密度を下げる 【備考】生理生態及び形態分類については中央農業総合研究センター線虫害研究室 【文献全般】- 【文献県内】4,177

線虫類	アフレンコイデス科	生態学会100	影響度	緊急度
949	マツノザイセンチュウ <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>		A	A

【原産】北アメリカ 【国内分布】北海道,青森県を除く全都府県 【県内分布】全域 【形態・生態】TL♀0.7-1mm♂0.6-0.8mm,マツノマダラカミキリにより媒介,マツの木部に寄生,全身的な衰弱・枯損を起こす,草食,環境:陸域 【繁殖】卵生,場所:マツ木部,時期:通年 【国内侵入】250造船用輸入木材に寄生:1905年長崎県 【県内侵入】250枯損木の移動:1948年(君津市) 【影響】330(防風林マツ) 【緊急】- 【対策】薬剤防除 抵抗性マツ系統の導入,薬剤防除 【備考】- 【文献全般】136,372 【文献県内】37

軟体動物	ヤマタニシ科	国内外来生物	影響度	緊急度
950	ヤマククルマ <i>Spirostomajaponicum japonicum</i>		D	C

【原産】西日本 【国内分布】近畿地方以西の西日本 【県内分布】館山市. おそらく定着,海岸で打上げられた個体を確認 【形態・生態】環境:陸域:林縁,食性:主に落葉等 【繁殖】体内受精(卵生/直達発生)後,産卵し、孵化後、幼貝から成貝に成長,場所:成体と同じ,時期:春から秋? 【国内侵入】在来:- 【県内侵入】220(観葉植物等に伴って県内に持ち込まれ、繁殖している):平成時代 【影響】230(広東住血線虫の中間宿主の可能性) 【緊急】現段階では危険性は少ない 【対策】苗木等の移動時のチェック 【備考】標本CBM 【文献全般】東(1995) 【文献県内】-