

別添1

一般用漢方製剤承認基準

厚生労働省医薬食品局
平成23年4月15日

旧処方 新処方
番号 番号 処方名

- 1 1 安中散
 [成分・分量] 桂皮3-5、延胡索3-4、牡蛎3-4、茴香1.5-2、縮砂1-2、甘草1-2、良姜0.5-1
 [用法・用量] (1) 散: 1回1-2g 1日2-3回
 (2) 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛があつて、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症:
 神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱
- 2 2 安中散加茯苓
 [成分・分量] 桂皮3-5、延胡索3-4、牡蛎3-4、茴香1.5-2、縮砂1-2、甘草1-2、良姜0.5-1、茯苓5
 [用法・用量] (1) 散: 1回1-2g 1日2-3回
 (2) 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、腹部は力がなくて、神経過敏で胃痛又は腹痛があつて、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症:
 神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱
- 3 3 胃風湯
 [成分・分量] 当帰2.5-3、芍薬3、川芎2.5-3、人参3、白朮3、茯苓3-4、桂皮2-3、粟2-4
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、顔色悪くて食欲なく、疲れやすいものの次の諸症:
 急・慢性胃腸炎、冷えによる下痢
- 4 4 胃苓湯
 [成分・分量] 蒼朮2.5-3、厚朴2.5-3、陳皮2.5-3、猪苓2.5-3、沢瀉2.5-3、芍薬2.5-3、白朮2.5-3、茯苓2.5-3、桂皮2-2.5、大棗1-3、生姜1-2、甘草1-2、縮砂2、黃連2 (芍薬、縮砂、黃連のない場合も可)
 [用法・用量] (1) 散: 1回1-2g 1日3回
 (2) 湯
 [効能・効果] 体力中等度で、水様性の下痢、嘔吐があり、口渴、尿量減少を伴うものの次の諸症:
 食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

- 5 5 茵陳蒿湯
- 〔成分・分量〕 茵陳蒿4-14、山梔子1.4-5、大黃1-3
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、口渴があり、尿量少なく、便秘するものの次の諸症：じんましん、口内炎、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
- 6 6 茵陳五苓散
- 〔成分・分量〕 沢瀉4.5-6、茯苓3-4.5、猪苓3-4.5、蒼朮3-4.5(白朮も可)、桂皮2-3、茵陳蒿3-4
- 〔用法・用量〕 (1) 散・散の場合は茵陳五苓散のうち茵陳蒿を除いた他の生薬を湯の場合の1/8量を用いるか、茵陳五苓散のうち茵陳蒿を除いた他の生薬の合計が茵陳蒿の半量となるように用いる。(1回1-2g 1日3回)
(2) 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上をめやすとして、のどが渴いて、尿量が少ないものの次の諸症：嘔吐、じんましん、二日酔、むくみ
- 7 烏藥順氣散
- 〔成分・分量〕 麻黃2.5-3、陳皮2.5-5、烏藥2.5-5、川芎2-3、白僵蚕1.5-2.5、枳殼1.5-3、白芷1.5-3、甘草1-1.5、桔梗2-3、乾姜1-2.5、生姜1、大棗1-3 (生姜・大棗を抜いて也可)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：しびれ、筋力の低下、四肢の痛み、肩こり
- 7 8 溫經湯
- 〔成分・分量〕 半夏3-5、麥門冬3-10、當帰2-3、川芎2、芍藥2、人参2、桂皮2、阿膠2、牡丹皮2、甘草2、生姜1、吳茱萸1-3
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症：月經不順、月經困難、こしけ(おりもの)、更年期障害、不眠、神經症、湿疹・皮膚炎、足腰の冷え、しもやけ、手あれ(手の湿疹・皮膚炎)

- 8 9 溫清飲
〔成分・分量〕
当帰3-4、地黄3-4、芍藥3-4、川芎3-4、黃連1-2、黃芩1.5-3、山梔子1.5-2、黃柏1-1.5
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度で、皮膚はかさかさして色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症：
月経不順、月経困難、血の道症^{注)}、更年期障害、神經症、湿疹・皮膚炎
《備考》
注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神經症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 9 10 溫胆湯
〔成分・分量〕
半夏4-6、茯苓4-6、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3)、陳皮2-3、竹茹2-3、枳実1-2、甘草1-2、黃連1、酸棗仁1-3、大棗2 (黃連以降のない場合も可)
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症：
不眠症、神經症
- 11 越婢加朮湯
〔成分・分量〕
麻黃4-6、石膏8-10、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、大棗3-5、甘草1.5-2、白朮3-4(蒼朮も可)
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以上で、むくみがあり、のどが渴き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症：
むくみ、関節のはれや痛み、関節炎、湿疹・皮膚炎、夜尿症、目のかゆみ・痛み
- 12 越婢加朮附湯
〔成分・分量〕
麻黃4-6、石膏8-10、白朮3-4(蒼朮も可)、加工ブシ0.3-1、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、甘草1.5-2、大棗3-4
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以上で、冷えがあって、むくみがあり、のどが渴き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症：
むくみ、関節のはれや痛み、筋肉痛、湿疹・皮膚炎、夜尿症、目のかゆみ・痛み

- 10 13 延年半夏湯
 [成分・分量] 半夏3-5、柴胡2-5、別甲2-5、桔梗2-4、檳榔子2-4、人参0.8-2、生姜1-2、枳実0.5-2、吳茱萸0.5-2
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度で、みぞおちに抵抗感があって、肩がこり、足が冷えるものの次の諸症:
 慢性胃炎、胃痛、食欲不振
- 11 14 黃耆桂枝五物湯
 [成分・分量] 黃耆3、芍薬3、桂皮3、生姜1.5-2(ヒネショウガを使用する場合5-6)、大棗3-4
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症:
 身体や四肢のしびれ、顔面・口腔内のしびれ、湿疹・皮膚炎
- 12 15 黃耆建中湯
 [成分・分量] 桂皮3-4、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3-4)、大棗3-4、芍薬6、甘草2-3、黃耆1.5-4、膠飴20(膠飴はなくても可)
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症:
 虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、皮膚のただれ、腹痛、冷え症
- 13 16 黃芩湯
 [成分・分量] 黃芩4-9、芍薬2-8、甘草2-6、大棗4-9
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度で、腹痛、みぞおちのつかえがあり、ときにさむけ、発熱などがあるものの次の諸症:
 下痢、胃腸炎
- 14 17 応鐘散(芎黃散)
 [成分・分量] 大黃1、川芎2
 [用法・用量] (1)散:1回に頓用する。
 (2)湯:上記量を1日量
 [効能・効果] 体力中等度以上のものの次の諸症:
 便秘、便秘に伴うのぼせ・肩こり

- 15 18 黄連阿膠湯
 [成分・分量] 黄連3-4、芍薬2-2.5、黃芩1-2、阿膠3、卵黃1個
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、冷えやすくのぼせ気味で胸苦しく不眠の傾向のあるものの次の諸症:
 鼻血、不眠症、かさかさした湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
- 16 19 黄連解毒湯
 [成分・分量] 黄連1.5-2、黃芩3、黃柏1.5-3、山梔子2-3
 [用法・用量] (1) 散: 1回1.5-2g 1日3回
 (2) 湯
 [効能・効果] 体力中等度以上で、のぼせぎみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症:
 鼻出血、不眠症、神經症、胃炎、二日酔、血の道症^{注)}、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎
 《備考》
 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神經症状および身体症状のことである。
 【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、(効能・効果に関連する注意)として記載する。】
- 17 20 黄連湯
 [成分・分量] 黄連3、甘草3、乾姜3、人参2-3、桂皮3、大棗3、半夏5-8
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度で、胃部の停滞感や重圧感、食欲不振があり、ときにはきけや嘔吐のあるものの次の諸症:
 胃痛、急性胃炎、二日酔、口内炎
- 18 21 乙字湯
 [成分・分量] 当帰4-6、柴胡4-6、黃芩3-4、甘草1.5-3、升麻1-2、大黃0.5-3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向のあるものの次の諸症:
 痔核(いぼ痔)、きれ痔、便秘、軽度の脱肛
- 19 22 乙字湯去大黃
 [成分・分量] 当帰4-6、柴胡4-6、黃芩3-4、甘草1.5-3、升麻1-2
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症:
 痔核(いぼ痔)、きれ痔、軽度の脱肛

- 23 解急蜀椒湯
 [成分・分量]
 蜀椒1-2、加工ブシ0.3-1、粳米7-8、乾姜1.5-4、半夏4-8、大棗3、甘草1-2、人参2-3、膠飴20(膠飴はなくとも可)
- [用法・用量]
 湯
- [効能・効果]
 体力中等度以下で、腹部が冷えて痛み、あるいは腹が張って、ときに嘔吐を伴うものの次の諸症:
 冷え腹、急性胃腸炎、腹痛
- 20 24 解勞散
 [成分・分量]
 茵薬4-6、柴胡4-6、土別甲2-4、枳実2-4、甘草1.5-3、茯苓2-3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、大棗2-3
- [用法・用量]
 湯
- [効能・効果]
 体力中等度又はやや虚弱で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに背中に痛みがあるものの次の諸症:
 慢性の発熱、腹痛、胃痛
- 21 25 化食養脾湯
 [成分・分量]
 人参4、白朮4、茯苓4、半夏4、陳皮2、大棗2、神曲2、麦芽2、山楂子2、縮砂1.5、生姜1、甘草1
- [用法・用量]
 湯
- [効能・効果]
 体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすいものの次の諸症:
 胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐
- 22 26 蕤香正氣散
 [成分・分量]
 白朮3、茯苓3-4、陳皮2-3、白芷1-4、藿香1-4、大棗1-3、甘草1-1.5、半夏3、厚朴2-3、桔梗1.5-3、蘇葉1-4、大腹皮1-4、生姜1
- [用法・用量]
 湯
- [効能・効果]
 体力中等度以下のものの次の諸症:
 感冒、暑さによる食欲不振、急性胃腸炎、下痢、全身倦怠
- 23 27 葛根黃連黃芩湯
 [成分・分量]
 葛根5-6、黃連3、黃芩3、甘草2
- [用法・用量]
 湯
- [効能・効果]
 体力中等度のものの次の諸症:
 下痢、急性胃腸炎、口内炎、舌炎、肩こり、不眠

- 24 28 葛根紅花湯
 [成分・分量] 葛根3、芍薬3、地黃3、黃連1.5、山梔子1.5、紅花1.5、大黃1、甘草1
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以上で、便秘傾向のものの次の諸症：
 あかはな(酒さ)、しみ
- 25 29 葛根湯
 [成分・分量] 葛根4-8、麻黃3-4、大棗3-4、桂皮2-3、芍薬2-3、甘草2、生姜1-1.5
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以上のものの次の諸症：
 感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み
- 26 30 葛根湯加川芎辛夷
 [成分・分量] 葛根4-8、麻黃3-4、大棗3-4、桂皮2-3、芍薬2-3、甘草2、生姜1-1.5、川芎2-3、辛夷2-3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 比較的体力があるものの次の諸症：
 鼻づまり、蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎
- 27 31 加味温胆湯
 [成分・分量] 半夏3.5-6、茯苓3-6、陳皮2-3、竹茹2-3、生姜1-2、枳実1-3、甘草1-2、遠志2-3、玄参2(五味子3に変えて可)、人参2-3、地黃2-3、酸棗仁1-5、大棗2、黃連1-2(黃連のない場合も可) (遠志、玄参、人参、地黃、大棗のない場合もある)
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症：
 神經症、不眠症
- 28 32 加味帰脾湯
 [成分・分量] 人参3、白朮3(蒼朮も可)、茯苓3、酸棗仁3、竜眼肉3、黃耆2-3、當帰2、遠志1-2、柴胡2.5-3、山梔子2-2.5、甘草1、木香1、大棗1-2、生姜1-1.5、牡丹皮2 (牡丹皮はなくても可)
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症：
 貧血、不眠症、精神不安、神經症

- 29 33 加味解毒湯
 【成分・分量】 黃連2、黃芩2、黃柏2、山梔子2、柴胡2、茵陳蒿2、竜胆2、木通2、滑石3、升麻1.5、甘草1.5、燈心草1.5、大黃1.5（大黃のない場合も可）
 【用法・用量】 湯
 【効能・効果】 比較的体力があり、血色がよいものの次の諸症：
 小便がしぶって出にくいもの、痔疾（いぼ痔、痔痛、痔出血）
- 30 34 加味四物湯
 【成分・分量】 当帰2.5-3、川芎2-3、芍薬2-3、地黃3-8、蒼朮3（白朮2.5も可）、麥門冬2.5-5、人參1.5-2.5、牛膝1-2.5、黃柏1.5-2.5、五味子1-1.5、黃連1.5、知母1-1.5、杜仲1.5-2
 【用法・用量】 湯
 【効能・効果】 体力虚弱で、血色がすぐれないものの次の諸症：
 下肢の筋力低下、神経痛、関節の腫れや痛み
- 31 35 加味逍遙散
 【成分・分量】 当帰3、芍薬3、白朮3（蒼朮も可）、茯苓3、柴胡3、牡丹皮2、山梔子2、甘草1.5-2、生姜1、薄荷葉1
 【用法・用量】 湯
 【効能・効果】 体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：
 冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症^{注)}、不眠症
 《備考》 注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
 【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】
- 32 36 加味逍遙散加川芎地黃（加味逍遙散合四物湯）
 【成分・分量】 当帰3-4、芍薬3-4、白朮3（蒼朮も可）、茯苓3、柴胡3、川芎3-4、地黃3-4、甘草1.5-2、牡丹皮2、山梔子2、生姜1-2、薄荷葉1
 【用法・用量】 湯
 【効能・効果】 体力中等度以下で、皮膚があれてかさかさし、ときに色つやが悪く、胃腸障害はなく、肩がこり、疲れやすく精神不安やいらだちなどの精神神経症状、とにかくゆみ、便秘の傾向のあるものの次の諸症：
 湿疹・皮膚炎・しみ、冷え症、虚弱体質、月經不順、月經困難、更年期障害、血の道症^{注)}
 《備考》 注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
 【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

- 33 37 加味平胃散
〔成分・分量〕 蒼朮4~6(白朮も可)、陳皮3~4.5、生姜0.5~1(ヒネショウガを使用する場合2~3)、神麹2~3、山査子2~3、厚朴3~4.5、甘草1~2、大棗2~3、麦芽2~3 (山査子はなくても可)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときに胸やけがあるものの次の諸症: 急・慢性胃炎、食欲不振、消化不良、胃腸虚弱、腹部膨満感
- 34 38 乾姜人参半夏丸
〔成分・分量〕 乾姜3、人参3、半夏6
〔用法・用量〕 (1)散:1回1.5~5g 1日3回
(2)湯:上記量を1日量とする。
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、はきけ・嘔吐が続きみぞおちのつかえを感じるもの次の諸症: つわり、胃炎、胃腸虚弱
- 39 39 甘草乾姜湯
〔成分・分量〕 甘草4~8、乾姜2~4
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、手足が冷え、薄い唾液が口に溜まるものの次の諸症: 頻尿、尿もれ、唾液分泌過多、鼻炎、しゃっくり、めまい
- 35 40 甘草瀉心湯
〔成分・分量〕 半夏5、黃芩2.5、乾姜2.5、人参2.5、甘草2.5~3.5、大棗2.5、黃連1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときにイライラ感、下痢、はきけ、腹が鳴るものの次の諸症: 胃腸炎、口内炎、口臭、不眠症、神経症、下痢
- 36 41 甘草湯
〔成分・分量〕 甘草2~8
〔用法・用量〕 (1)散:1回0.5g 1日2回
(2)湯:少しずつゆっくり飲む。
(3)外用:煎液で患部を温湿布する。
〔効能・効果〕 激しいせき、咽喉痛、口内炎、しわがれ声
外用:痔・脱肛の痛み
《備考》
注)体力に関わらず、使用できる。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 37 42 甘麦大棗湯
 [成分・分量] 甘草3-5、大棗2.5-6、小麦14-20
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、神経が過敏で、驚きやすく、ときにあくびが出るもの次の諸症:
 不眠症、小児の夜泣き、ひきつけ
- 43 甘露飲
 [成分・分量] 熟地黄2-3、乾地黄2-2.5、麦門冬2-3、枳実1-2.5、甘草2-2.5、茵陳蒿2-2.5、枇杷葉2-2.5、石斛2-2.5、黃芩2-3、天門冬2-3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症:
 口内炎、舌の荒れや痛み、歯周炎
- 38 44 帰耆建中湯
 [成分・分量] 当帰3-4、桂皮3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2-4)、大棗3-4、芍藥5-6、甘草2-3、黃耆2-4、膠飴20(膠飴はなくても可)
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症:
 虚弱体質、病後・術後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、化膿性皮膚疾患
- 39 45 桔梗湯
 [成分・分量] 桔梗1-4、甘草2-8
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきができるものの次の諸症:
 扁桃炎、扁桃周囲炎
- 40 46 枳縮二陳湯
 [成分・分量] 枳実1-3、縮砂1-3、半夏2-3、陳皮2-3、香附子2-3、木香1-2、草豆蔻1-2、乾姜1-2、厚朴1.5-2.5、茴香1-2.5、延胡索1.5-2.5、甘草1、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)、茯苓2-3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、胃腸が弱いものの次の諸症:
 悪心、嘔吐、胃痛、胃部不快感、胸痛

- 41 47 帰脾湯
 [成分・分量] 人参2-4、白朮2-4(蒼朮も可)、茯苓2-4、酸棗仁2-4、竜眼肉2-4、黃耆2-4、当帰2、遠志1-2、甘草1、木香1、大棗1-2、生姜1-1.5
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪いものの次の諸症:
 貧血、不眠症、神経症、精神不安
- 42 48 苓帰膠艾湯
 [成分・分量] 川芎3、甘草3、艾葉3、当帰4-4.5、芍藥4-4.5、地黃5-6、阿膠3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、冷え症で、出血傾向があり胃腸障害のないものの次の諸症:
 痔出血、貧血、月經異常・月經過多・不正出血、皮下出血
- 43 49 苓帰調血飲
 [成分・分量] 当帰2-2.5、地黃2-2.5、川芎2-2.5、白朮2-2.5(蒼朮も可)、茯苓2-2.5、陳皮2-2.5、烏藥2-2.5、大棗1-1.5、香附子2-2.5、甘草1、牡丹皮2-2.5、益母草1-1.5、乾姜1-1.5、生姜0.5-1.5(生姜はなくても可)
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。
 月經不順、産後の神經症・体力低下
- 44 50 苓帰調血飲第一加減
 [成分・分量] 当帰2、川芎2、地黃2、白朮2(蒼朮も可)、茯苓2、陳皮2、烏藥2、香附子2、牡丹皮2、益母草1.5、大棗1.5、甘草1、乾姜1-1.5、生姜0.5-1.5(生姜はなくても可)、芍藥1.5、桃仁1.5、紅花1.5、枳實1.5、桂皮1.5、牛膝1.5、木香1.5、延胡索1.5
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。
 血の道症^{注)}、月經不順、産後の体力低下
 《備考》
 注)血の道症とは、月經、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神經症状および身体症状のことである。
 【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 45 51 韶声破笛丸
 [成分・分量]
 連翹2.5、桔梗2.5、甘草2.5、大黃1、縮砂1、川芎1、訶子1、阿仙葉2、薄荷葉4
 (大黃のない場合も可)
- [用法・用量]
 (1)散:1回2-3g 1日数回
 (2)湯
- [効能・効果]
 しわがれ声、咽喉不快
- 《備考》
 注)体力に関わらず、使用できる。
 【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 46 52 杏蘇散
 [成分・分量]
 蘇葉3、五味子2、大腹皮2、烏梅2、杏仁2、陳皮1-1.5、桔梗1-1.5、麻黃1-1.5、桑白皮1-1.5、阿膠1-1.5、甘草1-1.5、紫苑1
- [用法・用量]
 湯(原則として)
- [効能・効果]
 体力中等度以下で、気分がすぐれず、汗がなく、ときに顔がむくむものの次の諸症:
 せき、たん、気管支炎
- 47 53 苦参湯
 [成分・分量]
 苦参6-10
- [用法・用量]
 水500-600mLで煮て250-300mLとし外用する。
- [効能・効果]
 ただれ、あせも、かゆみ
- 48 54 駆風解毒散(湯)
 [成分・分量]
 防風3-5、牛蒡子3、連翹5、荊芥1.5、羌活1.5、甘草1.5、桔梗3、石膏5-10
- [用法・用量]
 湯(本処方は熱ければ冷ましてうがいしながら少しづつゆっくり飲む)
- [効能・効果]
 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症:
 扁桃炎、扁桃周囲炎
- 55 九味欒榔湯
 [成分・分量]
 欒榔子4、厚朴3、桂皮3、橘皮3、蘇葉1-2、甘草1、大黃0.5-1、木香1、生姜1(ヒニショウガを使用する場合3) (大黃を去り、吳茱萸1、茯苓3を加えても可)
- [用法・用量]
 湯
- [効能・効果]
 体力中等度以上で、全身倦怠感があり、とくに下肢の倦怠感が著しいものの次の諸症:
 疲労倦怠感、更年期障害、動悸、息切れ、むくみ、神経症、胃腸炎、関節のはれや痛み

- 49 56 荊芥連翹湯
 [成分・分量] 当帰1.5、芍薬1.5、川芎1.5、地黃1.5、黃連1.5、黃芩1.5、黃柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、荊芥1.5、防風1.5、薄荷葉1.5、枳殼(実)1.5、甘草1-1.5、白芷1.5-2.5、桔梗1.5-2.5、柴胡1.5-2.5(地黃、黃連、黃柏、薄荷葉のない場合も可)
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症:
 蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび
- 50 57 鷄肝丸
 [成分・分量] 鷄肝1具
 鷄肝1具をとりゆでて乾燥し、山茱萸末(鷄肝の乾燥した量の2-3倍量をめやすとする。)を和しつつ細末とし糊丸とする。
 [用法・用量] 丸:1回2g 1日3回
 [効能・効果] 体力虚弱なものの次の症状:
 虚弱体质
- 58 桂姜棗草黃辛附湯
 [成分・分量] 桂皮3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、甘草2、大棗3-3.5、麻黃2、細辛2、加工ブシ0.3-1
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、さむけを訴えるものの次の諸症:
 感冒、気管支炎、関節のはれや痛み、水様性鼻汁を伴う鼻炎、神経痛、腰痛、冷え症
- 59 桂枝越婢湯
 [成分・分量] 桂皮4、芍薬4、甘草2、麻黃5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2.5)、大棗3、石膏8、蒼朮4、加工ブシ1
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下のものの次の諸症:
 関節のはれや痛み
- 52 60 桂枝加黃耆湯
 [成分・分量] 桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、黃耆2-3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力虚弱なものの次の諸症:
 ねあせ、あせも、湿疹・皮膚炎

- 53 61 桂枝加葛根湯
 【成分・分量】 桂皮2.4-4、芍薬2.4-4、大棗2.4-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2.4-4)、甘草1.6-2、葛根3.2-6
 【用法・用量】 湯
 【効能・効果】 体力中等度以下で、汗が出て、肩こりや頭痛のあるものの次の症状:
 かぜの初期
- 54 62 桂枝加厚朴杏仁湯
 【成分・分量】 桂皮2.4-4、芍薬2.4-4、大棗2.4-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草1.6-2、厚朴1-4、杏仁1.6-4
 【用法・用量】 湯
 【効能・効果】 体力虚弱なものの次の諸症:
 せき、気管支炎、気管支ぜんそく
- 55 63 桂枝加芍薬生姜人参湯
 【成分・分量】 桂皮2.4-4、大棗2.4-4、芍薬3.2-6、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合4-5.5)、甘草1.6-2、人参2.4-4.5
 【用法・用量】 湯
 【効能・効果】 体力虚弱なものの次の諸症:
 みぞおちのつかえ、腹痛、手足の痛み
- 56 64 桂枝加芍薬大黃湯
 【成分・分量】 桂皮3-4、芍薬4-6、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、大黃1-2
 【用法・用量】 湯
 【効能・効果】 体力中等度以下で、腹部膨満感、腹痛があり、便秘するものの次の諸症:
 便秘、しづり腹^{注)}
 《備考》 注)しづり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものである。
 【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】
- 57 65 桂枝加芍薬湯
 【成分・分量】 桂皮3-4、芍薬6、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2
 【用法・用量】 湯
 【効能・効果】 体力中等度以下で、腹部膨満感のあるものの次の諸症:
 しづり腹^{注)}、腹痛、下痢、便秘
 《備考》 注)しづり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものである。
 【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】

- 58 66 桂枝加朮附湯
 [成分・分量] 桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、蒼朮3-4(白朮も可)、加工ブシ0.5-1
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力虛弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症:
 関節痛、神經痛
- 59 67 桂枝加竜骨牡蠣湯
 [成分・分量] 桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、竜骨3、牡蠣3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、疲れやすく、神經過敏で、興奮しやすいものの次の諸症:
 神經質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神經症
- 60 68 桂枝加蒆朮附湯
 [成分・分量] 桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、蒼朮3-4(白朮も可)、加工ブシ0.5-1、茯苓4
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力虛弱で、手足が冷えてこわばり、尿量が少なく、ときに動悸、めまい、筋肉のびくつきがあるものの次の諸症:
 関節痛、神經痛
- 69 桂枝芍薬知母湯
 [成分・分量] 桂皮3-4、芍薬3-4、甘草1.5-2、麻黃2-3、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3-5)、白朮4-5(蒼朮も可)、知母2-4、防風3-4、加工ブシ0.3-1
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力虛弱で、皮膚が乾燥し、四肢あるいは諸関節のはれが慢性に経過して、痛むものの次の諸症:
 関節のはれや痛み、関節炎、神經痛
- 51 70 桂枝湯
 [成分・分量] 桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力虛弱で、汗が出るものの次の症状:
 かぜの初期

- 71 桂枝二越婢一湯
- 〔成分・分量〕 桂皮2.5-3.5、芍薬2.5-3.5、麻黃2.5-3.5、甘草2.5-3.5、大棗3-4、石膏3-8、生姜1
(ヒネショウガを使用する場合2.8-3.5)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、のどが渴き、汗が出るもの次の諸症:
感冒、頭痛、腰痛、筋肉痛、関節のはれや痛み
- 72 桂枝二越婢一湯加朮附
- 〔成分・分量〕 桂皮2.5、芍薬2.5、甘草2.5、麻黃2.5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3.5)、大棗3、石膏3、白朮3(蒼朮も可)、加工ブシ0.5-1
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、冷えがあつて、のどが渴き、汗が出て、ときに尿量が減少するものの次の諸症:
関節のはれや痛み、筋肉痛、腰痛、頭痛
- 61 73 桂枝人参湯
- 〔成分・分量〕 桂皮4、甘草3-4、人参3、乾姜2-3、白朮3(蒼朮も可)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱く、ときに発熱・悪寒を伴うものの次の諸症:
頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃腸虚弱、下痢、消化器症状を伴う感冒
- 62 74 桂枝茯苓丸
- 〔成分・分量〕 桂皮3-4、茯苓4、牡丹皮3-4、桃仁4、芍薬4
- 〔用法・用量〕 (1)散:1回2-3g 1日3回
(2)湯
- 〔効能・効果〕 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症:
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症^{注)}、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび
- 〔備考〕 注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 63 75 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
 [成分・分量] 桂皮3-4、茯苓4、牡丹皮3-4、桃仁4、芍藥4、薏苡仁10-20
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症:
 にきび、しみ、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎)、月経不順、血の道症注)
 《備考》 注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
 【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 64 76 啓脾湯
 [成分・分量] 人参3、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、蓮肉3、山茱萸3、山楂子2、陳皮2、沢瀉2、大棗1、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、甘草1 (大棗、生姜はなくても可)
 [用法・用量] (1) 散: 1回1-2g 1日3回
 (2) 湯
 [効能・効果] 体力虚弱で、痩せて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症:
 胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢
- 65 77 荊防敗毒散
 [成分・分量] 荊芥1.5-2、防風1.5-2、羌活1.5-2、獨活1.5-2、柴胡1.5-2、薄荷葉1.5-2、連翹1.5-2、桔梗1.5-2、枳殼(又は枳実)1.5-2、川芎1.5-2、前胡1.5-2、金銀花1.5-2、甘草1-1.5、生姜1
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 比較的体力があるものの次の諸症:
 急性化膿性皮膚疾患の初期、湿疹・皮膚炎
- 66 78 桂麻各半湯
 [成分・分量] 桂皮3.5、芍藥2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2)、甘草2、麻黃2、大棗2、杏仁2.5
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症:
 感冒、せき、かゆみ
- 67 79 鷄鳴散加茯苓
 [成分・分量] 檳榔子3-4、木瓜3、橘皮2-3、桔梗2-3、茯苓4-6、吳茱萸1-1.5、蘇葉1-2、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度のものの次の諸症:
 下肢の倦怠感、ふくらはぎの緊張・圧痛

- 68 80 堅中湯
- 〔成分・分量〕 半夏5、茯苓5、桂皮4、大棗3、芍藥3、乾姜3(生姜1でも可)、甘草1-1.5
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、ときに胃部に水がたまる感じのするものの次の諸症:
慢性胃炎、腹痛
- 69 81 甲子湯
- 〔成分・分量〕 桂皮3-4、茯苓3-4、牡丹皮3-4、桃仁3-4、芍藥3-4、甘草1.5、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症:
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症^{注)}、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ
- 《備考》 注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関する注意〉として記載する。】
- 70 82 香砂平胃散
- 〔成分・分量〕 蒼朮4-6(白朮も可)、厚朴3-4.5、陳皮3-4.5、甘草1-1.5、縮砂1.5-2、香附子2-4、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、大棗2-3、藿香1(藿香はなくても可)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、食べ過ぎて胃がもたれる傾向のあるものの次の諸症:
食欲異常、食欲不振、急・慢性胃炎、消化不良
- 71 83 香砂養胃湯
- 〔成分・分量〕 白朮2.5-3、茯苓2.5-3、蒼朮2、厚朴2-2.5、陳皮2-2.5、香附子2-2.5、白豆蔻2(小豆蔻代用可)、人参1.5-2、木香1.5、縮砂1.5-2.5、甘草1.5-2.5、大棗1.5-2.5、生姜0.7-1
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱ものの次の諸症:
胃弱、胃腸虚弱、慢性胃腸炎、食欲不振