

- 157 180 竹茹温胆湯
〔成分・分量〕 柴胡3-6、竹茹3、茯苓3、麦門冬3-4、陳皮2-3、枳実1-3、黄連1-4.5、甘草1、半夏3-5、香附子2-2.5、生姜1、桔梗2-3、人参1-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：
かぜ、インフルエンザ、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、また平熱になっても、気分がさっぱりせず、せきやたんが多くて安眠が出来ないもの
- 158 181 竹葉石膏湯
〔成分・分量〕 竹葉1.2-2、石膏4.8-16、半夏1.6-8、麦門冬3.4-12、人参0.8-3、甘草0.6-2、粳米2-8.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、かぜが治りきらず、たんが切れにくく、ときに熱感、強いせきこみ、口が渇くものの次の諸症：
からせき、気管支炎、気管支ぜんそく、口渇、軽い熱中症
- 159 182 治打撲一方
〔成分・分量〕 川芎3、樸椒(又は桜皮)3、川骨3、桂皮3、甘草1.5、丁子1-1.5、大黄1-1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、はれ、痛みがあるものの次の諸症：
打撲、捻挫
- 160 183 治頭瘡一方
〔成分・分量〕 連翹3-4、蒼朮3-4、川芎3、防風2-3、忍冬2-3、荊芥1-4、甘草0.5-1.5、紅花0.5-2、大黄0.5-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上のものの顔面、頭部などの皮膚疾患で、ときにかゆみ、分泌物などがあるものの次の諸症：
湿疹・皮膚炎、乳幼児の湿疹・皮膚炎
- 161 184 治頭瘡一方去大黄
〔成分・分量〕 連翹3、蒼朮3、川芎3、防風2、忍冬2、荊芥1、甘草1、紅花1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、下痢傾向があるものの顔面、頭部などの皮膚疾患で、ときにかゆみ、分泌物などがあるものの次の諸症：
湿疹・皮膚炎、乳幼児の湿疹・皮膚炎

- 162 185 知柏地黄丸
〔成分・分量〕 地黄8、山茱萸4、山薬4、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3、知母3、黄柏3
〔用法・用量〕 (1)散:1回2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、口渴があるものの次の諸症:
顔や四肢のほてり、排尿困難、頻尿、むくみ
- 163 186 中黄膏
〔成分・分量〕 ゴマ油1,000mL、黄蠟380、麝金40、黄柏20
〔用法・用量〕 外用
〔効能・効果〕 急性化膿性皮膚疾患(はれもの)の初期、うち身、捻挫
- 164 187 中建中湯
〔成分・分量〕 桂皮4、芍薬6、甘草2、大棗4、山椒2、乾姜1、人参3、(膠飴20を加えることもある)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、腹痛を伴うものの次の諸症:
慢性胃腸炎、下痢、便秘
- 165 188 調胃承気湯
〔成分・分量〕 大黄2-6.4、芒硝1-6.5、甘草1-3.2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度なものの次の諸症:
便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満、腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和
- 166 189 丁香柿蒂湯
〔成分・分量〕 柿蒂3、桂皮3、半夏3、陳皮3、丁子1、良姜1、木香1、沈香1、茴香1、藿香1、厚朴1、縮砂1、甘草1、乳香1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下のものの次の諸症:
しゃっくり、胃腸虚弱

- 167 190 釣藤散
〔成分・分量〕 釣藤鈎3、橘皮3(陳皮も可)、半夏3、麦門冬3、茯苓3、人参2-3、防風2-3、菊花2-3、甘草1、生姜1、石膏5-7
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの次の諸症：
慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるもの
- 168 191 猪苓湯
〔成分・分量〕 猪苓3-5、茯苓3-5、滑石3-5、沢瀉3-5、阿膠3-5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症：
排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ
- 169 192 猪苓湯合四物湯
〔成分・分量〕 当歸3、芍薬3、川芎3、地黄3、猪苓3、茯苓3、滑石3、沢瀉3、阿膠3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、皮膚が乾燥し、色つやが悪く、胃腸障害のない人で、排尿異常があり口が渇くものの次の諸症：
排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿
- 170 193 通導散
〔成分・分量〕 当歸3、大黄3、芒硝3-4、枳実(枳殻でも可)2-3、厚朴2、陳皮2、木通2、紅花2-3、蘇木2、甘草2-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症：
月経不順、月経痛、更年期障害、腰痛、便秘、打ち身(打撲)、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)
- 171 194 定悸飲
〔成分・分量〕 李根皮2、甘草1.5-2、茯苓4-6、牡蛎3、桂皮3、白朮2-3(蒼朮も可)、呉茱萸1.5-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、ときにめまい、ふらつき、のぼせがあるものの次の諸症：
動悸、不安神経症

- 172 195 桃核承気湯
〔成分・分量〕 桃仁5、桂皮4、大黄3、芒硝2、甘草1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：
月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血
圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)、痔疾、打撲症
- 173 196 当帰飲子
〔成分・分量〕 当帰5、芍薬3、川芎3、蒺藜子3、防風3、地黄4、荆芥1.5、黄耆1.5、何首烏2、甘
草1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、冷え症で、皮膚が乾燥するものの次の諸症：
湿疹・皮膚炎(分泌物の少ないもの)、かゆみ
- 174 197 当帰建中湯
〔成分・分量〕 当帰4、桂皮3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合4)、大棗3-4、芍薬5-
7.5、甘草2-2.5、膠飴20(膠飴はなくても可)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、疲労しやすく血色のすぐれないものの次の諸症：
月経痛、月経困難症、月経不順、腹痛、下腹部痛、腰痛、痔、脱肛の痛み、病後
術後の体力低下
- 175 198 当帰散
〔成分・分量〕 当帰2-3、芍薬2-3、川芎2-3、黄芩2-3、白朮1-1.5(蒼朮も可)
〔用法・用量〕 (1)散:1回1-2g,1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下のものの次の諸症：
産前産後の障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)
- 177 199 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
〔成分・分量〕 当帰3-4、桂皮3-4、芍薬3-4、木通1.5-3、細辛2-3、甘草1.5-2、大棗4-6.5、呉茱
萸1-6、生姜0.5-2(ヒネショウガを使用する場合4-8)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足の冷えを感じ、下肢の冷えが強く、下肢又は下腹部が
痛くなりやすいものの次の諸症：
冷え症、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛

- 176 200 当帰四逆湯
〔成分・分量〕
当帰1.8-4、桂皮1.8-4、芍薬1.8-4、木通2-3、大棗1.8-6.5、細辛1.8-3、甘草1.2-2.5
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下で、手足が冷えて下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：
しもやけ、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛、冷え症
- 178 201 当帰芍薬散
〔成分・分量〕
当帰3-3.9、川芎3、芍薬4-16、茯苓4-5、白朮4-5(蒼朮も可)、沢瀉4-12
〔用法・用量〕
(1)散：1回1-2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り
- 179 202 当帰芍薬散加黄耆釣藤
〔成分・分量〕
当帰3、沢瀉4、川芎3、芍薬4、茯苓4、蒼朮4(白朮も可)、黄耆3、釣藤鈎4
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で血圧が高く、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：
高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重)
- 180 203 当帰芍薬散加人参
〔成分・分量〕
当帰3.5、沢瀉3.5、川芎3、芍薬4、茯苓3.5、白朮3(蒼朮も可)、人参1-2
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で胃腸が弱く、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

- 181 204 当帰芍薬散加附子
〔成分・分量〕
当帰3、沢瀉4、川芎3、加エブシ0.4、芍薬4、茯苓4、白朮4(蒼朮も可)
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で、冷えが強く、貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などがあるものの次の諸症：
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り
- 182 205 当帰湯
〔成分・分量〕
当帰5、半夏5、芍薬3、厚朴3、桂皮3、人参3、乾姜1.5、黄耆1.5、山椒1.5、甘草1
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下で、背中に冷感があり、腹部膨満感や腹痛・胸背部痛のあるものの次の諸症：
胸痛、腹痛、胃炎
- 183 206 当帰貝母苦参丸料
〔成分・分量〕
当帰3、貝母3、苦参3
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下のものの次の諸症：
小便がしぶって出にくいもの、排尿困難
- 184 207 独活葛根湯
〔成分・分量〕
葛根5、桂皮3、芍薬3、麻黄2、独活2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)、地黄4、大棗1-2、甘草1-2
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：
四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり
- 185 208 独活湯
〔成分・分量〕
独活2、羌活2、防風2、桂皮2、大黄2、沢瀉2、当帰3、桃仁3、連翹3、防已5、黄柏5、甘草1.5
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度なものの次の諸症：
腰痛、手足の屈伸痛

- 186 209 二朮湯
〔成分・分量〕
白朮1.5-2.5、茯苓1.5-2.5、陳皮1.5-2.5、天南星1.5-2.5、香附子1.5-2.5、黄芩1.5-2.5、威靈仙1.5-2.5、羌活1.5-2.5、半夏2-4、蒼朮1.5-3、甘草1-1.5、生姜0.6-1
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度で、肩や土腕などに痛みがあるものの次の諸症：
四十肩、五十肩
- 187 210 二陳湯
〔成分・分量〕
半夏5-7、茯苓3.5-5、陳皮3.5-4、生姜1-1.5(ヒネシヨウガを使用する場合2-3)、甘草1-2
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度で、悪心、嘔吐があるものの次の諸症：
悪心、嘔吐、胃部不快感、慢性胃炎、二日酔
- 188 211 女神散(安栄湯)
〔成分・分量〕
当帰3-4、川芎3、白朮3(蒼朮も可)、香附子3-4、桂皮2-3、黄芩2-4、人参1.5-2、檳榔子2-4、黄連1-2、木香1-2、丁子0.5-1、甘草1-1.5、大黃0.5-1(大黃はなくても可)
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以上で、のぼせとめまいのあるものの次の諸症：
産前産後の神経症、月経不順、血の道症^{注)}、更年期障害、神経症
《備考》
注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注)表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 189 212 人参湯(理中丸)
〔成分・分量〕
人参3、甘草3、白朮3(蒼朮も可)、乾姜2-3
〔用法・用量〕
(1)散:1回2-3g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で、疲れやすく手足などが冷えやすいものの次の諸症：
胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎
- 190 213 人参養栄湯
〔成分・分量〕
人参3、当帰4、芍薬2-4、地黄4、白朮4(蒼朮も可)、茯苓4、桂皮2-2.5、黄耆1.5-2.5、陳皮(橘皮も可)2-2.5、遠志1-2、五味子1-1.5、甘草1-1.5
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力虚弱なものの次の諸症：
病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

- 191 214 排膿散
〔成分・分量〕 枳実3-10、芍薬3-6、桔梗1.5-2、卵黄1個(卵黄はない場合も可)
〔用法・用量〕 (1)散:1回1.5-4g 1日1-2回
(2)湯(卵黄ははぶくのが普通)
生薬を細末とし1回量2-3gに卵黄を加えて、よく攪拌し白湯にて服す。1日1-2回頓服として用いる。
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症:
化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎
《備考》 排膿散の湯液剤は排膿湯の処方と区別するため排膿散料と称する。
- 192 215 排膿散及湯
〔成分・分量〕 桔梗3-4、甘草3、大棗3-6、芍薬3、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、枳実2-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎
《備考》 注)体力に関わらず、使用できる。
【注)表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 193 216 排膿湯
〔成分・分量〕 甘草1.5-3、桔梗1.5-5、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-3)、大棗2.5-6
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、患部が化膿するものの次の諸症:
化膿性皮膚疾患・歯肉炎・扁桃炎の初期または軽いもの
- 194 217 麦門冬湯
〔成分・分量〕 麦門冬8-10、半夏5、粳米5-10、大棗2-3、人参2、甘草2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症:
からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声
- 196 218 八解散
〔成分・分量〕 半夏3、茯苓3、陳皮3、大棗2、甘草2、厚朴6、人参3、藿香3、白朮3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症:
発熱、下痢、嘔吐、食欲不振のいずれかを伴う感冒

- 195 219 八味地黄丸
〔成分・分量〕 地黄5、6-8、山茱萸3、3-4、山藥3、3-4、沢瀉3、3、茯苓3、3、牡丹皮3、3、桂皮1、1、加工ブシ0.5-1、0.5-1(左側の数字は湯、右側は散)
〔用法・用量〕 (1)散:1回2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症:
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ
- 197 220 半夏厚朴湯
〔成分・分量〕 半夏6-8、茯苓5、厚朴3、蘇葉2-3、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合2-4)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症:
不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感
- 198 221 半夏瀉心湯
〔成分・分量〕 半夏4-6、黄芩2.5-3、乾姜2-3、人参2.5-3、甘草2.5-3、大棗2.5-3、黄連1
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症:
急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症
- 199 222 半夏白朮天麻湯
〔成分・分量〕 半夏3、白朮1.5-3、陳皮3、茯苓3、麦芽1.5-2、天麻2、生姜0.5-2(ヒネショウガを使用する場合2-4)、神麴1.5-2、黄耆1.5-2、人参1.5-2、沢瀉1.5-2、黄柏1、乾姜0.5-1(神麴のない場合も可)(蒼朮2-3を加えても可)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症:
頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症(副鼻腔炎)
- 201 223 白虎加桂枝湯
〔成分・分量〕 知母5-6、粳米8-10、石膏15-16、甘草2、桂皮3-4
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、熱感、口渴、のぼせがあるものの次の諸症:
のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

- 202 224 白虎加人参湯
〔成分・分量〕 知母5-6、石膏15-16、甘草2、粳米8-20、人参1.5-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、熱感と口渴が強いものの次の諸症：
のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
- 200 225 白虎湯
〔成分・分量〕 知母5-6、粳米8-10、石膏15-16、甘草2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、熱感、口渴があるものの次の諸症：
のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
- 203 226 不換金正気散
〔成分・分量〕 蒼朮4(白朮も可)、厚朴3、陳皮3、大棗1-3、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、半夏6、甘草1.5、藿香1-1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときにはきけがあるものの次の諸症：
急・慢性胃炎、胃腸虚弱、消化不良、食欲不振、消化器症状のある感冒
- 204 227 伏竜肝湯
〔成分・分量〕 伏竜肝4-10、ヒネショウガ5-8(生姜を使用する場合1.5-3)、半夏6-8、茯苓3-5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 つわり、悪心、嘔吐
《備考》
注)体力に関わらず、使用できる。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 205 228 茯苓飲
〔成分・分量〕 茯苓2.4-5、白朮2.4-4(蒼朮も可)、人参2.4-3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、陳皮2.5-3、枳実1-2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症：
胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ

- 206 229 茯苓飲加半夏
〔成分・分量〕 茯苓5、白朮4(蒼朮も可)、人參3、生姜1-1.5(ヒネシヨウガを使用する場合3-4)、
陳皮3、枳実1.5、半夏4
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、はきけや胸やけが強く、上腹部膨満感があり尿量減少する
ものの次の諸症：
胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ
- 207 230 茯苓飲合半夏厚朴湯
〔成分・分量〕 茯苓4-6、白朮3-4(蒼朮も可)、人參3、生姜1-1.5(ヒネシヨウガを使用する場合4-
5)、陳皮3、枳実1.5-2、半夏6-10、厚朴3、蘇葉2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、気分がふさいで咽喉食道部に異物感があり、ときに動悸、め
まい、嘔気、胸やけ、上腹部膨満感などがあり、尿量減少するものの次の諸症：
不安神経症、神経性胃炎、つわり、胸やけ、胃炎、しわがれ声、のどのつかえ感
- 231 茯苓四逆湯
〔成分・分量〕 茯苓4-4.8、甘草2-3、乾姜1.5-3、人參1-3、加工ブシ0.3-1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱あるいは体力が消耗し、手足が冷えるものの次の諸症：
倦怠感、急・慢性胃腸炎、下痢、はきけ、尿量減少
- 208 232 茯苓沢瀉湯
〔成分・分量〕 茯苓4-8、沢瀉2.4-4、白朮1.8-3(蒼朮も可)、桂皮1.2-2、生姜1-1.5(ヒネシヨウガ
を使用する場合2.4-4)、甘草1-1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、胃のもたれ、悪心、嘔吐のいずれかがあり、渴きを覚えるも
のの次の諸症：
胃炎、胃腸虚弱
- 209 233 附子理中湯
〔成分・分量〕 人參3、加工ブシ0.5-1、乾姜2-3、甘草2-3、白朮3(蒼朮も可)
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力虚弱で、手足の冷えが強く、疲れやすいものの次の諸症：
胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎

- 210 234 分消湯(実脾飲)
〔成分・分量〕 白朮2.5-3、蒼朮2.5-3、茯苓2.5-3、陳皮2-3、厚朴2-3、香附子2-2.5、猪苓2-2.5、沢瀉2-2.5、枳実(枳殼)1-3、大腹皮1-2.5、縮砂1-2、木香1、生姜1、燈心草1-2 (但し、枳殼を用いる場合は実脾飲とする)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、尿量が少なく、ときにみぞおちがつかえて便秘の傾向のあるものの次の諸症:
むくみ、排尿困難、腹部膨満感
- 211 235 平胃散
〔成分・分量〕 蒼朮4-6(白朮も可)、厚朴3-4.5、陳皮3-4.5、大棗2-3、甘草1-1.5、生姜0.5-1
- 〔用法・用量〕 原則として湯
(1)散:1回2g 1日3回
(2)湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、胃がもたれて消化が悪く、ときにはきけ、食後に腹が鳴って下痢の傾向のあるものの次の諸症:
食べ過ぎによる胃のもたれ、急・慢性胃炎、消化不良、食欲不振
- 212 236 防已黄耆湯
〔成分・分量〕 防已4-5、黄耆5、白朮3(蒼朮も可)、生姜1-1.5(ヒネシヨウガを使用する場合3)、大棗3-4、甘草1.5-2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症:
肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)
- 213 237 防已茯苓湯
〔成分・分量〕 防已2.4-3、黄耆2.4-3、桂皮2.4-3、茯苓4-6、甘草1.5-2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、手足のむくみや冷えやすい傾向のあるものの次の諸症:
手足の疼痛・しびれ感、むくみ、めまい、慢性下痢

- 214 238 防風通聖散
〔成分・分量〕
当帰1.2-1.5、芍薬1.2-1.5、川芎1.2-1.5、山梔子1.2-1.5、連翹1.2-1.5、薄荷葉1.2-1.5、生姜0.3-0.5(ヒネシヨウガを使用する場合1.2-1.5)、荊芥1.2-1.5、防風1.2-1.5、麻黄1.2-1.5、大黃1.5、芒硝1.5、白朮2、桔梗2、黄芩2、甘草2、石膏2、滑石3(白朮のない場合も可)
〔用法・用量〕
原則として湯
(1)散:1回2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕
体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症:
高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症
- 215 239 補気健中湯(補気建中湯)
〔成分・分量〕
白朮3-5、蒼朮2.5-3.5、茯苓3-5、陳皮2.5-3.5、人参1.5-4、黄芩2-3、厚朴2、沢瀉2-4、麦門冬2-8
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症:
腹部膨満感、むくみ
- 216 240 補中益気湯
〔成分・分量〕
人参3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、黄耆3-4.5、当帰3、陳皮2-3、大棗1.5-3、柴胡1-2、甘草1-2、生姜0.5、升麻0.5-2
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症:
虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒
- 217 241 補肺湯
〔成分・分量〕
麦門冬4、五味子3、桂皮3、大棗3、粳米3、桑白皮3、款冬花2、生姜0.5-1(ヒネシヨウガを使用する場合2-3)
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力中等度以下のものの次の諸症:
せき、しわがれ声
- 218 242 麻黄湯
〔成分・分量〕
麻黄3-5、桂皮2-4、杏仁4-5、甘草1-1.5
〔用法・用量〕
湯
〔効能・効果〕
体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体がふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症:
感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり
(使用上の注意:身体虚弱の人は使用しないこと)

- 243 麻黄附子細辛湯
 [成分・分量] 麻黄2-4、細辛2-3、加工ブシ0.3-1
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力虚弱で、手足に冷えがあり、ときに悪寒があるものの次の諸症：
 感冒、アレルギー性鼻炎、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛
- 219 244 麻杏甘石湯
 [成分・分量] 麻黄4、杏仁4、甘草2、石膏10
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渴くものの次の諸症：
 せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み
- 220 245 麻杏薏甘湯
 [成分・分量] 麻黄4、杏仁3、薏苡仁10、甘草2
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度なものの次の諸症：
 関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎)
- 221 246 麻子仁丸
 [成分・分量] 麻子仁4-5、芍薬2、枳実2、厚朴2-2.5、大黄3.5-4、杏仁2-2.5 (甘草1.5を加えても可)
 [用法・用量] (1)散:1回2-3g 1日1-3回
 (2)湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの次の諸症：
 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和
- 222 247 味麦地黄丸
 [成分・分量] 地黄8、山茱萸4、山薬4、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3、麦門冬6、五味子2
 [用法・用量] (1)散:1回2g 1日3回
 (2)湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、ときにせき、口渇があるものの次の諸症：
 下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、息切れ、からげき

- 223 248 明朗飲
 〔成分・分量〕 茯苓4-6、細辛1.5-2、桂皮3-4、黄連1.5-2、白朮2-4、甘草2、車前子2-3
 〔用法・用量〕 湯
 〔効能・効果〕 体力中等度で、ときにめまい、ふらつき、動悸があるものの次の諸症：
 急・慢性結膜炎、目の充血、流涙(なみだ目)
- 224 249 楊柏散
 〔成分・分量〕 楊梅皮2、黄柏2、犬山椒1
 〔用法・用量〕 外用である。細末を混和し、うすい酢又は水で泥状として患部に塗る。
 〔効能・効果〕 捻挫、打撲
- 225 250 薏苡仁湯
 〔成分・分量〕 麻黄4、当帰4、蒼朮4(白朮も可)、薏苡仁8-10、桂皮3、芍薬3、甘草2
 〔用法・用量〕 湯
 〔効能・効果〕 体力中等度で、関節や筋肉のはれや痛みがあるものの次の諸症：
 関節痛、筋肉痛、神経痛
- 226 251 抑肝散
 〔成分・分量〕 当帰3、釣藤鈎3、川芎3、白朮4(蒼朮も可)、茯苓4、柴胡2-5、甘草1.5
 〔用法・用量〕 湯
 〔効能・効果〕 体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるもの次の諸症：
 神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道症^{注)}
- 《備考》
 注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
 【注)表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 227 252 抑肝散加芍薬黄連
 [成分・分量] 当帰5.5、釣藤鈎1.5、川芎2.7、白朮5.3(蒼朮も可)、茯苓6.5、柴胡2、甘草0.6、芍薬4、黄連0.3
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以上をめやすとして、神経のたかぶりが強く、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：
 神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道症^{注)}
 《備考》
 注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
 【注)表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 228 253 抑肝散加陳皮半夏
 [成分・分量] 当帰3、釣藤鈎3、川芎3、白朮4(蒼朮も可)、茯苓4、柴胡2-5、甘草1.5、陳皮3、半夏5
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：
 神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、更年期障害、血の道症^{注)}、歯ぎしり
 《備考》
 注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
 【注)表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 229 254 六君子湯
 [成分・分量] 人参2-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、半夏3-4、陳皮2-4、大棗2、甘草1-1.5、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)
 [用法・用量] 湯
 [効能・効果] 体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：
 胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

- 230 255 立効散
〔成分・分量〕 細辛1.5-2、升麻1.5-2、防風2-3、甘草1.5-2、竜胆1-1.5
〔用法・用量〕 湯(口に含んでゆっくり飲む)
〔効能・効果〕 歯痛、抜歯後の疼痛
《備考》 注)体力に関わらず、使用できる。
【注)表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 231 256 竜胆瀉肝湯
〔成分・分量〕 当帰5、地黄5、木通5、黄芩3、沢瀉3、車前子3、竜胆1-1.5、山梔子1-1.5、甘草1-1.5
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症：
排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ(おりもの)、頻尿
- 232 257 苓姜朮甘湯
〔成分・分量〕 茯苓4-6、乾姜3-4、白朮2-3(蒼朮も可)、甘草2
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、腰から下肢に冷えと痛みがあつて、尿量が多いものの次の諸症：
腰痛、腰の冷え、夜尿症、神経痛
- 233 258 苓桂甘棗湯
〔成分・分量〕 茯苓4-8、桂皮4、大棗4、甘草2-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、のぼせや動悸があり神経がたかぶるものの次の諸症：
動悸、精神不安
- 234 259 苓桂朮甘湯
〔成分・分量〕 茯苓4-6、白朮2-4(蒼朮も可)、桂皮3-4、甘草2-3
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：
立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏

- 260 麗沢通気湯
〔成分・分量〕 黄耆4、山椒1、蒼朮3、麻黄1、羌活3、白芷4、独活3、生姜1、防風3、大棗1、升麻1、葱白3、葛根3、甘草1（葱白はなくても可）
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：
嗅覚異常、嗅覚障害
- 261 麗沢通気湯加辛夷
〔成分・分量〕 黄耆4、山椒1、蒼朮3、麻黄1、羌活3、白芷4、独活3、生姜1、防風3、大棗1、升麻1、葱白3、葛根3、甘草1、辛夷3（葱白はなくても可）
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度のものの次の諸症：
嗅覚異常、嗅覚障害、鼻づまり、アレルギー性鼻炎、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）
- 235 262 連珠飲
〔成分・分量〕 当帰3-4、白朮2-4（蒼朮も可）、川芎3-4、甘草2-3、芍薬3-4、地黄3-4、茯苓4-6、桂皮3-4
〔用法・用量〕 湯
〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、ときにのぼせ、ふらつきがあるものの次の諸症：
更年期障害、立ちくらみ、めまい、動悸、息切れ、貧血
- 236 263 六味丸（六味地黄丸）
〔成分・分量〕 地黄5-6、4-8、山茱萸3、3-4、山薬3、3-4、沢瀉3、3、茯苓3、3、牡丹皮3、3（左側の数字は湯、右側は散）
〔用法・用量〕 (1)散：1回2g 1日3回
(2)湯
〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渴があるものの次の諸症：
排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、かゆみ、夜尿症、しびれ

新旧対照表

頁番号	処方名	項目	基準 (平成22年4月1日)	改正基準 (平成23年●月●日)
8	加味四物湯	成分・分量	当帰2.5-3、川芎2-3、芍薬2-3、地黄3-8、蒼朮3 (白朮2.5も可)、麥門冬2.5-5、人參1.5-2.5、牛膝1-2.5、黄柏1.5、五味子1-1.5、黄連1.5、知母1-1.5、杜仲1.5-2	当帰2.5-3、川芎2-3、芍薬2-3、地黄3-8、蒼朮3 (白朮2.5も可)、麥門冬2.5-5、人參1.5-2.5、牛膝1-2.5、黄柏1.5-2.5、五味子1-1.5、黄連1.5、知母1-1.5、杜仲1.5-2
19	杞菊地黄丸	成分・分量	地黄5、5-8、山茱萸3、3-4、山藥3、3-4、沢瀉3、3、茯苓3、3、牡丹皮2-3、3、枸杞子4-5、4-5、菊花3、3 (左側の数字は湯、右側は散) ※1	地黄5-8、8、山茱萸3-4、4、山藥4、4、沢瀉3、3、茯苓3、3、牡丹皮2-3、3、枸杞子4-5、5、菊花3、3 (左側の数字は湯、右側は散)
40	知柏地黄丸	成分・分量	地黄5、5-8、山茱萸3、3-4、山藥3、3-4、沢瀉3、3、茯苓3、3、牡丹皮3、3、知母3、3、黄柏3、3 (左側の数字は湯、右側は散)	地黄8、8、山茱萸4、4、山藥4、4、沢瀉3、3、茯苓3、3、牡丹皮3、3、知母3、3、黄柏3、3 (左側の数字は湯、右側は散)
43	当帰芍薬散加黄耆 釣藤	成分・分量	当帰3-3.9、沢瀉4-12、川芎3、芍薬4-16、茯苓4-5、白朮4-5 (蒼朮も可)、黄耆3、釣藤鈎4	当帰3、沢瀉4、川芎3、芍薬4、茯苓4、蒼朮4 (白朮も可)、黄耆3、釣藤鈎4
43	当帰芍薬散加人參	成分・分量	当帰3-3.9、沢瀉4-12、川芎3、芍薬4-16、茯苓4-5、白朮4-5 (蒼朮も可)、人參1-3	当帰3.5、沢瀉3.5、川芎3、芍薬4、茯苓3.5、白朮3 (蒼朮も可)、人參1-2

44	204	当帰芍薬散加附子	成分・分量	当帰 3-3.9、沢瀉 4-12、川芎 3、加工ブシ 0.4、芍薬 4、茯苓 4、白朮 4 (蒼朮も可)	当帰 3、沢瀉 4、川芎 3、加工ブシ 0.4、芍薬 4、茯苓 4、白朮 4 (蒼朮も可)
52	247	味麦地黄丸	成分・分量	地黄 5、5-8、山茱萸 3、3-4、山薬 3、3-4、沢瀉 3、3、茯苓 3、3、牡丹皮 3、3、麦門冬 6、6、五味子 2、2 (左側の数字は湯、右側は散)	地黄 8、8、山茱萸 4、4、山薬 4、4、沢瀉 3、3、茯苓 3、3、牡丹皮 3、3、麦門冬 6、6、五味子 2、2 (左側の数字は湯、右側は散)
54	252	抑肝散加芍薬黄連	成分・分量	当帰 3、釣藤鈎 3、川芎 3、白朮 4 (蒼朮も可)、茯苓 4、柴胡 2、甘草 1.5、芍薬 4、黄連 0.8-1.5	当帰 5.5、釣藤鈎 1.5、川芎 2.7、白朮 5.3 (蒼朮も可)、茯苓 6.5、柴胡 2、甘草 0.6、芍薬 4、黄連 0.3

※1 平成22年7月30日付け審査管理課事務連絡の成分・分量。